◎ 陈效一　主编

中国保护动物图谱

中国环境科学出版社

本书献给野生动物保护执法者、工作者；

献给亿万青少年和广大关爱动物的朋友们。

ISBN 7-80163-800-X

9 787801 638007 >

ISBN 7-80163-800-X/X·436　定价：38.00元

中国保护动物图谱

◎ 陈效一　主编

中国环境科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国保护动物图谱／陈效一主编.－北京：中国环境科学出版社，2004.2
ISBN 7-80163-800-X

Ⅰ.中… Ⅱ.陈… Ⅲ.保护动物－中国－图谱
Ⅳ.Q958.52-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 012400 号

书　　名	中国保护动物图谱
主　　编	陈效一
责任编辑	俞光旭
出版发行	中国环境科学出版社
地　　址	北京市广渠门内大街 16 号(100062)
电　　话	(010)67113409
网　　址	http://www.cesp.cn
电子信箱	cesp@sohu.com
经　　销	各地新华书店经售
印　　刷	北京中煤新大印刷厂
版　　次	2004 年 4 月第一版　2004 年 4 月第一次印刷
开　　本	850 × 1168　1/32
印　　张	10.25
字　　数	200 千字
书　　号	ISBN 7-80163-800-X/X・436
定　　价	38.00 元

前　言

我国幅员辽阔，自然环境多样，野生动物资源丰富，是世界上拥有野生动物种类最多的国家，占世界种类总数的10%以上。其中不仅有大量的经济动物，还有160余种闻名世界的特产珍稀动物，如大熊猫、金丝猴、扭角羚、白唇鹿、白暨豚、黄腹角雉、褐马鸡、黑颈鹤、扬子鳄、鳄蜥、中华鲟、白鲟、大鲵等。野生动物是我国一项宝贵的自然资源，也是全人类的共同财富。保护好野生动物，对于维护生态平衡，拯救珍稀濒危物种，开展科学研究，发展经济，丰富人民的文化生活，以及促进国际交流，增进各国人民之间的友谊，具有重要的作用和深远的意义。

我国在野生动物保护管理、科学研究等方面做了大量工作，取得了显著成绩。党中央和国务院对野生动物保护工作十分重视，发布了一系列重要指示。全国划建了一大批保护区、禁猎区，建立起多处繁育中心。我国还先后加入了有关国际公约、组织，与有关国家签订了保护协定，促进了野生动物保护方面的国际交流与合作。为了更好地调动民众保护野生动物的积极性，提高全社会的保护意识，全国各地相继开展了“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等活动，收到了良好的效果。

1988年，全国人大常委会颁布了《中华人民共和国野生动物保护法》，就野生动物的保护、科学研究、驯养繁殖、经营利用以及进出口管理等作出了明确的规定。《野生动物保护法》的制定和实施，标志着我国的野生动物保护管理工作走上了法制管理轨道。但近些年来，不少地区仍有捕猎珍贵稀有野生动物，严重破坏这些动物的栖息环境的事件发生，非法出口这些动物及其产品等违法行为，也时有所闻。据有关部门初步统计，我国的麋鹿、野马、高鼻羚羊、犀牛、豚鹿、白臀叶猴、新疆虎、冠麻鸭、黑长尾雉等珍稀动物已经或基本绝灭；大熊猫、长臂猿、虎、亚洲象、坡鹿、滇金丝猴、黔金丝猴、儒艮、白暨豚、朱鹮、黄腹角雉、扬子鳄、中华鲟、白鲟、文昌鱼等20多种珍稀动物正濒临绝灭之中。

我们人类属于哺乳纲灵长目，人类和自己的生物“兄弟”共同生活在拥挤的地球上。生物资源是地球上生命存在的基础，其中当然包括人类生存的基础。人与自然和谐相处始终是亘古至今不变的规律。如果以为对抗主宰着大自然，那是不对的。科学家有充分的资料可以证实：彼此敌对和漠不关心的关系可以让位于紧密合作和互相帮助。科学家可以带我们到各种生物环境和角落里去，那里展现出的“联盟”将是惊人的和独一无二的，生物界各门类——动物、植物和微生物的代表紧密地联合在一起。这种“联盟”的规模是相当宏伟的，其形式多种多样，数不胜数。在科学技术高速发展的今天，人类对生物的兴趣空前高涨。难道人类不应该进一步向这种动物共生和生物联盟学习吗？实际上，人类已经从各种生物形形色色的“友谊”中学到了许多秘诀。

作为生物界一部分的人类社会，就是为了保护自己也应该依靠生物界的规律，了解野生动物积累的“生活智慧”。只有这样，人类才能与野生动物和谐共生，才

能真正得到“驾驭”大自然的权利。在自然界里，在所有生物体间以及生物圈间都存在着一个相互依存的微妙的网络，这个网络是不能也不应该打破的，如果人类不保护野生动物，非要打破这个网络的话，那么人类必将受到大自然的无情的报复。

21世纪是生物学世纪。保护地球，保护大自然，保护生物多样性，无疑是人类生存的首要前提。中国在保护野生动物资源、挽救濒危物种方面虽然做了大量工作并取得了显著的成绩，但是，作为一个人口众多的发展中国家，面对种类丰富的野生动物资源，我们所担负的保护任务仍然十分繁重，还有大量的工作要做。

早在1983年，国务院就发布了关于严格保护珍贵稀有野生动物的通令。通令中指出：“保护珍贵稀有野生动物是建设社会主义精神文明和物质文明的一项重要内容，是每个公民应尽的职责。”“要加强保护珍贵稀有野生动物的宣传教育，造成强大的社会舆论，力求做到家喻户晓，深入人心，使爱护珍贵稀有野生动物逐渐成为一种新的社会风尚和美德。”一个国家，野生动物的保护状况及遭遇如何，从一个侧面反映出该国科学与文化的发展水平，标志着国民的文化素质。我国是具有五千年灿烂文化的文明古国，具有爱护野生动物的优良传统，现在应该行动起来，从自我做起，从小事做起，共同保护我们人类的朋友——野生动物。为了在保护珍贵稀有野生动物的工作中尽一点微薄之力，我主编了这本《中国保护动物图谱》，以使更多的人认识和了解国家重点保护野生动物，从而达到宣传保护野生动物的目的。希望这本图谱能够成为宣传保护野生动物的工具，成为保护野生动物志愿者和广大青少年的益友。

本图谱采用的物种濒危等级如下：

● 野生绝迹(Ex)：如：麋鹿、野马、云南闭壳龟、鼋等。

● 国内绝迹(Et)：如：高鼻羚羊、豚鹿、彩鹳等。

● 濒危(E)：如：大熊猫、金丝猴、野骆驼、扭角羚、藏羚、朱鹮、褐马鸡、白鳖豚等。

● 易危(V)：如：熊猴、猞猁、野牦牛、天鹅、鸳鸯、原鸡、穿山甲、中华鲟等。

● 稀有(R)：如：马来熊、貂熊、赤斑羚、红胸角雉、黑颈长尾雉、孔雀雉、棕颈犀鸟等。

● 未定(I)：如：白腹军舰鸟、白尾海雕、黑头角雉、蓝鹇、黑长尾雉、红领绿鹦鹉等。

值此图谱出版之际，我要特别感谢汪松教授和张孚允教授，他们在百忙中审阅了本图谱，并给本图谱的编辑工作以指导。我还要感谢张词祖先生和马晓峰、郭玉民、李湘涛、冯刚、李树忠、李艳明、齐振忠、吴秀山、徐建民、唐锡阳、谷学忠、朴龙国、盖强、彭荃泰、岩昆等先生，他们为本图谱提供了精美的照片。本图谱虽有专家的指导，但限于本人水平，书中难免有不足之处，欢迎批评指正。

2003年6月5日

目录

MU LU

彩 图

国家重点保护野生动物（一级）

灵长目 …… 2
懒猴科 …… 2
蜂 猴（所有种）
（蜂猴、倭蜂猴）
猴 科 …… 3
熊 猴
豚尾猴
台湾猴
叶 猴（所有种）
（黑叶猴、白头叶猴、灰叶猴、戴帽叶猴）
金丝猴（所有种）
（金丝猴、滇金丝猴、黔金丝猴）
长臂猿科 …… 8
长臂猿（所有种）
（黑长臂猿、白眉长臂猿、白掌长臂猿、白颊长臂猿）

食肉目 …… 11
熊 科 …… 11
马来熊
大熊猫科 …… 12
大熊猫
鼬 科 …… 13
紫 貂
貂 熊
灵猫科 …… 13
熊 狸
猫 科 …… 14
云 豹
豹
虎
雪 豹

海牛目 …… 16
儒艮科 …… 16
儒 艮

鲸 目 …… 16
喙豚科 …… 16
白鳖豚
海豚科 …… 17
中华白海豚

长鼻目 …… 17
象 科 …… 17
亚洲象

奇蹄目 …… 18
马 科 …… 18
蒙古野驴
西藏野驴
野 马

偶蹄目 …… 19
驼 科 …… 19
野骆驼
麝鹿科 …… 20
麝 鹿
鹿 科 …… 20
黑 麂
白唇鹿
坡 鹿
梅花鹿

豚　鹿
麋　鹿
牛　科……24
野　牛
野牦牛
扭角羚
藏　羚
普氏原羚
高鼻羚羊
台湾鬣羚
赤斑羚
北山羊
塔尔羊

啮齿目……30
河狸科……30
河　狸

鳽形目……31
信天翁科……31
短尾信天翁

鹈形目……31
军舰鸟科……31
白腹军舰鸟

鹳形目……32
鹳　科……32
白　鹳
黑　鹳
鹦　科……33
朱　鹮

雁形目……33
鸭　科……33
中华秋沙鸭

隼形目……34
鹰　科……34
金　雕
白肩雕
玉带海雕
白尾海雕
虎头海雕
白背兀鹫
胡兀鹫

鸡形目……38
松鸡科……38
细嘴松鸡
斑尾榛鸡
雉　科……38
雉　鹑
四川山鹧鸪
海南山鹧鸪
黑头角雉
红胸角雉
灰腹角雉
黄腹角雉
虹　雉（所有种）
（白尾梢虹雉、绿尾虹雉、
棕尾虹雉）
褐马鸡
蓝　鹇
黑颈长尾雉
白颈长尾雉
黑长尾雉
孔雀雉
绿孔雀

鹤形目 …… 48
鹤　科 …… 48
黑颈鹤
白头鹤
丹顶鹤
白　鹤
赤颈鹤
鸨　科 …… 51
鸨（所有种）
（大鸨、波斑鸨）

鸥形目 …… 51
鸥　科 …… 51
遗　鸥

龟鳖目 …… 52
陆龟科 …… 52
四爪陆龟
鳖　科 …… 52
鼋

蜥蜴目 …… 53
鳄蜥科 …… 53
鳄　蜥
巨蜥科 …… 53
巨　蜥

蛇亚目 …… 54
蟒　科 …… 54
蟒

鳄　目 …… 54
鼍　科 …… 54
扬子鳄

鲟形目 …… 55
鲟　科 …… 55
中华鲟
达氏鲟
匙吻鲟科 …… 56
白　鲟

国家重点保护野生动物（二级）

灵长目 …… 58
猴　科 …… 58
短尾猴
猕　猴
藏酋猴

鳞甲目 …… 59
鲮鲤科 …… 59
穿山甲

食肉目 …… 60
犬　科 …… 60
豺
熊　科 …… 60
黑　熊
棕　熊（包括马熊）
浣熊科 …… 61
小熊猫
鼬　科 …… 62
石　貂
黄喉貂
水　獭（所有种）
（水獭、小爪水獭）
灵猫科 …… 64
斑林狸
大灵猫
小灵猫

猫　科 …… 65
草原斑猫
荒漠猫
丛林猫
猞　猁
兔　狲
金　猫
渔　猫

鳍足目（所有种） …… 69
（海豹、海狮）

鲸　目 …… 70
其他鲸类（一级保护之外）
（虎鲸、海豚、江豚）

偶蹄目 …… 72
麝　科 …… 72
麝（所有种）
（林麝、马麝）
鹿　科 …… 72
河　鹿
马　鹿（包括白臀鹿）
水　鹿
驼　鹿
牛　科 …… 74
黄　羊
藏原羚
鹅喉羚
鬣　羚
斑　羚
岩　羊
盘　羊

兔形目 …… 78
兔　科 …… 78
雪　兔
海南兔
塔里木兔

啮齿目 …… 79
松鼠科 …… 79
巨松鼠

鹏鹃目 …… 80
鹃鹞科 …… 80
角鹃鹞
赤颈鹃鹞

鹈形目 …… 81
鹈鹕科 …… 81
鹈　鹕（所有种）
（白鹈鹕、斑嘴鹈鹕）
鲣鸟科 …… 82
鲣　鸟（所有种）
（褐鲣鸟）
鸬鹚科 …… 82
海鸬鹚

鹳形目 …… 83
鹭　科 …… 83
黄嘴白鹭
岩　鹭
海南虎斑鳽
小苇鳽
鹳　科 …… 85
彩　鹳
鹮　科 …… 85
白　鹮
黑　鹮
彩　鹮
白琵鹭
黑脸琵鹭

雁形目 …… 88
鸭　科 …… 88
红胸黑雁
白额雁
天　鹅（所有种）
（疣鼻天鹅、大天鹅、小天鹅）
鸳　鸯

隼形目 …… 92
鹰　科 …… 92
其他鹰类（一级保护之外）
（高山兀鹫、黑翅鸢、蜂鹰、鸢、栗鸢、苍鹰、赤腹鹰、雀鹰、松雀鹰、棕尾鵟、大鵟、普通鵟、灰脸鵟鹰、草原雕、乌雕、秃鹫、白腹鹞、蛇雕、鹗）
隼　科（所有种）…… 101
（猎隼、游隼、燕隼、红脚隼、红隼）

鸡形目 …… 104
松鸡科 …… 104
黑琴鸡
镰翅鸡
柳雷鸟
岩雷鸟
花尾榛鸡
雉　科 …… 106
雪　鸡（所有种）
（淡腹雪鸡）
血　雉
红腹角雉
白马鸡
藏马鸡
蓝马鸡
黑　鹇
白　鹇
原　鸡
勺　鸡
白冠长尾雉
锦　鸡（所有种）
（白腹锦鸡、红腹锦鸡）

鹤形目 …… 114
鹤　科 …… 114
灰　鹤
沙丘鹤
白枕鹤
蓑羽鹤
秧鸡科 …… 116
长脚秧鸡
棕背田鸡
姬田鸡
花田鸡

鸻形目 …… 117
雉鸻科 …… 117
铜翅水雉
鹬　科 …… 117
小杓鹬
小青脚鹬
燕鸻科 …… 117
灰燕鸻

鸥形目 …… 118
鸥　科 …… 118
小　鸥
黑浮鸥
黄嘴河燕鸥
黑嘴端凤头燕鸥

鸻形目 …… 119
沙鸡科 …… 119
黑腹沙鸡
鸠鸽科 …… 119
绿　鸠（所有种）
（针尾绿鸠、楔尾绿鸠、厚嘴绿鸠）
黑颏果鸠
皇　鸠（所有种）
（山皇鸠）
斑尾林鸽
鹃　鸠（所有种）
（斑尾鹃鸠）

鹦形目 …… 123
鹦鹉科（所有种）…… 123
（红领绿鹦鹉、绯胸鹦鹉、大绯胸鹦鹉、灰头鹦鹉、花头鹦鹉）

鹃形目 …… 126
杜鹃科 …… 126
鸦　鹃（所有种）
（褐翅鸦鹃、小鸦鹃）

鸨形目（所有种）…… 127
（草鸨、红角鸨、领角鸨、雕鸨、林雕鸨、褐鱼鸨、雪鸨、领鸺鹠、斑头鸺鹠、鹰鸨、褐林鸨、长尾林鸨、长耳鸨、短耳鸨、鬼鸨）

雨燕目 …… 136
雨燕科 …… 136
灰喉针尾雨燕
凤头雨燕科 …… 136
凤头雨燕

咬鹃目 …… 136
咬鹃科 …… 136
橙胸咬鹃

佛法僧目 …… 137
翠鸟科 …… 137
蓝耳翠鸟
鹳嘴翠鸟
蜂虎科 …… 137
黑胸蜂虎
绿喉蜂虎
犀鸟科（所有种）…… 138
（棕颈犀鸟、花冠皱盔犀鸟、冠斑犀鸟、双角犀鸟）

䴕形目 …… 140
啄木鸟科 …… 140
白腹黑啄木鸟

雀形目 …… 140
八色鸫科（所有种）…… 140
（蓝翅八色鸫）
阔嘴鸟科（所有种）…… 141
（银胸丝冠鸟、长尾阔嘴鸟）

龟鳖目 …… 142
龟　科 …… 142
地　龟
三线闭壳龟
陆龟科 …… 143
凹甲陆龟

海龟科 …… 143
蠵 龟
绿海龟
玳 瑁
棱皮龟科 …… 145
棱皮龟
鳖 科 …… 145
山瑞鳖

蜥蜴目 …… 146
壁虎科 …… 146
大壁虎

有尾目 …… 146
隐鳃鲵科 …… 146
大 鲵
蝾螈科 …… 147
疣 螈（所有种）
（镇海疣螈、贵州疣螈、红
瘰疣螈）

无尾目 …… 146
蛙 科 …… 146
虎纹蛙

文 字

国家重点保护野生动物（一级）

灵长目 …… 148
懒猴科 …… 148
蜂 猴（所有种）
（蜂猴、倭蜂猴）
猴 科 …… 149
熊 猴
台湾猴
豚尾猴
叶 猴（所有种）
（黑叶猴、白头叶猴、灰
叶猴、长尾叶猴、白臀
叶猴、戴帽叶猴）
金丝猴（所有种）
（金丝猴、滇金丝猴、黔
金丝猴）
长臂猿科 …… 154
长臂猿（所有种）
（黑长臂猿、白眉长臂猿、
白掌长臂猿、白颊长臂猿）

食肉目 …… 155
熊 科 …… 155
马来熊
大熊猫科 …… 156
大熊猫
鼬 科 …… 156
紫 貂
貂 熊
灵猫科 …… 158
熊 狸
猫 科 …… 158
云 豹
豹
雪 豹
虎

海牛目 …… 161
儒艮科 …… 161
儒 艮

鲸 目 …… 161
喙豚科 …… 161
白暨豚
海豚科 …… 162
中华白海豚

目录

MU LU

长鼻目 …… 162
象　科 …… 162
亚洲象

奇蹄目 …… 163
马　科 …… 163
蒙古野驴
西藏野驴
野　马

偶蹄目 …… 165
驼　科 …… 165
野骆驼
鼷鹿科 …… 166
鼷　鹿
鹿　科 …… 166
黑　鹿
白唇鹿
坡　鹿
梅花鹿
豚　鹿
麋　鹿
牛　科 …… 170
野　牛
野牦牛
藏　羚
普氏原羚
高鼻羚羊
扭角羚
台湾鬣羚
赤斑羚
北山羊
塔尔羊

啮齿目 …… 175
河狸科 …… 175
河　狸

鴷形目 …… 176
信天翁科 …… 176
短尾信天翁

鹈形目 …… 176
军舰鸟科 …… 176
白腹军舰鸟

鹳形目 …… 177
鹳　科 …… 177
白　鹳
黑　鹳
鹮　科 …… 178
朱　鹮

雁形目 …… 179
鸭　科 …… 179
中华秋沙鸭

隼形目 …… 179
鹰　科 …… 179
金　雕
白肩雕
玉带海雕
白尾海雕
虎头海雕
白背兀鹫
胡兀鹫

鸡形目 …… 183
松鸡科 …… 183
细嘴松鸡
斑尾榛鸡

雉　科 …… 184
雉　鹑
四川山鹧鸪
海南山鹧鸪
黑头角雉
红胸角雉
灰腹角雉
黄腹角雉
虹　雉（所有种）
（白尾梢虹雉、绿尾虹雉、
棕尾虹雉）
褐马鸡
蓝　鹇
黑颈长尾雉
白颈长尾雉
黑长尾雉
孔雀雉
绿孔雀

鹤形目 …… 192
鹤　科 …… 192
黑颈鹤
白头鹤
丹顶鹤
白　鹤
赤颈鹤
鸨　科 …… 195
鸨（所有种）
（大鸨、小鸨、波斑鸨）

鸻形目 …… 196
鸻　科 …… 196
遗　鸥

龟鳖目 …… 196
陆龟科 …… 196
四爪陆龟
鳖　科 …… 197
鼋

蜥蜴目 …… 197
鳄蜥科 …… 197
鳄　蜥
巨蜥科 …… 198
巨　蜥

蛇亚目 …… 198
蟒　科 …… 198
蟒

鳄　目 …… 199
鼍　科 …… 199
扬子鳄

鲟形目 …… 200
鲟　科 …… 200
中华鲟
达氏鲟
匙吻鲟科 …… 201
白　鲟

国家重点保护野生动物（二级）

灵长目 …… 202
猴　科 …… 202
短尾猴
猕　猴
藏酋猴

鳞甲目 …… 203
鲮鲤科 …… 203
穿山甲

食肉目 …… 204
犬　科 …… 204
豺
熊　科 …… 205
黑　熊
棕　熊（包括马熊）
浣熊科 …… 206
小熊猫
鼬　科 …… 206
石　貂
黄喉貂
水　獭（所有种）
（水獭、小爪水獭、江獭）
灵猫科 …… 208
斑林狸
大灵猫
小灵猫
猫　科 …… 210
草原斑猫
荒漠猫
丛林猫
猞　猁
兔　狲
金　猫
渔　猫

鳍足目（所有种） …… 213
（海豹、海狗、海狮、海象）

鲸　目 …… 214
其他鲸类（一级保护之外）
（虎鲸、江豚、海豚、伪虎鲸
小鳁鲸、长须鲸、灰鲸、露
脊鲸）

偶蹄目 …… 218
麝　科 …… 218
麝（所有种）
（原麝、林麝、马麝、黑麝、
喜马拉雅麝）
鹿　科 …… 219
河　麂
马　鹿（包括白臀鹿）
水　鹿
驼　鹿
牛　科 …… 221
黄　羊
藏原羚
鹅喉羚
鬣　羚
斑　羚
岩　羊
盘　羊

兔形目 …… 224
兔　科 …… 224
雪　兔
海南兔
塔里木兔

啮齿目 …… 226
松鼠科 …… 226
巨松鼠

鹳鹳目 …… 226
鹳鹳科 …… 226
角鹳鹳
赤颈鹳鹳

鹈形目 …… 227
鹈鹕科 …… 227
鹈　鹕（所有种）
鲣鸟科 …… 228
鲣　鸟（所有种）
鸬鹚科 …… 228
海鸬鹚
黑颈鸬鹚

鹳形目 …… 229
鹭　科 …… 229
黄嘴白鹭
岩　鹭
海南虎斑鳽
小苇鳽
鹳　科 …… 230
彩　鹳
鹮　科 …… 231
白　鹮
黑　鹮
彩　鹮
白琵鹭
黑脸琵鹭

雁形目 …… 233
鸭　科 …… 233
红胸黑雁
白额雁
天　鹅（所有种）
（疣鼻天鹅、大天鹅、小天鹅）
鸳　鸯

隼形目 …… 236
鹰　科 …… 236
其他鹰类（一级保护之外）
（高山兀鹫、黑翅鸢、蜂鹰、
鸢、栗鸢、苍鹰、赤腹鹰、
雀鹰、松雀鹰、棕尾鵟、
大鵟、普通鵟、灰脸鵟鹰、
草原雕、乌雕、秃鹫、白
腹鹞、蛇雕、鸮）
隼　科（所有种） …… 242
（猎隼、游隼、燕隼、红脚
隼、红隼）

鸡形目 …… 244
松鸡科 …… 244
黑琴鸡
镰翅鸡
柳雷鸟
岩雷鸟
花尾榛鸡
雉　科 …… 246
雪　鸡（所有种）
（淡腹雪鸡、暗腹雪鸡）
红腹角雉
血　雉
白马鸡
藏马鸡
蓝马鸡
黑　鹇
白　鹇
原　鸡

勺　鸡
白冠长尾雉
锦　鸡（所有种）
（白腹锦鸡、红腹锦鸡）

鹤形目 …… 253
鹤　科 …… 253
灰　鹤
沙丘鹤
白枕鹤
蓑羽鹤
秧鸡科 …… 255
长脚秧鸡
姬田鸡
棕背田鸡
花田鸡

鸻形目 …… 256
雉鸻科 …… 256
铜翅水雉
鹬　科 …… 256
小杓鹬
小青脚鹬
燕鸻科 …… 257
灰燕鸻

鸥形目 …… 258
鸥　科 …… 258
小　鸥
黑浮鸥
黄嘴河燕鸥
黑嘴端凤头燕鸥

鸽形目 …… 259
沙鸡科 …… 259
黑腹沙鸡

鸠鸽科 …… 259
绿　鸠（所有种）
（针尾绿鸠、楔尾绿鸠、红翅绿鸠、红顶绿鸠、黄脚绿鸠、厚嘴绿鸠、灰头绿鸠、橙胸绿鸠）
黑颏果鸠
皇　鸠（所有种）
（绿皇鸠、山皇鸠）
斑尾林鸽
鹃　鸠（所有种）
（斑尾鹃鸠、棕头鹃鸠、乌鹃鸠）

鹦形目 …… 263
鹦鹉科（所有种）…… 263
（红领绿鹦鹉、绯胸鹦鹉、大绯胸鹦鹉、花头鹦鹉、灰头鹦鹉、长尾鹦鹉、短尾鹦鹉）

鹃形目 …… 266
杜鹃科 …… 266
鸦　鹃（所有种）
（褐翅鸦鹃、小鸦鹃）

鸮形目（所有种）…… 266
（仓鸮、草鸮、栗鸮、黄嘴角鸮、纵纹角鸮、红角鸮、领角鸮、雕鸮、林雕鸮、乌雕鸮、褐鱼鸮、毛腿鱼鸮、黄脚鱼鸮、雪鸮、猛



鸮、花头鸺鹠、领鸺鹠、斑头鸺鹠、鹰鸮、纵纹腹小鸮、褐林鸮、灰林鸮、长尾林鸮、乌林鸮、长耳鸮、短耳鸮、鬼鸮）

雨燕目 …… 274
雨燕科 …… 274
灰喉针尾雨燕
风头雨燕科 …… 274
风头雨燕

咬鹃目 …… 274
咬鹃科 …… 274
橙胸咬鹃

佛法僧目 …… 274
翠鸟科 …… 274
蓝耳翠鸟
鹳嘴翠鸟
蜂虎科 …… 275
黑胸蜂虎
绿喉蜂虎
犀鸟科（所有种） …… 276
（白喉犀鸟、棕颈犀鸟、花冠皱盔犀鸟、冠斑犀鸟、双角犀鸟）

䴕形目 …… 278
啄木鸟科 …… 278
白腹黑啄木鸟

雀形目 …… 278
八色鸫科（所有种） …… 278
（蓝枕八色鸫、蓝背八色鸫、蓝八色鸫、蓝翅八色鸫、马来八色鸫、绿胸八色鸫、栗头八色鸫、双辫八色鸫）
阔嘴鸟科（所有种） …… 279
（银胸丝冠鸟、长尾阔嘴鸟）

龟鳖目 …… 280
龟　科 …… 280
地　龟
三线闭壳龟
云南闭壳龟
陆龟科 …… 281
凹甲陆龟
海龟科 …… 281
蠵　龟
绿海龟
玳　瑁
太平洋丽龟
棱皮龟科 …… 283
棱皮龟
鳖　科 …… 283
山瑞鳖

蜥蜴目 …… 284
壁虎科 …… 284
大壁虎

有尾目 …… 284
隐鳃鲵科 …… 284
大　鲵
蝾螈科 …… 285
细痣疣螈
镇海疣螈
贵州疣螈
大凉疣螈
红瘰疣螈

无尾目 …… 284
蛙　科 …… 284
虎纹蛙

国家重点保护野生动物名录 287
中华人民共和国野生动物保护法 300
主要参考文献 …… 306

国家重点保护野生动物 一级

GUOJIA ZHONGDIAN
BAOHU YESHENG
DONGWU

蜂猴
Nycticebus coucang
FENG HOU
● 濒危等级　濒危(E)
◎张词祖／摄

蜂猴（所有种）*Nycticebus spp.*

灵长目　懒猴科

蜂猴　别名：懒猴　国内分布于云南和广西的热带、亚热带森林中。国外分布于印度、孟加拉和东南亚。

倭蜂猴　别名：懒猴、小懒猴、小风猴　国内仅分布于云南东南部，国外分布于越南、老挝、柬埔寨等国。

倭蜂猴
Nycticebus coucang
WO FENG HOU
● 濒危等级　濒危(E)
◎马晓峰／摄

熊猴 *Macaca assamensis*

XIONG HOU

濒危等级　易危(V)

灵长目 猴科

别名：大青猴、蓉猴、喜马拉雅猴

国内分布于云南、广西和西藏南部。国外分布于缅甸、泰国、老挝、越南、印度、尼泊尔、不丹、锡金。

◎李树忠／摄



Macaca cyclopis 台湾猴

TAI WAN HOU

灵长目 猴科

别名：岩猴

仅分布于我国台湾省，为我国特有种。

◎张词祖／摄



豚尾猴 *Macaca nemestrina*

TUN WEI HOU

灵长目 猴科

别名：平顶猴、猪尾猴

国内仅分布于云南。国外分布于印度及东南亚地区。

濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

叶猴（所有种）*Presbytis spp.*

灵长目 猴科

所谓“叶猴”，是指这类猴子都以叶子为食。分布于我国的叶猴有黑叶猴、白头叶猴、灰叶猴、长尾叶猴、白臀叶猴、戴帽叶猴。

Semnopithecus francoisi 黑叶猴

HEI YE HOU

灵长目 猴科

别名：乌猿

国内分布于广西、贵州、云南。

濒危等级 濒危(E)

◎张词祖／摄

白头叶猴 *Semnopithecus francoisi leucocephalus*

BAI TOU YE HOU

是黑叶猴的一个亚种，也有人认为它是单独的一个种。白头叶猴是我国的特产动物，也是世界著名的稀有猴种。仅分布于广西南部。

濒危等级 濒危(E)

◎张词祖／摄



灰叶猴

Semnopithecus phayrei

HUI YE HOU

别名：菲氏叶猴、巴氏叶猴

国内仅分布于云南。

● 濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

戴帽叶猴

Trachypithecus pileatus

DAI MAO YE HOU

别名：大灰猴、长尾猴

国内仅分布于云南西南部的高黎贡山。国外分布于缅甸北部。

● 濒危等级　濒危(E)

◎马晓峰／摄

◎张词祖／摄

Pygathrix roxellanae 金丝猴

●濒危等级　濒危(E)

JIN SI HOU

金丝猴（所有种）*Pygathrix spp.*

灵长目 猴科　　**别名：仰鼻猴、金线猴**

金丝猴有3种，分别介绍如下：

金丝猴　别名：川金丝猴、仰鼻猴、金线猴、蓝面猴　是我国特产的著名稀有动物之一，仅分布于四川、甘肃、陕西及湖北神农架山区。

滇金丝猴　别名：黑金丝猴、黑仰鼻猴　仅分布于我国云南西北部和西藏东南部。

黔金丝猴　别名：灰金丝猴　仅分布于我国贵州省东北部梵净山的狭小地区。数量十分稀少。

◎张词祖／摄

滇金丝猴
Pygathrix bieti
DIAN JIN SI HOU
● 濒危等级　濒危(E)
◎马晓峰／摄



黔金丝猴
Pygathrix brelichi
QIAN JIN SI HOU
● 濒危等级　濒危(E)
◎李湘涛／摄

◀(雄性)

◎李湘涛／摄



Hylobates concolor 黑长臂猿

●濒危等级　濒危(E)　HEI CHANG BI YUAN

别名：黑冠长臂猿

国内分布于云南、广西、海南。黑长臂猿已纪录的有6个亚种，其中5个亚种分布于我国。

◎张词祖／摄

▲(雌性)

长臂猿（所有种）*Hylobates spp.*

灵长目　长臂猿科

长臂猿是现存4种类人猿中最小的一类。长臂猿有许多和人类相似的地方，它的血型也有A型、B型、AB型，只缺O型；染色体和人很接近，为22对，只比人少1对。



（雄性）►

◎张词祖／摄



白眉长臂猿

Hylobates hoolock

BAI MEI CHANG BI YUAN

别名：呼猿

国内仅分布于云南。

● 濒危等级　濒危(E)

◄(雌性)

◎张词祖／摄

▲（雌性）

（雄性）▲

Hylobates lar 白掌长臂猿

● 濒危等级　濒危(E)　BAI ZHANG CHANG BI YUAN

别名：白手长臂猿

国内仅分布于云南。



白颊长臂猿

Hylobates leucogenys

BAI JIA CHANG BI YUAN

国内仅分布于云南南部。国外分布于越南、老挝。分布区非常狭窄，数量极为稀少。

濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

马来熊

Helarctos malayanus

MA LAI XIONG

濒危等级　稀有(R)

食肉目　熊科

别名：太阳熊、小狗熊、小黑熊

国内仅分布于云南、西藏。国外分布于南亚和东南亚。

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

◎李树忠　李艳明／摄

大熊猫 *Ailuropoda melanoleuca*

DA XIONG MAO

● 濒危等级　濒危(E)

食肉目 大熊猫科

别名：大猫熊、竹熊、花熊

大熊猫是我国的特产，是世界著名的珍稀动物，仅分布于我国四川、甘肃、陕西等省。

大熊猫是著名的活化石，具有很高的学术价值。我国政府已采取了一系列有效措施，全力保护这一濒临灭绝的活化石。

Martes zibellina 紫貂

ZI DIAO

● 濒危等级　濒危(E)

食肉目　鼬科

别名：黑貂、赤貂、貂鼠

国内分布于东北大、小兴安岭、长白山一带及新疆的阿尔泰林区。国外分布于亚洲北部。

◎张词祖／摄

◎李湘涛／摄

貂熊 *Gulo gulo*

DIAO XIONG

● 濒危等级　稀有(R)

食肉目　鼬科

别名：狼獾、月熊、山狗子

国内仅分布于内蒙古、黑龙江和新疆阿勒泰地区。国外分布于欧亚和北美洲北部。

Arctictis binturong 熊狸

XIONG LI

● 濒危等级　濒危(E)

食肉目　灵猫科

别名：熊灵猫

国内分布于云南、广西。国外分布于印度、尼泊尔、不丹、锡金和东南亚。

◎张词祖／摄

云豹 *Neofelis nebulosa*

YUN BAO

◎张词祖／摄

● 濒危等级　濒危(E)

食肉目 猫科

别名：乌云豹、荷叶豹、龟纹豹

国内分布于长江以南各省区，向北分布达甘肃省的南部。国外分布于东南亚和印度、尼泊尔、不丹等地。



豹 *Panthera pardus*

BAO

● 濒危等级　濒危(E)

食肉目 猫科

别名：金钱豹、银钱豹、文豹

豹的分布非常广泛，遍及亚洲和非洲大部分地区。

◎张词祖／摄

Panthera tigris 虎

HU

● 濒危等级　濒危(E)

食肉目 猫科

别名：老虎、大虫、白额虎

虎分布在亚洲，北至俄罗斯西伯利亚，南至印度、印度尼西亚。分布于我国的虎有东北虎、华南虎和孟加拉虎。东北虎分布在黑龙江、吉林；华南虎分布在中南、华东、西南；孟加拉虎分布在云南、西藏。

由于对虎的栖息地的破坏，虎的数量逐年减少。据调查估计，我国野生东北虎只有约 20 只。

东北虎 ►

◎郭玉民／摄

◎张词祖／摄

Panthera uncia 雪豹

XUE BAO

● 濒危等级　濒危(E)

食肉目 猫科

别名：艾叶豹、荷叶豹、草豹

国内分布于西藏、新疆、青海、甘肃、四川、宁夏、山西、内蒙古等省区。国外分布于俄罗斯、蒙古、阿富汗、印度、巴基斯坦、尼泊尔等地。



儒艮 *Dugong dugong*

◎程国英／画

RU GEN

●濒危等级　濒危(E)

海牛目 儒艮科

别名：人鱼、美人鱼

国内分布于广东、广西、海南、台湾等省区的沿海，但分布区狭窄，数量稀少。国外分布于印度洋、太平洋周围，即非洲东岸、亚洲东南部沿海至澳大利亚北部沿海。

●濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

Lipotes vexillifer 白鱀豚

BAI JI TUN

鲸目 喙豚科

别名：白鳍豚、白旗豚

白鱀豚是我国特有的水生哺乳动物，素有“水中大熊猫”的美称。它生活在长江中下游及其连通水系——洞庭湖、鄱阳湖、洪湖等水域。

中华白海豚 *Sousa chinensis*

◎李湘涛／摄

ZHONG HUA BAI HAI TUN

鲸目 海豚科

别名：华白豚、白牛

中华白海豚分布于我国浙江、福建、广东、广西、海南、香港、台湾等省区的沿海，多栖息在内海港湾及河口一带。

◎马晓峰／摄

Elephas maximus 亚洲象

YA ZHOU XIANG

● 濒危等级　濒危(E)

长鼻目 象科

别名：印度象、大象

国内仅分布于云南省与缅甸、老挝相邻的边缘地带。国外分布于南亚及东南亚。

◎冯　刚／摄

蒙古野驴 *Equus hemionus*

MENG GU YE Lü

● 濒危等级　濒危(E)

奇蹄目 马科

别名：野驴、亚洲野驴

国内分布于内蒙古、新疆、甘肃等省区。国外分布于俄罗斯、蒙古、中亚地区及伊朗、叙利亚、阿富汗等地。



● 濒危等级　易危(V)

◎张词祖／摄

Equus kiang 西藏野驴

XI ZANG YE Lü

奇蹄目 马科

别名：亚洲野驴、藏驴

国内分布于西藏、青海、新疆、甘肃及四川。国外分布于印度、尼泊尔及克什米尔。

野马 *Equus przewalskii*

◎张词祖／摄

YE MA

● 濒危等级　野生绝灭(Ex)

奇蹄目 马科

别名：普氏野马、蒙古野马

原生地为新疆阿尔泰附近及向东延伸至蒙古大戈壁草原。现野生种群已经绝灭。在人工圈养或半散发状态下生活的野马还有一定的数量。



野骆驼 *Camelus bactrianus*

YE LUO TUO ● 濒危等级　濒危(E)

偶蹄目 驼科

别名：双峰驼、野驼

国内分布于新疆及中蒙交界处。国外分布于蒙古。

◎李树忠　李艳明／摄

◎张词祖／摄

Tragulus javanicus 鼷鹿

XI LU

● 濒危等级　濒危(E)

偶蹄目 鼷鹿科

别名：小鼷鹿、鼠鹿

国外分布于东南亚。国内仅分布于云南最南端。

Muntiacus crinifrons 黑鹿

HEI JI

● 濒危等级　易危(V)

偶蹄目 鹿科

别名：毛额黄猄、黑黄猄、红头鹿、蓬头鹿

黑鹿是我国特有的种类。仅分布于我国安徽、浙江和与之接壤的福建、江西部分地区。

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

白唇鹿 *Cervus albirostris*

BAI CHUN LU

● 濒危等级　濒危(E)

偶蹄目 鹿科

别名：岩鹿、白鼻鹿、黄鹿

白唇鹿是我国的特产动物，分布于青海、甘肃、四川、西藏。

坡鹿 *Cervus eldi*

PO LU

● 濒危等级　濒危(E)

偶蹄目 鹿科

别名：海南坡鹿、泽鹿、眉角鹿

国内仅分布于海南省。坡鹿是泽鹿的一个亚种，泽鹿在国外分布于中南半岛和印度。是一种高度濒危的鹿科动物。

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

梅花鹿 *Cervus nippon*

MEI HUA LU

● 濒危等级　濒危(E)

● 偶蹄目 鹿科

● 别名：花鹿

梅花鹿在我国曾广泛分布，后由于捕猎过多，现仅在长白山区、四川省北部、安徽省北部及台湾省残存少数个体。国外分布于日本、朝鲜、俄罗斯、越南。

豚鹿 *Axis porcinus*

TUN LU

● 濒危等级　国内绝迹(Et)

● 偶蹄目 鹿科

● 别名：芦鸢鹿

分布于南亚和中南半岛，国内仅分布于云南南部。

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

麋鹿 *Elaphurus davidianus*

MI LU

● 濒危等级　野生绝灭(Ex)

偶蹄目 鹿科

别名：四不像

麋鹿是我国最著名的特产鹿科动物之一。

麋鹿是一种非常特殊的大型鹿类。由于它头似马、角似鹿、蹄似牛、尾似驴，从整体看，一无所像，故俗称“四不像”。

◎李树忠　李艳明／摄

Bos gaurus 野牛

● 濒危等级　濒危(E)　YE NIU

偶蹄目 牛科

别名：白肢野牛、白袜子、野黄牛

国内分布于云南省南部。国外分布于印度、孟加拉、尼泊尔、不丹和中南半岛。

◎张词祖／摄

野牦牛 *Bos grunniens*

YE MAO NIU　● 濒危等级　易危(V)

偶蹄目 牛科

别名：牦牛

野牦牛是我国的特产动物，分布于西藏、青海、新疆、甘肃。国外见于印度和尼泊尔。

◎冯　刚／摄

◎冯　刚／摄

藏羚 *Panthalops hodgsoni*

ZANG LING

● 濒危等级　濒危(E)

偶蹄目 牛科

别名：藏羚羊、一角兽

藏羚是我国著名的特产动物，分布于我国青藏高原，偶尔有少数流入印度和尼泊尔境内。



◎程国英／画

普氏原羚 *Procapra przewalskii*

PU SHI YUAN LING ●濒危等级 濒危(E)

●偶蹄目 牛科

●别名：黄羊、滩黄羊

我国特产的普氏原羚曾分布于内蒙古、青海、宁夏、甘肃等省区，现可能仅存于青海湖边。

普氏原羚的数量正在急剧减少，目前仅存不超过200只，正面临灭绝的危险。

◎吴秀山／摄

高鼻羚羊 *Saiga tatarica*

GAO BI LING YANG ●濒危等级 国内绝迹(Et)

●偶蹄目 牛科

●别名：赛加羚羊

国内曾分布于新疆、内蒙古，迄今已近30年不见踪影。国外分布于蒙古、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯等地。

◎李树忠　李艳明／摄

扭角羚(秦岭)

NIU JIAO LING　● 濒危等级　濒危(E)

扭角羚 *Budorcas taxicolor*

NIU JIAO LING

偶蹄目 牛科

别名：羚牛

扭角羚是一种难得的大型牛科动物。国内分布于四川、陕西、甘肃、云南、西藏。国外分布于缅甸北部、印度阿萨姆和不丹。



扭角羚(四川)

NIU JIAO LING　● 濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

◎程国英／画

Capricornis crispus 台湾鬣羚

TAI WAN LIE LING

偶蹄目 牛科

别名：台湾长鬣山羊、日本鬣羚

台湾鬣羚是我国的特产动物。仅分布于我国台湾省。

赤斑羚 *Naemorhedus baileyi*

◎张词祖／摄

CHI BAN LING

●濒危等级 稀有(R)

偶蹄目 牛科

别名：红斑羚、红山羊

国内仅分布于西藏。国外分布于缅甸北部及相邻的印度阿萨姆。

母子群 ▲

公羊群 ▶

北山羊 *Capra ibex*

◎冯　刚／摄

BEI SHAN YANG

● 濒危等级　濒危(E)

偶蹄目 牛科

别名：悬羊、羚羊

国内分布于新疆、甘肃、青海、西藏等省区。

◎张词祖／摄

Hemitragus jemlahicus 塔尔羊

● 濒危等级　濒危(E)　　TA ER YANG

偶蹄目 牛科

别名：长毛羊、山羊、喜马拉雅塔尔羊

我国在20世纪70年代初期，通过对喜马拉雅的综合科学考察，才发现西藏境内产塔尔羊。国外分布于尼泊尔、克什米尔及印度。

Castor fiber 河狸

● 濒危等级　濒危(E)　　HE LI

啮齿目 河狸科

别名：海狸、洪都斯（哈萨克语）

国内仅分布于新疆北部。国外分布于蒙古、俄罗斯和欧洲。另一种它的近亲分布在北美。有的动物学家认为河狸只有一种。

◎李树忠　李艳明／摄

◎李湘涛／摄

短尾信天翁

Diomedea albatrus

DUAN WEI XIN TIAN WENG

● 濒危等级　濒危(E)

鹱形目　信天翁科

别名：海燕

繁殖于澎湖列岛及台湾附近岛屿，迁徙及越冬季节见于我国东部沿海。国外分布于北太平洋、琉球群岛和小笠原群岛等地。

白腹军舰鸟

Fregata andrewsi

BA FU JUN JIAN NIAO

鹈形目　军舰鸟科

别名：圣诞岛军舰鸟

国内主要分布于西沙群岛一带。国外分布于马来西亚和印度尼西亚周围海域。

● 濒危等级　未定(I)

◎程国英／画

白鹳 *Ciconia ciconia*

◎谷学忠／摄

BAI GUAN

● 濒危等级　濒危(E)

鹳形目　鹳科

别名：东方白鹳、老鹳

白鹳有3个亚种，指名亚种主要分布于欧洲和非洲；亚细亚亚种分布于俄罗斯、巴基斯坦和我国新疆一带；东方亚种分布于乌苏里江和黑龙江下游及我国的东部地区。在欧洲繁殖的白鹳常分两路迁徙到非洲南部越冬，繁殖于我国东北和内蒙古的白鹳，冬季则主要在长江下游越冬。

黑鹳 *Ciconia nigra*

HEI GUAN　● 濒危等级　濒危(E)

鹳形目　鹳科

别名：黑老鹳、乌鹳

黑鹳在我国繁殖于新疆、甘肃、青海、内蒙古、河北、北京、东北等地，在长江流域以南地区越冬。国外分布于欧、亚、非三洲。

◎马晓峰／摄

朱鹮 *Nipponia nippon*

◎张词祖／摄

ZHU HUAN

●濒危等级　濒危(E)

鹳形目 鹮科

别名：朱鹭

朱鹮是世界公认的濒危鸟类，过去广布于我国15省，数量多；国外曾分布于朝鲜、日本，但自20世纪50年代起数量急剧下降，目前已成为世界上种群数量最少的鸟种之一，仅分布于我国陕西省洋县。

中华秋沙鸭 *Mergus squamatus*

ZHONG HUA QIU SHA YA

雁形目 鸭科

别名：油鸭、鳞胁秋沙鸭

中华秋沙鸭是我国的特产动物。繁殖于内蒙古、黑龙江、吉林等地，在长江流域以南越冬。在国外，繁殖于西伯利亚东南部。

●濒危等级　稀有(R)

◎朴龙国／摄

金雕 *Aquila chrysaetos*

JIN DIAO

◎冯　刚／摄

●濒危等级　易危(V)

隼形目　鹰科

别名：洁白雕

国内分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、青海、甘肃、山西、陕西、北京、湖北、贵州、四川、云南及西藏等省区。

白肩雕 *Aquila heliaca*

BAI JIAN DIAO

●濒危等级　易危(V)

隼形目　鹰科

别名：老雕、御雕

国内分布于新疆（繁殖鸟）；在青海、甘肃、陕西、辽宁及长江中下游、福建、广东等地越冬。国外分布于亚洲、欧洲和东北非洲。

◎张词祖／摄

玉带海雕 *Haliaeetus leucoryphus*

◎马晓峰／摄

YU DAI HAI DIAO

●濒危等级　易危(V)

隼形目 鹰科

别名：黑鹰、腰玉

玉带海雕数量十分稀少，在我国分布于内蒙古、黑龙江、甘肃、青海、新疆、西藏、四川等地。国外分布于西伯利亚、蒙古、巴基斯坦、印度等地。

白尾海雕 *Haliaeetus albicilla*

BAI WEI HAI DIAO

●濒危等级　未定(I)

隼形目 鹰科

别名：白尾雕、芝麻雕

国内分布于黑龙江、内蒙古、甘肃，迁徙时见于沿海各省，华南沿海地区及台湾为冬候鸟。国外广泛分布于欧亚大陆北部及非洲西北部、印度北部。

◎张词祖／摄

虎头海雕 *Haliaeetus pelagicus*

◎李湘涛／摄

HU TOU HAI DIAO

● 濒危等级　濒危(E)

隼形目 鹰科

别名：虎头雕、海雕、羌鹫

国内分布于东北、河北、山西，极为罕见。国外分布于西伯利亚沿海地区及日本、朝鲜。

白背兀鹫 *Pseudogyps bengalensis*

BAI BEI WU JIU

● 濒危等级　濒危(E)

隼形目 鹰科

别名：拟兀鹫

国内分布于云南。数量十分稀少。

◎程国英／画

◎张词祖／摄

胡兀鹫 *Gypaetus barbatus*

HU WU JIU

●濒危等级　易危(V)

隼形目 鹰科

别名：大胡子鹫、胡子雕、须鹫

国内分布于新疆、青海、甘肃、宁夏、四川及西藏，偶见于内蒙古、辽宁、河北、山西、湖北、云南等地。国外分布于俄罗斯、中亚、非洲和欧洲部分地区。

细嘴松鸡

Tetrao parvirostris

XI ZUI SONG JI ●濒危等级 易危(V)

鸡形目 松鸡科

别名：黑嘴松鸡、林鸡、嘟鸡

国内分布于内蒙古、黑龙江最北部地区。国外分布于西伯利亚东部。

◎程国英／画

斑尾榛鸡

Tetrastes sewerzowi

●濒危等级 濒危(E) BAN WEI ZHEN JI

鸡形目 松鸡科

别名：羊角鸡

斑尾榛鸡是我国的特产鸟类，仅分布于我国甘肃、青海、四川、西藏、云南等省区的局部山区。

◎程国英／画

雉鹑

Tetraophasis obscurus

ZHI CHUN ●濒危等级 稀有(R)

鸡形目 雉科

别名：四川雉鹑

雉鹑是我国的特产珍禽。分布于青海、甘肃、西藏东部、四川西部等省区。

◎程国英／画

◎程国英／画

四川山鹧鸪 *Arborophila rufipectus*

SI CHUAN SHAN ZHE GU

● 濒危等级　濒危(E)

鸡形目 雉科

别名：砣砣鸡、笋鸡

四川山鹧鸪是我国特产鸟类，仅分布于四川西南部，为留鸟。

海南山鹧鸪 *Arborophila ardens*

HAI NAN SHAN ZHE GU

鸡形目 雉科

别名：山赤姑

海南山鹧鸪是我国的特产鸟类，仅分布于海南省中、南部丘陵山地。

● 濒危等级　濒危(E)

◎李湘涛／摄

◎李湘涛／摄

Tragopan melanocephalus 黑头角雉

HEI TOU JIAO ZHI

●濒危等级　未定(I)

鸡形目　雉科

国内分布于西藏西南隅狮泉河流域的山地。国外分布于克什米尔地区的印度河流域。狮泉河和印度河是同一条河，在我国境内部分叫狮泉河。

◎程国英／画

Tragopan satyra 红胸角雉

HONG XIONG JIAO ZHI

●濒危等级　稀有(R)

鸡形目　雉科

国内分布于西藏春丕山谷及喜马拉雅山北坡。国外分布于尼泊尔、锡金、不丹及印度北部。

◎李湘涛／摄

灰腹角雉 *Tragopan blythii*

HUI FU JIAO ZHI

●濒危等级　稀有(R)

鸡形目 雉科

国内分布于西藏东南部及云南的贡山。国外分布于不丹东部、印度阿萨姆及缅甸西北部。

◎张词祖／摄

黄腹角雉 *Tragopan caboti*

HUANG FU JIAO ZHI

●濒危等级　濒危(E)

鸡形目 雉科

别名：角鸡、寿鸡、呆鸡

黄腹角雉是我国著名的特产珍禽。分布于浙江、江西、湖南、福建、广东、广西等省区。

◎张词祖／摄

白尾梢虹雉 *Lophophorus sclateri*

BAI WEI SHAO HONG ZHI ●濒危等级 稀有(R)

虹雉（所有种）*Lophophorus spp.*

鸡形目 雉科

虹雉体羽光彩夺目的色彩，在鸟类中无与伦比，虹雉正由于其体羽闪耀着彩虹般的金属光泽而得名。分布于我国的虹雉有绿尾虹雉、白尾梢虹雉和棕尾虹雉。

白尾梢虹雉 分布于我国西藏东南部及云南北部、西部等地。国外仅分布于缅甸东北、印度阿萨姆。

绿尾虹雉 是我国的特产雉类，分布于青海、甘肃、四川、西藏。

棕尾虹雉 分布于我国西藏南部和东南部，数量极稀少。国外分布于阿富汗、克什米尔、印度北部、尼泊尔、锡金和不丹。

◎张词祖／摄

Lophophorus lhuysii 绿尾虹雉

●濒危等级　濒危(E)　　LÜ WEI HONG ZHI

棕尾虹雉 *Lophophorus impejanus*

ZONG WEI HONG ZHI　●濒危等级　稀有(R)

◎张词祖／摄

褐马鸡 *Crossoptilon mantchuricum*

HE MA JI

● 濒危等级　濒危(E)

鸡形目　雉科

别名：角鸡、耳鸡、鹞鸡、黑雉

褐马鸡是我国的特产珍禽。仅分布于我国山西省吕梁山脉、河北省西北部山区及北京灵山、小龙门林场。

◎乔振忠／摄

蓝鹇 *Lophura swinhoii*

LAN XIAN

● 濒危等级　未定(I)

鸡形目　雉科

别名：蓝腹鹇、山鸡

蓝鹇是我国著名的特产珍禽。仅分布于台湾山地。

◎吴秀山／摄

◎马晓峰／摄

黑颈长尾雉 *Syrmaticus humiae*

HEI JING CHANG WEI ZHI

●濒危等级　稀有(R)

鸡形目 雉科

别名：花地鸡、哑吧鸡

国内分布于云南、广西等地。国外分布于泰国北部、缅甸北部和印度阿萨姆。

◎马晓峰／摄

白颈长尾雉 *Syrmaticus ellioti*

BAI JING CHANG WEI ZHI

●濒危等级　易危(V)

鸡形目 雉科

别名：横纹背鸡、地鸡

白颈长尾雉是我国特产，分布于安徽、浙江、福建、江西、广东、广西、湖南等地。野外种群数量稀少。

◎李湘涛／摄

Syrmaticus mikado 黑长尾雉

HEI CHANG WEI ZHI

● 濒危等级　未定(I)

鸡形目　雉科

别名：帝雉

黑长尾雉是我国台湾省特产，仅分布于台湾省高山地区。

◎马晓峰／摄

孔雀雉 *Polyplectron bicalcaratum*

KONG QUE ZHI

● 濒危等级　稀有(R)

鸡形目　雉科

别名：孔雀鸡、金钱鸡

国内分布于云南、海南，数量十分稀少。国外分布于锡金、不丹、印度、缅甸、泰国、老挝和越南等地。

◎马晓峰／摄

Pavo muticus 绿孔雀

Lü KONG QUE

● 濒危等级　濒危(E)

鸡形目 雉科

别名：爪哇孔雀、越鸟

国内仅分布于云南西南部。国外分布于印度、中南半岛及印度尼西亚等地。

◎马晓峰／摄

黑颈鹤 *Grus nigricollis*

HEI JING HE

● 濒危等级　濒危(E)

鹤形目 鹤科

黑颈鹤是我国特产的珍稀鹤类，繁殖区在青海、西藏、四川、甘肃、新疆等省区；越冬地在贵州、云南和西藏中南部。国外在不丹和印度存有极小的群。

◎张词祖／摄

Grus monacha 白头鹤

濒危等级　濒危(E)　BAI TOU HE

鹤形目　鹤科

别名：玄鹤、锅鹤、修女鹤

国内分布于长江下游、沿海各省及东北各省。国外分布于俄罗斯、日本、朝鲜、韩国。

◎张词祖／摄

丹顶鹤 *Grus japonensis*

DAN DING HE　濒危等级　濒危(E)

鹤形目　鹤科

别名：仙鹤、紫鹤

丹顶鹤是人们最熟悉的一种鹤。除日本、朝鲜、俄罗斯有少量分布以外，主要分布在我国。丹顶鹤的主要繁殖地为内蒙古、黑龙江、吉林和辽宁；主要越冬地是日本、朝鲜半岛中部和我国长江下游湖泊地区及沿海一带。

◎乔振忠／摄

Grus leucogeranus 白鹤

BAI HE

● 濒危等级　濒危(E)

鹤形目　鹤科

别名：西伯利亚鹤、黑袖鹤

国内分布于东北各省至长江中下游。繁殖地主要在俄罗斯的西伯利亚。冬季到我国、印度和伊朗越冬。

◎乔振忠／摄

赤颈鹤 *Grus antigone*

CHI JING HE　● 濒危等级　稀有(R)

鹤形目　鹤科

赤颈鹤的分布自印度经过东南亚至澳大利亚。主要繁殖于印度、缅甸，有的在我国云南西部和西南部越冬。

◎马晓峰／摄

鸨（所有种）*Otis spp.*

鹤形目 鸨科

分布于我国的鸨有大鸨、小鸨、波斑鸨。它们的分布区狭窄，数量十分稀少。现分别介绍如下：

大　鸨　**别名：地鹳、老鸨、羊须鸨**　繁殖于我国东北、内蒙古、新疆；在我国东部地区越冬。

小　鸨　**别名：地鹳**　国内仅分布于新疆。

波斑鸨　**别名：地鹳**　国内仅分布于新疆北部和西部及内蒙古。



◎李湘涛／摄

波斑鸨 *Otis undulata*

BO BAN BAO　●濒危等级　未定(I)

◎张词祖／摄

Otis tayda 大鸨

●濒危等级　易危(V)　DA BAO

遗鸥 *Larus relictus*

YI OU　●濒危等级　易危(V)

鸻形目 鸥科

别名：中亚鸥、钓鱼郎

国内繁殖于内蒙古，迁徙时经山西、河北、北京等地。国外分布于哈萨克斯坦和蒙古东部的一些湖泊中。

◎乔振忠／摄

◎李树忠　李艳明／摄

Testudo horsfieldi 四爪陆龟

SI ZHAO LU GUI

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 陆龟科

别名：草原龟、旱龟

我国有3种陆龟，即四爪陆龟、缅甸陆龟和凹甲陆龟。四爪陆龟国内分布于新疆西部。国外分布于伊朗、阿富汗、印度等地。

鼋 *Pelochelys bibroni*

YUAN

◎张词祖／摄

●濒危等级　野生绝灭(Ex)

龟鳖目 鳖科

别名：绿团鱼、癞头鼋

国内分布于云南、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等地，国外分布于由缅甸向南至菲律宾以及印度等地。

◎唐锡阳／摄

鳄蜥 *Shinisaurus crocodilurus*

E XI

●濒危等级　濒危(E)

蜥蜴目 鳄蜥科

别名：懒蛇、睡蛇、雷公蛇

鳄蜥在分类上属于独科独属独种。在世界上仅分布于我国广西大瑶山金秀瑶族自治县，故又称瑶山鳄蜥。

◎马晓峰／摄

巨蜥 *Varanus salvator*

JU XI

●濒危等级　濒危(E)或野生绝灭(Ex)

蜥蜴目 巨蜥科

巨蜥分布于南亚、东南亚及澳大利亚北部，约有20多种，我国只产一种。分布于广东、广西、云南及海南等地。

◎张词祖／摄

Python molurus 蟒

MANG

●濒危等级　濒危(E)

蛇亚目　蟒科

别名：黑尾蟒、南蛇、蚺蛇、琴蛇

蟒分布于亚洲南部。在我国分布于云南、贵州、福建、广东、广西、海南等地。

扬子鳄

Alligator sinensis

YANG ZI E

鳄目　鼍科

别名：中华鼍、土龙、猪婆龙

扬子鳄是我国的特产动物，分布于长江中下游一带，主要产于安徽、江苏、浙江和江西的局部地区。

●濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

中华鲟 *Acipenser sinensis*

●濒危等级　易危(V)　ZHONG HUA XUN

鲟形目 鲟科

别名：鳇鱼、鲟鲨、腊子

中华鲟是江海洄游性鱼类，主要分布于我国长江、珠江、钱塘江和黄河等大江中。目前，黄河、钱塘江均已绝迹，珠江数量极少，仅长江数量较多。

达氏鲟 *Acipenser dabryanus*

●濒危等级　易危(V)　DA SHI XUN

鲟形目 鲟科

别名：沙腊子、小腊子

主要分布于我国长江中上游的干支流的河口地区，以四川江段为主。

◎张词祖／摄



◎程国英／画

Psephurus gladius 白鲟

BAI XUN

●濒危等级　濒危(E)

鲟形目 匙吻鲟科

别名：象鱼、象鼻鱼、剑鱼、鲔

主要分布于我国长江、钱塘江，偶尔也进入沿江的大型湖泊中。

国家重点保护野生动物

二级

GUOJIA ZHONGDIAN
BAOHU YESHENG
DONGWU

短尾猴 *Macaca arctoides*

DUAN WEI HOU ●濒危等级 易危(V)

灵长目 猴科

别名：红面猴、断尾猴、大青猴

国内分布于南部和西南部。国外分布于印度和中南半岛。

◎张词祖／摄

Macaca mulatta 猕猴

●濒危等级 易危(V) MI HOU

灵长目 猴科

别名：广西猴、恒河猴、黄猴

猕猴广泛分布于我国长江流域及以南各地区，在陕西、山西、河南、河北、青海、西藏有少量间断分布。国外分布于尼泊尔、印度、孟加拉、巴基斯坦、阿富汗和东南亚地区。

◎乔振忠／摄



藏酋猴

Macaca thibetana

●濒危等级　易危(V)　ZANG QIU HOU

灵长目　猴科

别名：四川断尾猴、青猴、红面猴

藏酋猴是我国的特产猴类。主要分布于四川西部、北部，西藏及甘肃南部；陕西、湖北、湖南、安徽、江西、浙江、福建、广东、广西、云南等省区也有分布。

◎李树忠　李艳明／摄

◎张词祖／摄

穿山甲

Manis pentadactyla

●濒危等级　易危(V)　CHUAN SHAN JIA

鳞甲目　鲮鲤科

别名：：凌鲤

国内分布于南方各省。国外分布于缅甸、锡金、尼泊尔等地。

豺 *Cuon alpinus*

CHAI ●濒危等级 易危(V)

食肉目 犬科

别名：红狼、豺狗、棒子狗、亚洲野狗

豺在我国分布广泛，除台湾、海南及南海诸岛外，其余省份均有分布，但数量稀少。国外分布于亚洲东部、南部，北至西伯利亚。

◎张词祖／摄

Selenarctos thibetanus 黑熊

●濒危等级 易危(V) HEI XIONG

食肉目 熊科

别名：狗熊、黑瞎子

黑熊的分布地区较广，在我国几乎遍布南北各地。国外分布于亚洲大陆及其邻近岛屿。

◎张词祖／摄

◎郭玉民／摄

棕熊（包括马熊）*Ursus arctos (U.a.pruinosus)*

ZONG XIONG

●濒危等级　濒危(E)

食肉目 熊科

别名：马熊、人熊

国内分布于黑龙江、吉林、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、贵州等省区。国外分布于欧亚和北美等地。

小熊猫 *Ailurus fulgens*

XIAO XIONG MAO　●濒危等级　易危(V)

食肉目 浣熊科

别名：小猫熊、九节狼、金狗

国内分布于四川、西藏、青海、陕西、贵州、云南等省区。国外分布于印度、尼泊尔、锡金和缅甸等地。

◎郭玉民／摄

◎李湘涛／摄

Martes foina 石貂

SHI DIAO

●濒危等级　易危(V)

食肉目 鼬科

别名：榉貂、岩貂、扫雪

国内主要分布于西北、华北和西南多省区，国外分布于欧亚大陆。

Martes flavigula 黄喉貂

HUANG HOU DIAO

食肉目 鼬科

别名：青鼬、蜜狗、黄猄、黄颈黄鼬

黄喉貂在我国分布较广，几乎遍及南北各地。国外分布于俄罗斯东部、朝鲜半岛、印度和东南亚等地。

◎李湘涛／摄

◎张词祖／摄

Lutra lutra 水獭

●濒危等级　易危(V)　SHUI TA

水獭（所有种） *Lutra spp.*

食肉目 鼬科　　**别名：獭、獭猫、鱼猫**

水獭分布于欧洲、亚洲和非洲北部，我国南北各地都有分布。

分布于我国的水獭有3种，即普通水獭、江獭和小爪水獭。3种水獭的栖息环境和分布地域不同，但外形十分相似，容易混淆。

水獭　主要栖息在河流和湖泊一带。

小爪水獭　分布于亚洲南部，在我国分布于广东、广西、海南、云南、西藏和福建的局部地区。

Aonyx cinerea 小爪水獭

XIAO ZHUA SHUI TA

●濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

◎岩　昆／摄

斑林狸 *Prionodon pardicolor*

BAN LIN LI

●濒危等级　濒危(E)

食肉目 灵猫科

别名：斑灵狸、虎灵猫、点斑灵狸

国内分布于西藏、云南、四川、贵州、广东、广西等省区。分布范围虽广，但数量非常稀少。国外分布于尼泊尔、不丹、锡金、印度、缅甸、越南、老挝等地。

◎张词祖／摄

大灵猫 *Viverra zibetha*

DA LING MAO

●濒危等级　易危(V)

食肉目 灵猫科

别名：九节狸、九江狸、灵狸、麝香猫

国内主要分布于南方各省。国外分布于印度、孟加拉、尼泊尔和中南半岛。

小灵猫

Viverricula indica

XIAO LING MAO

食肉目 灵猫科

别名：七间狸、香狸子、香猫、笔猫

国内广泛分布于华东、华南和西南。国外分布于印度、斯里兰卡和印度尼西亚等地。

◎张词祖／摄

草原斑猫

Felis silvestris

CAO YUAN BAN MAO

食肉目 猫科

别名：野猫、土狸子

国内分布于新疆、甘肃、宁夏、四川、云南等省区。国外广泛分布于欧洲、非洲大部分和亚洲中部与西部。

●濒危等级 濒危(E)

◎程国英／画

◎张词祖／摄

荒漠猫 *Felis bieti*

HUANG MO MAO

●濒危等级　濒危(E)

食肉目　猫科

别名：草猫、漠猫、草狯猁

荒漠猫是我国十分珍贵稀少的特产动物。分布于四川、青海、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古、新疆等省区。

◎张词祖／摄

Felis chaus 丛林猫

CONG LIN MAO

●濒危等级　稀有(R)

食肉目　猫科

别名：狸猫、麻狸

国内仅分布于云南和西藏南缘，数量非常稀少。国外分布于亚洲中西部与南部。

Felis lynx 猞猁

SHE LI

●濒危等级　易危(V)

食肉目　猫科

别名：猞猁猻、马猞猁、羊猞猁、林狍

猞猁广泛分布于欧洲和亚洲北部，在我国分布于北方各省和青藏高原。

◎马晓峰／摄

◎张词祖／摄

Felis manul 兔狲

TU XUN

●濒危等级　易危(V)

食肉目　猫科

别名：羊猞猁、乌伦、“玛瑙勒”（蒙）

国内分布于新疆、西藏、青海、四川、甘肃、内蒙古、河北等地。国外分布于中亚诸国及蒙古。

◎李树忠　李艳明／摄

Felis temminckі **金猫** JIN MAO

●濒危等级　易危(V)

食肉目　猫科

别名：原猫、狸豹、芝麻豹、红春豹

国内分布于陕西、甘肃、四川、河南、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南、西藏等省区。国外分布于南亚和东南亚。

Felis viverrinus **渔猫** YU MAO

食肉目　猫科

国内仅于台湾省有过纪录。国外分布于尼泊尔、印度、缅甸、泰国至印度尼西亚。

◎程国英／画



海豹 *Phoca largha*

HAI BAO

●濒危等级　易危(V)

◎张词祖／摄

鳍足目（所有种） Pinnipedia

鳍足目动物是适应水栖生活的食肉哺乳动物。分布于南北半球寒带和温带海洋。鳍足目动物主要种类有海狗、海豹、海狮、海象等。

海豹　栖息在太平洋和大西洋，全世界都有分布。海豹是我国海域数量较多的种类，多见于渤海和黄海。

海狗　栖息于北太平洋，在我国偶见于黄海和东海。

海狮　海狮在我国偶见于东海。

海狮 *Eumetopias jubata*

HAI SHI

◎张词祖／摄

虎鲸 *Orcinus orca*

HU JING

鲸目 巨头鲸科

别名：逆戟鲸

◎张词祖／摄

其他鲸类（一级保护之外）(Cetacea)

鲸类分布于全世界各海洋。

分布于我国海域的鲸类有露脊鲸、灰鲸、蓝鲸、长须鲸、鳁鲸、小鳁鲸、座头鲸、抹香鲸、虎鲸、伪虎鲸、真海豚、宽吻海豚、江豚等。

◎李湘涛／摄

江豚 *Neophocaena phocaenoides*

JIANG TUN

● 濒危等级　濒危(E)

鲸目　鼠海豚科

别名：江猪、海猪、海和尚

在我国分布于各海区沿岸及各大河口，在长江中的分布可达湖北宜昌一带，偶有少数进入洞庭湖内。



海豚 *Delphinus delphis*

HAI TUN

鲸目　海豚科

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

林麝 *Moschus berezovskii*

LIN SHE

●濒危等级　濒危(E)

马麝 *Moschus chrysogaster*

MA SHE

●濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

麝（所有种） *Moschus spp.*

偶蹄目 麝科　　**别名：香獐、獐子**

分布于亚洲，大多数分布在我国。

麝究竟有几种，至今仍有争议，暂作如下5种，即原麝、林麝、马麝、黑麝、喜马拉雅麝。

林麝　国内分布于四川、西藏、甘肃、宁夏、陕西、湖北、湖南、贵州、云南、广西等省区。

马麝　国内分布于甘肃、青海、四川、宁夏、云南、西藏等省区。

Hydropotes inermis 河鹿

HE JI

●濒危等级　易危(V)

偶蹄目 鹿科

别名：獐、牙獐

国内分布于浙江、江苏、福建、湖北、湖南、安徽、广东、广西等省区。

◎李树忠　李艳明／摄

马鹿（包括白臀鹿）

Cervus elaphus (C.e.macneilli)

MA LU

偶蹄目 鹿科

别名：赤鹿、黄臀赤鹿、八叉鹿

国内分布于东北、内蒙古、西北、华北及西藏。国外分布于亚洲北部、中欧、西北非及北美等地。

●濒危等级 塔里木、宁夏和西藏亚种 濒危(E) 其他亚种 易危(V)

◎徐建民／摄

◎张词祖／摄

Cervus unicolor 水鹿

SHUI LU

●濒危等级 易危(V)

偶蹄目 鹿科

别名：水牛鹿、黑鹿、春鹿

国内分布于华南、西南、台湾和海南岛。国外分布于印度、斯里兰卡、中南半岛、印度尼西亚和菲律宾等地。

驼鹿 *Alces alces*

TUO LU ●濒危等级 易危(V)

偶蹄目 鹿科

别名：犴、堪达犴

国内分布于东北、新疆等地。国外分布于欧亚和北美大陆的北部。

◎张词祖／摄

黄羊 *Procapra gutturosa*

◎李树忠　李艳明／摄

HUANG YANG ●濒危等级 易危(V)

偶蹄目 牛科

别名：蒙古瞪羚、蒙古原羚

国内仅分布于内蒙古。国外分布于蒙古及俄罗斯西伯利亚南部。

◎张词祖／摄

藏原羚 *Procapra picticaudata*

ZANG YUAN LING

●濒危等级　易危(V)

偶蹄目 牛科

别名：原羚、藏黄羊、小羚羊、山黄羊

国内分布于西藏、新疆、青海、甘肃、四川、内蒙古等省区。

◎冯　刚／摄

鹅喉羚 *Gazella subgutturosa*

E HOU LING

●濒危等级　易危(V)

偶蹄目 牛科

别名：长尾黄羊、粗脖羊、瞪羚

国内分布于内蒙古及西北地区。国外分布于中亚地区。

◎张词祖／摄

鬣羚 *Capricornis sumatraensis*

LIE LING

●濒危等级　易危(V)

偶蹄目 牛科

别名：苏门羚、明鬃羊、岩驴

国内主要分布于黄河以南大部份省区以至西藏、四川、云南等地。国外分布于南亚及东南亚各国。

斑羚 *Naemorhedus goral*

BAN LING

●濒危等级　易危(V)

偶蹄目 牛科

别名：青羊、野山羊

国内分布于东北、华北、西北、华南和西南等省区，国外分布于印度、尼泊尔、缅甸及俄罗斯的西伯利亚。

◎张词祖／摄

岩羊 *Pseudois nayaur*

◎张词祖／摄

YAN YANG

●濒危等级　易危(V)

偶蹄目 牛科

别名：崖羊、石羊、青羊、蓝羊

国内分布于云南、四川、西藏、新疆、青海、甘肃、陕西、宁夏、内蒙古等省区。国外分布于尼泊尔、锡金和克什米尔等地区。

◎冯　刚／摄

Ovis ammon 盘羊

PAN YANG

●濒危等级　濒危(E)

偶蹄目 牛科

别名：大头弯羊、大角羊、大头羊

国内分布于西藏、新疆、四川、青海、甘肃、陕西、内蒙古等省区。国外分布于俄罗斯、蒙古、尼泊尔及克什米尔等地。

◎李树忠　李艳明／摄

雪兔 *Lepus timidus*

XUE TU

●濒危等级　易危(V)

兔形目 兔科

别名：白兔、变色兔

雪兔分布于北极及其附近的寒带地区，在我国分布于新疆、黑龙江、内蒙古等省区。

◎程国英／画

Lepus peguensis hainanus 海南兔

HAI NAN TU

●濒危等级　易危(V)

兔形目 兔科

别名：草兔

国内仅分布于海南省，是海南省的特产。

塔里木兔 *Lepus yarkandensis*

TA LI MU TU ●濒危等级 易危(V)

兔形目 兔科

别名：莎车兔

仅分布于新疆塔里木盆地及罗布泊低地。

◎程国英／画

巨松鼠 *Ratufa bicolor*

JU SONG SHU ●濒危等级 易危(V)

啮齿目 松鼠科

别名：树狗、藤狸、黑果狸、黑狸

国内分布于云南、广西和海南等省区。国外广泛分布于亚洲南部。

◎马晓峰／摄

角䴙䴘 *Podiceps auritus*

JIAO PI TI

䴙䴘目 䴙䴘科

别名：王八鸭子、水驴子、水葫芦

国内分布于东北、西北、华北和长江下游等地。国外分布于北美洲、欧洲北部、地中海和亚洲北部。

◎程国英／画

赤颈䴙䴘 *Podiceps grisegena*

CHI JING PI TI

䴙䴘目 䴙䴘科

别名：王八鸭子

国内分布于内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、天津、福建、广东等省区，国外分布于全北区。

◎程国英／画

鹈鹕（所有种）*Pelecanus spp.*

鹈形目 鹈鹕科　　别名：塘鹅、伽蓝鸟、淘河鸟

鹈鹕科共有8种鹈鹕，分布在欧洲、亚洲、非洲、北美洲等地的温暖海岸地带。我国只产2种鹈鹕，即白鹈鹕和斑嘴鹈鹕，它们通常在新疆罗布泊一带繁殖，在东部沿海各省越冬。

◎张词祖／摄

白鹈鹕 *Pelecanus onocrotalus*

BAI TI HU

● 濒危等级　未定(I)

斑嘴鹈鹕 *Pelecanus philippensis*

BAN ZUI TI HU

◎张词祖／摄

Sula leucogaster 褐鲣鸟

●濒危等级　易危(V)　HE JIAN NIAO

◎张词祖／摄

鲣鸟（所有种）*Sula spp.*

鹈形目　鲣鸟科

鲣鸟科共有9种鲣鸟，主要分布在热带和温带海洋的岛屿和沿岸地区。分布于我国的鲣鸟有2种，即红脚鲣鸟和褐鲣鸟，主要分布于海南、台湾、福建、广东等省。

海鸬鹚 *Phalacrocorax pelagicus*

HAI LU CI

鹈形目　鸬鹚科

别名：乌鹈

海鸬鹚分布于我国黑龙江、吉林、辽宁、福建、广东、台湾等省。

◎程国英／画

黄嘴白鹭 *Egretta eulophotes*

HUANG ZUI BAI LU

● 濒危等级　濒危(E)

鹳形目　鹭科

别名：塘白鹭、白老鹳、白老

鹭科鸟，广泛分布于南北纬60度间的大陆各处。我国产20种，全国各地都有分布，但以东南沿海各地较多。黄嘴白鹭分布于吉林、辽宁、山东、河南、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等省区。

◎张词祖／摄

Egretta sacra 岩鹭

● 濒危等级　稀有(R)　YAN LU

鹳形目　鹭科

国内分布于浙江、福建、广东、海南、台湾等省。

◎程国英／画

海南虎斑鸦

Gorsachius magnificus

HEI NAN HU BAN JIAN

鹳形目 鹭科

别名：白耳夜鹭

是我国特产鸟类，数量极为稀少。曾分布于浙江、安徽、福建、广西和海南等省区，现仅见于广西南部，其他地区几十年来未见报道。

● 濒危等级　濒危(E)

◎李湘涛／摄

小苇鸦

Ixobrychus minutus

XIAO WEI JIAN

鹳形目 鹭科

国内分布于新疆。

◎张词祖／摄

彩鹳

Mycteria leucocephala

●濒危等级　国内绝迹(Et)　CAI GUAN

鹳形目　鹳科

别名：白头鹳鹳

国内主要分布于四川、河北、江苏、福建、广东、广西、云南、海南、西藏等省区。国外分布于自印度到中南半岛。

20世纪50年代后国内未见报道。

◎郭玉民／摄

◎张词祖／摄

白鹮

Threskiornis aethiopicus

●濒危等级　稀有(R)　BAI HUAN

鹳形目　鹮科

别名：黑头白鹮、白油老鹳

白鹮繁殖于我国黑龙江，在福建、广东、海南等省越冬。国外分布于亚洲、非洲及太平洋西南部。

黑鹮 *Pseudibis papillosa*

HEI HUAN ● 濒危等级 未定(I)

鹳形目 鹮科

别名：东方黑鹮、疣头鹮

国内仅偶见于云南西南部，数量极为稀少。国外仅分布于印度北部。

◎郭玉民／摄

彩鹮 *Plegadis falcinellus*

◎张词祖／摄

CAI HUAN

鹳形目 鹮科

国内偶见于上海以南至福建沿海岛屿。国外除北欧和北美外，分布于各大洲的湖泊、沼泽地带。

◎张词祖 / 摄

Platalea leucorodia 白琵鹭

BAI PI LU

●濒危等级　易危(V)

鹳形目 鹮科

别名：琵琶鹭、匙嘴鹭

国内分布于东北、华北及西北地区，在长江下游及东南沿海地区越冬。国外分布于亚洲及南欧至非洲。

Platalea minor 黑脸琵鹭

HEI LIAN PI LU

●濒危等级　濒危(E)

鹳形目 鹮科

别名：黑面琵鹭、小琵鹭、匙嘴鹭

国内分布于辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、贵州、广东、广西、海南、台湾、香港等省区。

◎张词祖 / 摄



◎张词祖／摄

红胸黑雁 *Branta ruficollis*

HONG XIONG HEI YAN

雁形目 鸭科

别名：苍雁、赤胸雁

偶见于我国湖南洞庭湖及广西南宁等处，为冬时迷鸟。繁殖于俄罗斯北部，冬季迁徙到里海南部和咸海一带。

白额雁 *Anser albifrons*

BAI E YAN

雁形目 鸭科

别名：大雁、石雁

国内分布于东北、新疆、西藏、东部沿海各省，国外广泛分布于北半球。

◎张词祖／摄

◎乔振忠／摄

疣鼻天鹅 *Cygnus olor*

YOU BI TIAN E

●濒危等级　易危(V)

天鹅（所有种）*Cygnus spp.*

雁形目 鸭科

天鹅属于鸭科天鹅属，天鹅属有7种，分布在亚洲、欧洲、南北美洲、澳洲等地区。我国有3种，即大天鹅、小天鹅和疣鼻天鹅。

疣鼻天鹅　它是由其嘴基具黑色疣状突起而得名。又由于其鸣声沙哑而低沉，故又称“哑天鹅”。

大天鹅　它的鸣声响亮，颇又名“咳声天鹅”。

小天鹅　除体型稍小外，其嘴和颈均显得短些，故又名“短嘴天鹅”。

大天鹅 *Cygnus cygnus*

DA TIAN E

●濒危等级　易危(V)

◎乔振忠／摄



小天鹅 *Cygnus columbianus*

XIAO TIAN E

●濒危等级　易危(V)

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

Aix galericulata 鸳鸯

YUAN YANG

● 濒危等级　易危(V)

雁形目　鸭科

别名：匹鸟、官鸭

鸳鸯有两种：林鸳鸯分布于北美洲，鸳鸯分布于亚洲东部。鸳鸯在我国繁殖于东北和内蒙古，冬季迁往长江中下游、东南、西南等地。

高山兀鹫
Gyps himalayensis

GAO SHAN WU JIU

别名：坐山雕

国内分布于甘肃、青海、宁夏、四川、西藏、新疆等省区。

●濒危等级　稀有(R)

◎张词祖／摄

其他鹰类（一级保护之外）(Accipitridae)

隼形目 鹰科

隼形目鸟是世界性分布的鸟，从南北极到赤道，从海洋到陆地，从高山到平地，从森林到草原，到处都有它们的踪迹。

分布于我国的鹰科鸟类全部受到国家保护，除被列为一级保护动物的金雕、白肩雕、玉带海雕、白尾海雕、虎头海雕、白背兀鹫、胡兀鹫之外的其他鹰类，均被列为二级保护动物。

鹰是人们最熟悉的鸟类之一，被称为鸟中之王。人们赞赏鹰的体魄、鹰的勇敢和鹰的无坚不摧的力量。

Elanus caeruleus 黑翅鸢

HEI CHI YUAN

国内分布于河北、浙江、云南、广西等地。

●濒危等级　易危(V)

◎马晓峰／摄

（幼鸟）►

◎张词祖／摄

蜂鹰 *Pernis ptilorhynchus*

FENG YING

别名：凤头蜂鹰

国内分布于内蒙古、东北、河北、山西、青海、新疆、山东、江苏、华南、西南等地。

●濒危等级　易危(V)

Milvus korschun 鸢

YUAN

别名：黑鸢、鹞鹰、老鹰

国内分布几乎遍及各地，但数量稀少。

◎郭玉民／摄

Haliastur indus 栗鸢

●濒危等级　稀有(R)　LI YUAN

别名：红老鹰

国内分布于西藏、浙江、山东、江西、湖北、云南、广东、广西、福建等地。较为罕见。

◎张词祖／摄

苍鹰 *Accipiter gentilis*

CANG YING

别名：黄鹰

国内除海南外，各地都有分布。

◎张词祖／摄

赤腹鹰 *Accipiter soloensis*

CHI FU YING

别名：鸽子鹰

国内分布于西南、华南、华北和海南、台湾等地。

◎张词祖／摄

雀鹰 *Accipiter nisus*

QUE YING

别名：雀鹰子、鹞、雀儿鹰

国内各省均有分布。夏季栖息在山地森林，冬至丘陵平原。

◎郭玉民／摄

Accipiter virgatus 松雀鹰

SONG QUE YING

别名：松子鹰

国内分布遍及全国东部、南部地区。

◎张词祖／摄

棕尾鵟

Buteo rufinus

ZONG WEI KUANG

国内分布于甘肃、新疆、西藏、青海、四川等地。

●濒危等级　稀有(R)

◎张词祖／摄

Buteo hemilasius 大鵟

DA KUANG

别名：花豹

国内分布于东北、内蒙古、西北、华北和华南等地。

◎郭玉民／摄

普通鵟 *Buteo buteo*

PU TONG KUANG

别名：土豹、鸡姆鹞

国内分布几乎遍及全国各地。

◎张词祖／摄

灰脸鵟鹰

Butastur indicus

HUI LIAN KUANG YING

国内分布于东北、华北和东南沿海各省。

●濒危等级　稀有(R)

◎吴秀山／摄

草原雕

Aquila rapax

CAO YUAN DIAO

●濒危等级　易危(V)

别名：大花雕、角鹰

国内分布于新疆、青海、西藏、内蒙古、黑龙江等地，迁徙时见于甘肃、吉林、辽宁及河北。国外分布于亚细亚中部、蒙古、印度、缅甸等地。

◎郭玉民／摄

◀(幼鸟)

◎张词祖／摄

Aquila clanga 乌雕

WU DIAO

●濒危等级　稀有(R)

别名：小花皂雕、花皂雕、花雕

国内分布于新疆、内蒙古、东北；在浙江以南沿海各省越冬

Aegypius monachus 秃鹫

TU JIU

●濒危等级　易危(V)

别名：坐山雕、狗头鹫

国内分布于新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古及四川等省区。

◎张词祖／摄

白腹鹞
Circus spilonotus
BAI FU YAO

国内分布于内蒙古、东北、河北、北京、天津、甘肃、青海、江苏、上海、浙江、山东、江西、湖北、四川、华南。

◎郭玉民／摄

Spilornis cheela 蛇雕
●濒危等级　易危(V)　SHE DIAO

国内分布于安徽、贵州、云南、广东、海南、广西、福建、台湾等省区。数量稀少。

◎马晓峰／摄

Pandion haliaetus 鹗

●濒危等级　稀有(R)　E

别名：鱼鹰、鱼雕

国内分布于内蒙古、东北、华北、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏等地。迁徙时见于东部沿海，为华南沿海至台湾冬候鸟。数量稀少。

◎徐建民／摄

隼科（所有种）Falconidae

隼形目 隼科

我国有隼科鸟12种，即：小隼、红脚小隼、阿尔泰隼、猎隼、矛隼、游隼（花梨鹰）、燕隼（青条子）、猛隼、灰背隼（朵子、鸽子鹰）、红脚隼（青燕子、白指甲鹞）、黄爪隼、红隼。

小隼、红脚小隼、红脚隼、黄爪隼、红隼是食虫益鸟，猎隼为食鼠益鸟。

Falco cherrug 猎隼

LIE SUN　●濒危等级　易危(V)

别名：兔虎

国内分布于新疆、青海、甘肃、四川、内蒙古、西藏等地。冬季南迁。

◎张词祖／摄

Falco peregrinus 游隼

YOU SUN

别名：花梨鹰

国内分布于东北、华北及长江以南至广东。

◎张词祖／摄



燕隼 *Falco subbuteo*

YAN SUN

别名：青条子

国内除海南省外，各省区都有分布。

◎郭玉民／摄

Falco vespertinus 红脚隼
HONG JIAO SUN

别名：青燕子、白指甲鹞

国内除青海、新疆、西藏、浙江、安徽、广东、台湾外，各省区均有分布。

◎张词祖／摄

红隼 *Falco tinnunculus*
HONG SUN

别名：红鹰、茶隼

国内分布较广，几乎遍及各省区。

◎吴秀山／摄

◎李湘涛／摄

黑琴鸡 *Lyrurus tetrix*

HEI QIN JI

●濒危等级　易危(V)

鸡形目 松鸡科

别名：乌鸡、黑雷鸟、黑野鸡

国内分布于新疆、内蒙古、东北及河北北部等地。国外分布于欧洲、西伯利亚、蒙古北部及朝鲜东北部。

镰翅鸡 *Falcipennis falcipennis*

LIAN CHI JI　●濒危等级　濒危(E)

鸡形目 松鸡科

国内主要分布于东北黑龙江下游及小兴安岭一带。国外分布于俄罗斯西伯利亚。

◎程国英／画

◎李湘涛／摄

柳雷鸟 *Lagopus lagopus*

LIU LEI NIAO

● 濒危等级　未定(I)

鸡形目 松鸡科

别名：雪鸡、柳鸟、雷鸟

国内仅分布于黑龙江流域，数量极为稀少。国外分布很广，从北美洲北部到整个欧亚大陆北部的森林带和森林草原带，甚至冻原地带。

岩雷鸟 *Lagopus mutus*

YAN LEI NIAO ● 濒危等级　未定(I)

鸡形目 松鸡科

别名：雪鸡

国内仅分布于新疆阿尔泰山地区，数量稀少。国外分布很广，包括北美、欧亚的冻原地带，欧洲西部及斯堪的纳维亚半岛。

◎李湘涛／摄

Tetrastes bonasia 花尾榛鸡

HUA WEI ZHEN JI

鸡形目 松鸡科

别名：飞龙、树鸡、松鸡

国内分布于内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北等省区。国外广泛分布于欧亚大陆北部。

◎张词祖／摄

雪鸡（所有种） *Tetraogallus spp.*

鸡形目 雉科

分布于我国的雪鸡有淡腹雪鸡和暗腹雪鸡。

淡腹雪鸡 **别名：雪鸡、藏雪鸡** 国内分布于新疆、西藏、甘肃、青海、四川等省区。

暗腹雪鸡 **别名：雪鸡、高山雪鸡** 国内分布于新疆、西藏、甘肃、青海等省区。

Tetraogallus tibetanus 淡腹雪鸡

DAN FU XUE JI

◎冯 刚／摄

◎张词祖／摄

Tragopan temminckii 红腹角雉

HOG FU JIAO ZHI

●濒危等级　易危(V)

鸡形目　雉科

别名：灰斑角雉、黄连鸡、哇哇鸡

国内分布于甘肃、四川、西藏、云南、贵州、广西、湖北等省区。国外分布于印度、缅甸、越南等地。

Ithaginis cruentus 血雉

XUE ZHI

鸡形目 雉科

别名：松花鸡、松鸡子、笋壳鸡

国内分布于四川、甘肃、陕西、青海、西藏、云南等省区。国外仅见于尼泊尔、锡金、不丹。

●濒危等级 易危(V)

◎张词祖／摄

◎郭玉民／摄

Crossoptilon crossoptilon 白马鸡

BAI MA JI

●濒危等级 易危(V)

鸡形目 雉科

别名：藏马鸡、雪雉、大雪鸡

白马鸡是我国的特产，分布于西藏、青海、四川、云南等省区。

藏马鸡

Crossoptilon harmani

●濒危等级　稀有(R)　ZANG MA JI

鸡形目　雉科

别名：哈曼马鸡

藏马鸡是我国的特产，仅分布于西藏。

专家建议列入国家二级重点保护野生动物名录。

◎吴秀山／摄

◎乔振忠／摄

蓝马鸡

Crossoptilon auritum

●濒危等级　易危(V)　LAN MA JI

鸡形目　雉科

别名：马鸡、松鸡、角鸡

蓝马鸡是我国的特产，分布于四川、青海、甘肃、宁夏等省区。

黑鹇 *Lophura leucomelana*

HEI XIAN ●濒危等级　稀有(R)

鸡形目 雉科

别名：鸺雉

国内分布于西藏、云南等省区。

◎张词祖／摄

白鹇 *Lophura nycthemera*

◎马晓峰／摄

BAI XIAN

鸡形目 雉科

别名：白雉、银雉、白鹇鸡、越禽

国内广泛分布于南方各省。国外分布于中南半岛。



◎马晓峰／摄

Gallus gallus 原鸡

YUAN JI

●濒危等级　易危(V)

鸡形目 雉科

别名：茱花鸡、茶花鸡、山鸡

原鸡属有4种，即绿领原鸡、黑尾原鸡、灰纹原鸡和红原鸡。分布在亚洲南部。我国只产红原鸡一种，分布于云南、广东、广西、海南等省区。

勺鸡 *Pucrasia macrolopha*

SHAO JI

鸡形目 雉科

别名：柳叶鸡、山麻鸡、角鸡、松鸡

国内分布于西藏、云南，往北至甘肃、陕西、辽宁，往东至广东、浙江、福建等省区。国外分布于阿富汗向东至尼泊尔。

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

白冠长尾雉 *Syrmaticus reevesii*

BAI GUAN CHANG WEI ZHI

● 濒危等级　濒危(E)

● 鸡形目 雉科

● 别名：地鸡、长尾鸡、翅鸡

长尾雉属有5种，除赤颈长尾雉分布在日本外，其余4种均分布于我国。白冠长尾雉分布于我国中部山地。

◎马晓峰／摄

白腹锦鸡 *Chrysolophus amherstiae*

BAI FU JIN JI

●濒危等级　易危(V)

别名：铜鸡、银鸡、笋鸡

锦鸡（所有种） *Chrysolophus spp.*

鸡形目 雉科

锦鸡属仅有两种，即白腹锦鸡和红腹锦鸡。前者分布于我国西南和缅甸东北部；后者分布于我国中部和中西部山区，以秦岭和西秦岭山脉最多，陕西省宝鸡市就是以盛产红腹锦鸡而得名。红腹锦鸡的分布区在白腹锦鸡栖息地东北，基本不相重叠，但在接触的地方有杂交现象；而且两种雌鸟的形态，卵的颜色、形状和大小，孵化期，雏鸟形态等都很相像，说明两种锦鸡亲缘关系很近。

◎张词祖／摄

Chrysolophus pictus 红腹锦鸡

●濒危等级　易危(V)　HONG FU JIN JI

别名：金鸡、锦鸡、红鸡

◎乔振忠／摄

灰鹤 *Grus grus*

HUI HE

鹤形目 鹤科

别名：玄鹤、番薯鹤

灰鹤是鹤类中数量最多最常见的一种。在我国繁殖于新疆西部、内蒙古和黑龙江北部，在长江以南至海南省越冬。在国外广泛分布于欧洲、亚洲和北非。

沙丘鹤 *Grus canadensis*

SHA QIU HE

鹤形目 鹤科

别名：加拿大鹤、棕鹤

沙丘鹤主要分布于从古巴经美国到加拿大北部和西伯利亚东北部。偶见于我国，为迷鸟。

◎郭玉民／摄

白枕鹤 *Grus vipio*

BAI ZHEN HE ●濒危等级 易危(V)

鹤形目 鹤科

别名：红面鹤、白顶鹤

白枕鹤在我国繁殖于内蒙古、黑龙江、吉林等省区，越冬于长江中下游的江苏、安徽、湖南、江西以及福建等省。国外繁殖于俄罗斯，冬季见于日本及朝鲜半岛。

◎张词祖／摄

蓑羽鹤 *Anthropoides virgo*

●濒危等级 未定(I) SUO YU HE

鹤形目 鹤科

别名：闺秀鹤

国内繁殖于新疆、内蒙古、黑龙江、吉林等省区，在西藏南部越冬。

◎张词祖／摄

长脚秧鸡 *Crex crex*

CHANG JIAO YANG JI

鹤形目 秧鸡科

分布于我国新疆、西藏等地。

◎程国英／画

棕背田鸡 *Porzana bicolor*

ZONG BEI TIAN JI

鹤形目 秧鸡科

国内分布于西藏、四川、贵州、云南等省区。数量稀少。

●濒危等级　稀有(R)

◎程国英／画

姬田鸡 *Porzana parva*

JI TIAN JI

鹤形目 秧鸡科

分布于我国新疆。

◎程国英／画

花田鸡 *Coturnicops noveboracensis*

HUA TIAN JI

鹤形目 秧鸡科

国内繁殖于内蒙古，迁徙经我国东部，冬候鸟见于江西、福建、广东等省。

◎程国英／画

铜翅水雉 *Metopidius indicus*

TONG CHI SHUI ZHI

鸻形目 雉鸻科

国内分布于云南省西南部。数量十分稀少。

● 濒危等级 稀有(R)

◎程国英／画

Numenius borealis 小杓鹬

XIAO SHAO YU

鸻形目 鹬科

别名：小油老罐子

国内分布于东北、内蒙古、向南经沿海各省至广东、海南、台湾等省。

◎张词祖／摄

小青脚鹬 *Tringa guttifer*

XIAO QING JIAO YU

鸻形目 鹬科

别名：诺氏鹬

国内分布于东南沿海各省及海南、台湾。

● 濒危等级 未定(I)

◎程国英／画

Glareola lactea 灰燕鸻

HUI YAN HENG

鸻形目 燕鸻科

国内分布于云南省。

◎程国英／画

Larus minutus 小鸥

XIAO OU

鸻形目 鸥科

国内分布于内蒙古、新疆、河北、江苏等省区。

◎程国英／画

黑浮鸥 *Chlidonias niger*

HEI FU OU

鸻形目 鸥科

国内分布于新疆等地。

◎程国英／画

Sterna aurantia 黄嘴河燕鸥

HUANG ZUI HE YAN OU

鸻形目 鸥科

国内分布于云南。

◎程国英／画

黑嘴端凤头燕鸥

Thalasseus zimmermanni

HEI ZUI DUAN FENG TOU YAN OU

鸻形目 鸥科

国内分布于山东沿海（夏候鸟）及福建、广东沿海一带（旅鸟）。

●濒危等级　易危(V)

◎程国英／画

黑腹沙鸡
Pterocles orientalis

HEI FU SHA JI

鸽形目 沙鸡科

别名：沙鸡、沙半鸡

国内仅见于新疆北部、西部。数量相当稀少。

● 濒危等级 未定(I)

◎程国英／画

绿鸠（所有种） *Treron spp.*

鸽形目 鸠鸽科

分布于我国的绿鸠共有 8 种，即见于云南、四川的针尾绿鸠，见于云南、四川、西藏的楔尾绿鸠，见于陕西、四川、贵州、广西、福建、海南、台湾等省区的红翅绿鸠，见于台湾的红顶绿鸠，见于云南的黄脚绿鸠，见于云南、海南的厚嘴绿鸠，见于云南西双版纳的灰头绿鸠，见于海南的橙胸绿鸠。

针尾绿鸠
Treron apicauda

ZHEN WEI Lü JIU

◎郭玉民／摄

◎张词祖／摄

楔尾绿鸠 *Treron sphenura*

XIE WEI Lü JIU

◎张词祖／摄

厚嘴绿鸠 *Treron curvirostra*

HOU ZUI Lü JIU

●濒危等级　易危(V)

黑颏果鸠 *Ptilinopus leclancheri*

HEI KE GUO JIU

鸽形目 鸠鸽科

别名：黑颏绿鸠、小绿鸠

国内分布于台湾省。

◎程国英／画

皇鸠（所有种）*Ducula spp.*

鸽形目 鸠鸽科

皇鸠属于鸠鸽科皇鸠属。分布于我国的皇鸠属鸟类有绿皇鸠和山皇鸠。

绿皇鸠 **别名：绿南鸠、大绿鸠** 国内分布于云南、广东、海南。

山皇鸠 **别名：灰头南鸠、栗背皇鸠、大山鸽** 国内分布于云南、海南等省。

山皇鸠 *Ducula badia*

SHAN HUANG JIU

●濒危等级 易危(V)

◎郭玉民／摄

斑尾林鸽
Columba palumbus

BAN WEI LIN GE

鸽形目 鸠鸽科

国内分布于新疆西部及天山。

◎程国英／画

鹃鸠（所有种）*Macropygia spp.*

鸽形目 鸠鸽科

分布于我国的鹃鸠有3种，即斑尾鹃鸠、棕头鹃鸠、乌鹃鸠，3种均为稀有种类。现分别介绍如下：

斑尾鹃鸠 别名：花斑咖追 国内分布于四川、云南、福建、广东、海南等省。

棕头鹃鸠 别名：小赤鹃鸠 国内仅见于云南省西双版纳。

乌 鹃 鸠 别名：赤鹃鸠 国内仅见于台湾省。

斑尾鹃鸠
Macropygia unchall

BAN WEI JUAN JIU

●濒危等级 稀有(R)

◎郭玉民／摄

◎张词祖／摄

红领绿鹦鹉 *Psittacula krameri*

HONG LING Lü YIING WU

● 濒危等级　未定(I)

别名：粉红领鹦鹉

国内分布于广东珠海万山群岛及附近沿海一带。

鹦鹉科（所有种）Psittacidae

鹦形目 鹦鹉科

鹦形目只有一科，即鹦鹉科，可分为8亚科82属332种。我国只有2属7种，即红领绿鹦鹉、绯胸鹦鹉、大绯胸鹦鹉、花头鹦鹉、灰头鹦鹉、长尾鹦鹉、短尾鹦鹉。

鹦鹉分布于亚洲南部、澳洲、非洲及中南美洲。澳洲种类最多，中南美洲最繁盛。

◎张词祖／摄

Psittacula alexandri 绯胸鹦鹉

FEI XIONG YING WU

●濒危等级　易危(V)

别名：鹦哥

国内分布于西藏、云南、广东、广西、海南等省区。

大绯胸鹦鹉

Psittacula derbiana

DA FEI XIONG YING WU

别名：大紫胸鹦鹉

国内分布于西藏、四川、云南、广西等省区。

●濒危等级　易危(V)



◎张词祖／摄

灰头鹦鹉 *Psittacula himalayana*

HUI TOU YING WU

国内分布于四川、云南。

◎张词祖／摄



◎张词祖／摄

花头鹦鹉 *Psittacula roseata*

HUA TOU YING WU ●濒危等级 稀有(R)

国内分布于云南、广西、广东，但十分罕见。

褐翅鸦鹃
Centropus sinensis
HE CHI YA JUAN

●濒危等级　易危(V)

◎李湘涛／摄

鸦鹃　（所有种）*Centropus spp.*

鹃形目 杜鹃科

分布于我国的鸦鹃有褐翅鸦鹃和小鸦鹃。

褐翅鸦鹃　别名：大毛鸡、毛鸡　国内分布于浙江、福建、广东、广西、贵州、云南、海南等省区。野外数量极为稀少。

小鸦鹃　别名：小毛鸡　国内分布于安徽、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南、海南、台湾等省区。



小鸦鹃 *Centropus toulou*
XIAO YA JUAN

●濒危等级　易危(V)

◎张词祖／摄

Tyto capensis 草鸮

CAO XIAO

别名：猴面鹰

国内分布于安徽、浙江、江西、湖南、福建、广东、广西、贵州、云南、台湾等省区。

◎马晓峰／摄

鸮形目（所有种）Strigiformes

鸮形目鸟类为夜行性猛禽，是数量相当大的一个类群。分布几乎遍及全球，但以东半球热带地区的种类最多。全世界有鸮形目鸟类134种，分为草鸮科和鸱鸮科，两科在我国均有分布，共27种。

鸮形目鸟类俗称猫头鹰，多数是著名的农林益鸟，每年能消灭大量害鼠，保护粮食。

Bubo bubo 雕鸮

DIAO XIAO

别名：鹫兔、恨狐、怪鸱、角鸱

国内分布较广，几乎遍及各地。

●濒危等级　稀有(R)

◎张词祖／摄

Otus scops 红角鸮

HONG JIAO XIAO

别名：夜猫子、聒聒鸟子

国内除青藏高原、内蒙古草原及海南外，各省区均有分布。

◎张词祖／摄

领角鸮 *Otus bakkamoena*

LING JIAO XIAO

别名：毛脚鸮鹞、光足鸮鹞

国内分布于东北、华北、西南、华中及华南部分地区。

◎郭玉民／摄

Bubo nipalensis 林雕鸮

LIN DIAO XIAO

别名：林鹰鸮

国内分布于四川和云南，为罕见的留鸟，数量十分稀少。

● 濒危等级　未定(I)

◎张词祖／摄

褐鱼鸮 *Ketupa zeylonensis*

HE YU XIAO

别名：酱色鱼鸮

国内分布于云南南部、广东、广西、海南等地。

◎郭玉民／摄

雪鸮 *Nyctea scandiaca*

◎张词祖／摄

XUE XIAO

别名：白鸮，白夜猫子

国内分布于黑龙江、辽宁、河北、陕西、新疆等省区。

◎马晓峰／摄

领鸺鹠 *Glaucidium brodiei*

LING XIU LIU

别名：小鸺鹠、衣领小鸮

国内分布于甘肃南部、陕西南部、河南、江苏南部，及以南各地。

斑头鸺鹠 *Glaucidium cuculoides*

BAN TOU XIU LIU

别名：横纹鸺鹠、猫王鸟

国内分布于甘肃、陕西、河南、安徽、江西、湖南、山东、浙江、江苏、广东、广西、贵州、云南、西藏等省区。

◎张词祖／摄

◎郭玉民／摄

鹰鸮 *Ninox scutulata*

YING XIAO

别名：褐鹰鸮、青叶鸮、乌猫王

国内分布于东部和南部，从黑龙江、辽宁东部，西南到四川、云南，东南至台湾省等广大地区。

褐林鸮 *Strix leptogrammica*

HE LIN XIAO

别名：木鸮、森鸮

国内分布于东北、华北、华南、西南等地。

◎张词祖／摄

Strix uralensis 长尾林鸮

CHANG WUI LIN XIAO

别名：东方乌拉山枭

国内分布于东北、内蒙古、甘肃、青海、四川等地。

●濒危等级　稀有(R)

◎郭玉民／摄

◎马晓峰／摄

长耳鸮 *Asio otus*

CHANG ER XIAO

别名：猫头鹰、夜猫子

国内分布于黑龙江、辽宁、内蒙古、青海，冬季几乎遍布全国各地。

Asio flammeus 短耳鸮

DUAN ER XIAO

别名：短耳猫

国内分布于东北的西北部，冬季迁徙时几乎遍及我国各地。

◎马晓峰／摄

鬼鸮 *Aegolius funereus*

GUI XIAO

国内仅分布于黑龙江、甘肃、新疆等地。

● 濒危等级　未定(I)

◎郭玉民／摄

灰喉针尾雨燕

Hirundapus cochinchinensis

HUI HOU ZHEN WEI YU YAN

雨燕目 雨燕科

国内分布于海南省及南海诸岛。

◎程国英／画



Hemiprocne longipennis 凤头雨燕

FENG TOU YU YAN

雨燕目 凤头雨燕科

国内分布于云南西部及南部。

◎程国英／画

橙胸咬鹎

Harpactes oreskios

CHENG XIONG YAO JUAN

咬鹎目 咬鹎科

国内分布于云南省南部。数量十分稀少。国外分布于中南半岛及印度尼西亚。

●濒危等级　稀有(R)

◎程国英／画

蓝耳翠鸟
Alcedo meninting
LAN ER CUI NIAO

佛法僧目 翠鸟科

国内分布于云南省。

◎程国英／画

鹳嘴翠鸟
Pelargopsis capensis
GUAN ZUI CUI NIAO

佛法僧目 翠鸟科

别名：鹳嘴翡翠

国内分布于云南省。

◎程国英／画

黑胸蜂虎
Merops leschenaulti
HEI XIONG FENG HU

佛法僧目 蜂虎科

国内仅分布于云南、广西。

◎程国英／画

绿喉蜂虎
Merops orientalis
Lü HOU FENG HU

佛法僧目 蜂虎科

国内仅分布于云南、广西、海南。

◎程国英／画

棕颈犀鸟
Aceros nipalensis
ZONG JING XI NIAO

●濒危等级　稀有(R)

◎张词祖／摄

犀鸟科（所有种）Bucerotidae

佛法僧目　犀鸟科

分布于我国的犀鸟有白喉犀鸟、棕颈犀鸟、花冠皱盔犀鸟、冠斑犀鸟、双角犀鸟。

白喉犀鸟　别名：褐犀鸟　国内仅分布于云南西南部，数量稀少。

棕颈犀鸟　别名：无斑犀鸟　国内分布于云南西南部和西藏东南部，数量稀少。

花冠皱盔犀鸟　标本采自云南西南部，西藏东南部也可能有分布。

冠斑犀鸟　别名：斑犀鸟　国内分布于云南南部、西藏东南部及广西南部。

双角犀鸟　别名：大斑犀鸟　国内分布于云南西南部，数量稀少。

花冠皱盔犀鸟
Aceros undulatus
HUA GUAN ZHOU KUI XI NIAO

◎张词祖／摄

冠斑犀鸟

Anthracoceros coronatus

GUAN BAN XI NIAO

●濒危等级　易危(V)

◎郭玉民／摄



双角犀鸟

Buceros bicornis

SHUANG JIAO XI NIAO

●濒危等级　濒危(E)

◎张词祖／摄

白腹黑啄木鸟

Dryocopus javensis

BAI FU HEI ZHUO MU NIAO

鸮形目 啄木鸟科

国内分布于四川、云南等省。数量稀少。

●濒危等级　稀有(R)

◎李湘涛／摄

八色鸫科（所有种）Pittidae

雀形目　八色鸫科

全世界有八色鸫科鸟类25种，我国有8种，简介如下：

蓝枕八色鸫分布于云南、广西等省区。蓝背八色鸫分布于云南、广西、海南等省区。蓝翅八色鸫分布于自山东以南沿海各省，在我国大部为迁徙鸟。蓝八色鸫、马来八色鸫，绿胸八色鸫、栗头八色鸫和双辫八色鸫分布于云南。

蓝翅八色鸫

Pitta brachyura

LAN CHI BA SE DONG

别名：仙八色鸫

◎张词祖／摄

银胸丝冠鸟
Serilophus lunatus
YIN XIONG SI GUAN NIAO

◎马晓峰／摄

阔嘴鸟科（所有种）Eurylaimidae

雀形目　阔嘴鸟科

阔嘴鸟科共有 14 种，我国有 2 种。

银胸丝冠鸟　国内分布于云南、广西等省区。

长尾阔嘴鸟　国内分布于云南、广西、贵州等省区。

长尾阔嘴鸟
Psarisomus dalhousiae
CHANG WEI KUO ZUI NIAO

◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

Ceoemyda spengleri 地龟

DI GUI

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 龟科

别名：金龟、泥龟

国内分布于湖南、广东、广西、海南等省区。

◎张词祖／摄

三线闭壳龟 *Cuora trifasciata*

SAN XIAN BI KE GU

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 龟科

别名：红肚龟、金钱龟、金头龟

国内分布于福建、广东、广西、海南等省区。

凹甲陆龟 *Manouria impressa*

◎张词祖／摄

AO JIA LU GUI

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 陆龟科

国内分布于云南、海南等省。国外分布于缅甸、泰国、越南、马来西亚等地。

◎张词祖／摄

Caretta caretta 蠵龟

XI GUI

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 海龟科

别名：赤蠵龟、灵蠵、灵龟、红海龟

蠵龟分布于太平洋、印度洋的热带、亚热带海域中。国内分布于南海、东海、黄海。

◎张词祖 / 摄

绿海龟 *Chelonia mydas*

Lü HAI GUI

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 海龟科

绿海龟分布于南太平洋和印度洋，国内分布于北起山东沿海，南至广东沿海各省及台湾、海南等省，南海诸岛尤多。

◎张词祖 / 摄

玳瑁 *Eretmochelys imbricata*

DAI MAO

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 海龟科

别名：十三鲶龟、文甲

玳瑁分布于热带及亚热带海域的大西洋、南太平洋、印度洋。国内分布于北起山东沿海，南至广东、广西沿海各省区及海南、台湾等省，南海诸岛较多。

棱皮龟

Dermochelys coriacea

LING PI GUI

龟鳖目 棱皮龟科

别名：舢板龟、革背龟、七棱皮龟

棱皮龟分布于太平洋、印度洋、大西洋的热带、亚热带海域中，偶见于温带海域。国内分布于辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南、台湾等省区沿海及南海诸岛。

●濒危等级　濒危(E)



◎程国英／画

◎马晓峰／摄

山瑞鳖

Trionyx steindachneri

SHAN RUI BIE

●濒危等级　濒危(E)

龟鳖目 鳖科

别名：山瑞

国内分布于云南、贵州、广东、广西等省区，国外主要分布于越南。

大壁虎 *Gekko gecko*

DA BI HU

蜥蜴目 壁虎科

别名：蛤蚧、多格、蛤蟹

国内分布于云南、福建、广东、广西、台湾等省区。国外分布于印度、中南半岛、印度尼西亚等地。

●濒危等级　濒危(E)



◎张词祖／摄

◎张词祖／摄

大鲵 *Andrias davidianus*

DA NI

有尾目 隐鳃鲵科

别名：娃娃鱼

大鲵是我国特产，在我国分布较广，黄河、长江和珠江中上游支流的17个省区均有分布，其中以陕西、江西、湖北、湖南、四川、贵州数量较多。

●濒危等级　濒危(E)

虎纹蛙 *Rana tigrina*

HU WEN WA

无尾目 蛙科

虎纹蛙在我国分布较广。

◎马晓峰／摄

镇海疣螈
Tylototriton chinhaiensis
ZHEN HAI YOU YUAN

●濒危等级　濒危(E)

◎李树忠　李艳明／摄

疣螈（所有种）*Tylototriton spp.*

有尾目　蝾螈科

我国受保护的疣螈有5种，分别介绍如下：

细痣疣螈　别名：山腊猎　国内分布于甘肃、四川、贵州、广西、广东、海南等省区。

镇海疣螈　别名：山壁虎　仅分布于浙江省镇海，为珍稀动物。

贵州疣螈　别名：土蛤蚧　分布于贵州。

大凉疣螈　分布于四川省大凉山区。

红瘰疣螈　别名：细瘰疣螈　国内分布于云南。

贵州疣螈
Tylototriton kweichowensis
GUI ZHOU YOU YUAN

●濒危等级　需予关注

◎马晓峰／摄

红瘰疣螈
Tylototriton verrucosus
HONG LUO YOU YUAN

●濒危等级　需予关注

◎马晓峰／摄

国家重点保护野生动物（一级）

蜂猴（所有种）FENG HOU ····· 2

灵长目 懒猴科

蜂猴 FENG HOU

别名：懒猴

国内分布于云南和广西南部的热带、亚热带森林中。国外分布于印度、孟加拉和东南亚。

蜂猴体型略比猫小。身长32～35厘米，体重1～1.5千克。躯体及四肢肥短，头圆、耳小、眼大而圆，善于夜间视物。尾极短，隐在毛中几乎看不见。

蜂猴栖息在热带雨林、亚热带密林中，是树栖夜行性动物。白天躲藏在树洞中或树枝间睡觉，夜间出来活动觅食，主要以鲜嫩的花叶和浆果为食，也吃昆虫、小鸟、鸟卵等。蜂猴行动缓慢，据观察记录，蜂猴四足都行动一步，竟需要12秒钟。蜂猴虽然平时行动缓慢，但在必要的时候，如在捕食时等，它的动作倒也挺快。蜂猴没有固定的繁殖期，每胎产一仔。幼仔出生时眼睛是睁着的，母猴行动时，仔猴紧偎母猴怀中，直到发育和母猴差不多大，才独立行动。

云南南部和西部蜂猴数量稍多，约有1500～2000只。

倭蜂猴 WO FENG HOU

别名：懒猴、小懒猴、小风猴

国内仅分布于云南东南部，国外分布于越南、老挝、柬埔寨等国。倭蜂猴是一种非常稀有的原猴类。体型小，体重仅为蜂猴的1/3，体长不及25厘米。以热带浆果和昆虫为食。

熊猴 XIONG HOU

灵长目 猴科 别名：大青猴、蓉猴、喜马拉雅猴

国内分布于云南、广西和西藏南部。国外分布于缅甸、泰国、老挝、越南、印度、尼泊尔、不丹、锡金。

熊猴体长50～66厘米，体重约10～14千克。熊猴外貌和常见的猕猴很相似，若不仔细看，很难分辨。生活习性也和猕猴相似，但行动没有猕猴灵活，性情比猕猴粗野。熊猴是群居性动物，通常数只至数十只一起活动，由一只强壮的雄猴率领。熊猴夜晚休息睡觉，白天出来活动觅食，清晨时最活跃。主要觅食野果及植物的鲜枝、嫩叶，也吃昆虫、两栖动物和小型鸟类。它们进食时，只把食物略嚼一下，便储藏在颊部的颊囊中，等到闲暇时再细嚼后咽下去。

台湾猴 TAI WAN HOU

灵长目 猴科 别名：岩猴

仅分布于我国台湾省，为我国特有种。

台湾猴是一种岩栖性猴，多数生活在岛南部靠近海滨的岩石山上。虽然原产地属于热带或亚热带气候，但由于台湾猴多栖于海拔2000米以上的高山上，又生有一身厚密的长毛，所以它不怕冷。台湾猴通常在树上睡觉，于清晨和傍晚觅食。它的食性较杂，主要食物是嫩枝叶和野果，也吃昆虫、软体动物、甲壳动物和蛙类等，偶尔也盗食玉米、甘蔗、香蕉等。台湾猴全年均可繁殖，每胎一般只产一仔。

—● 豚尾猴 TUN WEI HOU

灵长目 猴科 别名：平顶猴、猪尾猴



国内仅分布于云南。国外分布于印度及东南亚地区。

豚尾猴尾短而细，形似猪尾，行动时弯而下垂，故名豚尾猴。又因其头顶平坦，因而又有平顶猴之称。豚尾猴是大型猕猴，成年雄猴体长可达70厘米。

豚尾猴栖息于热带、亚热带森林中，经常成群活动。它吃各种植物性食物，如野果、种子、芽苞、嫩尖等，也吃动物性食物，如昆虫和小鸟、鸟卵等。雄性豚尾猴身体强壮力气大，在动物园里饲养的老雄猴性情较凶，雌猴及幼猴性情温顺。在有些豚尾猴产地还训练它们帮助人们劳作，如攀爬到椰子树上采摘熟了的椰子。

由于栖息环境的缩小、恶化和盗猎，豚尾猴的数量锐减，估计已不足1000只。

叶猴（所有种）YE HOU

灵长目 猴科

所谓“叶猴”，是指这类猴子都以叶子为食。分布于我国的叶猴有黑叶猴、白头叶猴、灰叶猴、长尾叶猴、白臀叶猴、戴帽叶猴，分别介绍如下：

—● 黑叶猴 HEI YE HOU

别名：乌猿

国内分布于广西、贵州、云南。栖息在石灰岩丘陵山地，多营家族小群生活，冬季可集二三十只的群。每群有一定的地域，常以峭壁处的岩洞为家。主要以成熟野果为食，也吃树叶、花芽、鸟蛋、昆虫等。在暴风雨或寒潮来临前夕，黑叶猴会发出似长臂猿的呼啸声，当地人常根据这种叫声来判断天气的变化。

白头叶猴 BAI TOU YE HOU

是黑叶猴的一个亚种，也有人认为它是单独的一个种。白头叶猴是我国的特产动物，也是世界著名的稀有猴种。栖息在广西南部的岩溶地区，活动于峭壁的岩洞和石隙之间。晨间出洞，结群到附近的树林觅食，食物主要是嫩芽、树叶和野果。中午回洞休息，午后再外出活动、觅食，晚间回溶洞过夜。

灰叶猴 HUI YE HOU

别名：菲氏叶猴、巴氏叶猴

国内分布于云南西南部。栖息在热带及亚热带茂密的阔叶林中。喜群居，在树上活动，攀缘和跳跃能力很强，在树上跳跃时会翘起尾巴保持身体平衡。很少到地面上来，活动时有一定路线，受惊时多按顺序逃跑。以果实、种子、嫩芽和叶柄为主要食物，也吃鲜枝、嫩叶、花苞、竹笋、小鸟、鸟卵及昆虫等。

长尾叶猴 CHANG WEI YE HOU

在我国仅分布于喜马拉雅山脉中段的南坡，所以别名“喜马拉雅叶猴”。它们在地面上奔跑，或在树上跳跃时，长尾巴总是弯曲着高高翘起，显得十分神气。长尾叶猴在印度可以在街头、庙宇，甚至任何地方自由行动。是世界上著名的“神猴”或“圣猴”。

白臀叶猴 BAI TUN YE HOU

别名：黄面叶猴、海南叶猴

这是一种美丽的猴子，它除了黄面白臀之外，还有一条白色长尾巴。白臀叶猴栖息在热带森林中，以树叶、嫩芽和果实为食。白臀叶猴分布于东南亚。1892年曾在海南省发现过，但以后从未再发现过，可能在我国境内已绝迹。

戴帽叶猴 DAI MAO YE HOU

别名：大灰猴、长尾猴

国内分布于云南西南部的高黎贡山。国外分布于缅甸北部。戴帽叶猴体长58～70厘米，尾长60～80厘米，尾长超过体长，故又名“长尾猴”。体毛除四肢末端和尾为黑色外，其余都是灰色。栖息在海拔1200～1600米的原始阔叶林中，营树栖生活，多结十余只的家族小群活动，食性较杂。

戴帽叶猴在我国的分布区非常狭窄，数量很少，估计其数量约500～600只。

金丝猴（所有种）JIN SI HOU 6

灵长目 猴科 别名：仰鼻猴、金线猴

金丝猴有3种，分别介绍如下：

金丝猴 JIN SI HOU

别名：川金丝猴、仰鼻猴、金线猴、蓝面猴

仅分布于四川、甘肃、陕西南部和神农架山区。金丝猴与举世闻名的大熊猫几乎有着同样珍贵的价值，是中国著名的稀有特产动物之一。金丝猴与大熊猫的产区也几乎是连成一片的，只是金丝猴的产区比大熊猫的产区稍大些。

金丝猴栖息在海拔2000～3000米的森林中，有垂直迁移的习性，夏季在海拔高处活动，冬季下到较低地区，喜欢群居，金丝猴过着典型的游荡式生活，它们在漫游前进时是很有秩序的。猴群的前锋一般是体格较强的雄猴，它们时而在前面跳跃取食，时而爬到树尖上去休息、观察。猴群最后面往往是携带幼子的母猴，它们取食的时间较长，动作也较迟缓，这些母猴最容易受到食肉动物的伤害。也许是为了安全吧，在这些携带幼仔的母猴中还夹杂一些大公猴，一遇情况，它们就吼叫报警，并掩护母猴撤退。在猴群的中间多是一些年轻的金丝猴，这些猴子可以安静地取食，很少受到伤害。金丝猴最喜欢吃植物的叶子，其次是茎、细枝、浆果和花，有时也吃种子和树皮，偶尔吃些真菌类。金丝猴的天敌有豺、狼、金猫、豹以及雕、鹫、鹰等。

滇金丝猴 DIAN JIN SI HOU

别名：黑金丝猴、黑仰鼻猴

仅分布于我国云南西北部和西藏东南部。滇金丝猴栖息在海拔3300～4100米的高山针叶林带，是猴类中栖息地海拔最高的种类。群居，多为20～60只，树栖型。有垂直迁移习性。以针叶树的嫩叶和越冬的花苞及叶芽苞为主要食物，也吃竹笋和嫩竹叶等。目前数量十分稀少，估计不足2000只，已被列为世界灵长类最濒危动物之一。

黔金丝猴 QIAN JIN SI HOU

别名：灰金丝猴

仅分布于我国贵州省东北部梵净山的狭小地区。数量十分稀少，1995年对黔金丝猴进行了系统考察，确认黔金丝猴现存

约750只。被列为世界最濒危物种。栖息的海拔高度比川、滇金丝猴都要低，多栖于海拔500～800米的河谷阔叶林，夏季多见于1400～2200米的阔叶混交林。有季节性分群与合群现象。以多种植物的叶、芽、花、果及树皮等为食。黔金丝猴具有较高的科学价值，是研究动物演化和古地理、古气候的“活化石”。

长臂猿（所有种）CHANG BI YUAN

灵长目 长臂猿科

长臂猿是现存4种类人猿中最小的一类。长臂猿有许多和人类相似的地方，它的血型也有A型、B型、AB型，只缺O型；染色体和人很接近，为22对，只比人少1对。长臂猿的月经周期和妊娠周期也和人接近，分别为25～30天和210～225天左右。

长臂猿栖息在热带和亚热带的密林中，几乎全部时间都在树上生活。长臂猿在密林中行动迅速敏捷，以臂行法悬跃攀树前进，身手极其灵活，疾如飞鸟。在地面上行走时身体呈半直立姿势，两只手臂有时弯曲在身体两侧，有时高举过头。

分布于我国的长臂猿有：黑长臂猿、白眉长臂猿、白掌长臂猿和白颊长臂猿。

黑长臂猿 HEI CHANG BI YUAN

别名：黑冠长臂猿

国内分布于云南、广西、海南。黑长臂猿已纪录的有6个亚种，其中5个亚种分布于我国。栖息在热带、亚热带茂密森林中，营家族式生活，晨昏间活动，活动领域比较固定，无季节迁移现象。主要吃各种植物的嫩芽和果实，也吃昆虫和鸟卵。

黑长臂猿国内外现存总数约700只左右，其中多数在我国。

白眉长臂猿 BAI MEI CHANG BI YUAN

别名：呼猿

国内仅分布于云南。栖息在热带原始森林中，是典型的树栖动物，多集三五只的小群生活。食性较杂，吃树叶、果实、昆虫、鸟和鸟蛋。其叫声洪亮，可传数里之外，叫声似“呼克，呼克”，所以又有“呼猿”之称。

白掌长臂猿 BAI ZHANG CHANG BI YUAN 10

别名：白手长臂猿

国内仅分布于云南。这种长臂猿在我国发现很晚，直到20世纪70年代才知道我国云南也有。是我国几种长臂猿中分布区最小、数量最少的一种。栖息在热带原始森林中，由一对成年猿和幼猿组成家族小群活动。主要吃各种热带浆果、核果和多种嫩树叶、芽、花，也吃昆虫、幼鸟和鸟蛋。

白颊长臂猿 BAI JIA CHANG BI YUAN 11

国内仅分布于云南南部。国外仅分布于越南、老挝。分布区非常狭窄，数量极为稀少。白颊长臂猿原来作为黑长臂猿的一个亚种，现在把它独立成一个种。栖息在海拔900米以下的热带雨林中，营家族小群生活，每群占据一定的区域。多在高大的树冠中上部觅食，觅食时不鸣叫。以多种热带野果、嫩叶、花苞、树芽等为主要食物，也吃昆虫、小鸟和鸟卵。

马来熊 MA LAI XIONG

食肉目 熊科 别名：太阳熊、小狗熊、小黑熊

国内仅分布于云南、西藏。国外分布于南亚和东南亚。

马来熊是熊类中体型最小的一种，全身毛色黑漆油亮，胸部和黑熊一样，也有一个月牙形斑纹，只是颜色不同，为浑白色或淡黄色。马来熊的耳小而圆。其前肢着地向内弯，前掌也向内弯。

马来熊生活在热带和亚热带的丛林地区。因其毛短，比较怕冷。它通常在夜间活动、觅食，食性较杂，以各种野果和虫

类为主食，也吃小型鼠类、鸟卵及植物果实等。它的长舌很适合从野蜂窝中取食蜂蜜和蛴螬，由于它有粗糙短毛的保护，可以免遭蜂蜇。马来熊还有时挖掘白蚁吃，它用两只前掌交替着伸进蚁巢，再舔食掌上的白蚁。马来熊不冬眠。马来熊在我国分布范围很小，数量也不多，应该加强保护。

大熊猫 DA XIONG MAO 12

食肉目 大熊猫科 别名：大猫熊、竹熊、花熊

大熊猫是我国的特产，是世界著名的珍稀动物，仅分布于我国四川、甘肃、陕西等省。

大熊猫栖息在海拔1400～3500米的山地竹林中。无固定巢窝，常在大树上或竹林内卧睡。平时单独行动，性情温顺，视觉、听觉较差，自卫能力不强。但嗅觉较好，善于攀爬，能泅渡湍流的河溪。主要以竹类的竹笋、竹叶及嫩竹尖为食，也吃野果和一些动物性食物。由于大熊猫食量大，消化快，所以有边走边吃边排便的习惯。繁殖期雄性大熊猫有激烈的争偶争斗，雌性大熊猫每产1或2仔，但野外一般只能存活1只。初生幼仔非常小，平均只有100多克，体长15～20厘米。

大熊猫是著名的活化石，具有很高的学术价值。由于大熊猫的产地不断被开发，它的分布区还在逐渐缩小，而且部分地区大熊猫的生活环境已遭破坏。因此，如何更有效地保护大熊猫，仍是动物保护的重要课题。我国政府已采取了一系列有效措施，全力保护这一濒临灭绝的活化石。

紫貂 ZI DIAO 13

食肉目 鼬科 别名：黑貂、赤貂、貂鼠

国内分布于东北大、小兴安岭，长白山一带及新疆的阿尔泰林区。国外分布于亚洲北部。

紫貂是亚洲北部亚寒带针叶林的典型种类之一。耐寒而怕热，尤其怕晒。多栖于针叶林和混交林中。紫貂不掘洞，而是

利用各种天然掩蔽处做窝，如悬崖峭壁的夹缝、树洞、根穴或碎石堆等。紫貂多在黄昏或夜晚活动、觅食，秋冬季有时白天也活动。紫貂动作敏捷，善于攀缘树木，有一套夜间偷袭猎物的本领。紫貂主要捕食各种鼠类和其他小型啮齿动物，有时也捕食松鸡、雉鸡和小鸟，还有昆虫、鸟卵和植物性食物。紫貂的毛绒厚密，轻暖而有光泽，为最珍贵的毛皮之一，久负盛名，素被称为“关东三宝”之一。

貂熊 DIAO XIONG

食肉目 鼬科 别名：狼獾、月熊、山狗子

国内仅分布于内蒙古、黑龙江和新疆阿勒泰地区。国外分布于欧亚和北美洲北部。

貂熊是鼬科中躯体最粗壮的动物，外型介于熊、貂之间。貂熊体毛长密粗糙，闪闪发光，呈黑褐色，夏季毛色淡，为棕红色。

貂熊栖息在北部地区的森林苔原和针叶林中，穴居荒丘倒木或悬崖乱石间，有时借住熊穴或狐狸洞穴。貂熊除繁殖季节外，一般都单独活动，每只貂熊都有自己的栖居范围。貂熊多在夜间活动，清晨和黄昏活动频繁。貂熊性情凶暴、机警、贪婪，体力很强，是北方兽类的公敌。它的食物庞杂，以有蹄动物、猛兽遗弃的剩食及鼠类、鸟类为食。

貂熊在我国的分布区域狭窄，数量稀少，野外现存约200只，应严加保护，否则随着大兴安岭北部林区的开发，有灭绝的可能。

熊狸 XIONG LI

食肉目 灵猫科 别名：熊灵猫

国内分布于云南、广西。国外分布于印度、尼泊尔、不丹、锡金和东南亚。

熊狸躯体粗壮而四肢短，全身披着一层粗糙的黑色长毛，尾巴上的毛更长些。尾巴具缠绕性，耳尖上有一簇黑色长毛，从这两点上很容易把它跟其他灵猫科动物区分开来。

熊狸栖息在茂密的森林中，是夜行性树栖动物。白天它把身体蜷成一团，头藏在尾巴下面在树顶上睡觉，也有时在树上晒太阳。熊狸在地面上行动缓慢而且小心谨慎，从来没有看见过它有跳跃的举动。它在树上是个很有技巧的攀爬家，其尾巴具有辅肢作用。熊狸主要吃果子、嫩芽和各种植物性食物，偶尔也捕食小鸟或小型啮齿动物，但因它行动慢所以很难捉到小动物。熊狸是灵猫类中最爱吼叫的一种动物。它在密林中生活视野狭窄，往往靠嗅觉辨认同类。

我国熊狸的数量估计已不到200只，处于高度濒危状态。

云豹 YUN BAO

14

食肉目 猫科 别名：乌云豹、荷叶豹、龟纹豹

国内分布于长江以南各省区，向北分布达甘肃省的南部。

国外分布于东南亚和印度、尼泊尔、不丹等地。

云豹比豹小得多，一般体长为80～120厘米。它身上的花纹非常明显，身体两侧有大片云块状斑纹，故称云豹。

云豹栖息在热带和亚热带的茂密森林中，它白天躲在树上睡觉或隐身于枝丫间，夜晚出来觅食。云豹属于树栖性动物，活动多在树上，很少下地。它是攀爬能手，攀爬时，其长而粗的尾巴可起平衡作用，它身上斑驳的毛色在树丛中是很好的保护色。云豹主要捕食树上的猴类、鸟类和树栖鼠类，在不产猴子的山区，也常捕食地上的小型食草类动物，特别是野兔。云豹生性胆小，怯懦怕人，所以在野外很难见到。在人工饲养下，云豹可变得驯顺可爱。

—● 豹 BAO

食肉目 猫科 别名：金钱豹、银钱豹、文豹

豹的分布非常广泛，遍及亚洲和非洲大部分地区。

豹全身呈橙黄色，并布满黑色斑点和环纹。产于不同地区的豹，其毛色的深浅以及斑纹的形状和密度都不相同，如产在东北的豹，毛色就较淡雅，故有银钱豹之称。

豹栖息在有森林的山地或丘陵地带。它是夜行性动物，在清晨和傍晚也很活跃。豹行动敏捷，善于跳跃、爬树、游泳，性残忍凶猛。豹的体型虽然不算很大，但强壮有力，能猎杀鹿等大型食草动物，能把比它重的猎物叼到树上去慢慢享用，有时还将没吃完的猎物拖到树上藏起来。豹一般每产2～4仔，有时同一窝幼仔中会出现全身黑色的黑豹。

—● 雪豹 XUE BAO

食肉目 猫科 别名：艾叶豹、荷叶豹、草豹

国内分布于西藏、新疆、青海、甘肃、四川、宁夏、山西、内蒙古等省区。国外分布于俄罗斯、蒙古、阿富汗、印度、巴基斯坦、尼泊尔等地。

雪豹的外貌和大小都像豹，其最明显的特征是尾长且特别蓬松肥大，另一个特点是毛长。雪豹通体灰白色，并布有黑色点斑和环纹，头部黑斑小而密。

雪豹是典型高山动物，因栖息在雪线附近而得名。它是夜行性动物，晨昏时最活跃。雪豹生性凶猛、机警，四肢矫健、灵活，在高山上没有敌手。它以北山羊、岩羊、盘羊等高原动物为食，也捕食高原雉类及啮齿动物。为了追逐猎物，雪豹冬夏季之间往往垂直迁徙。雪豹平时独栖，只有在发情期前后雌雄才在一起生活。雌雪豹每产2～5仔。雪豹的寿命估计为18～20年。

虎 HU

食肉目 猫科 别名：老虎、大虫、白额虎

虎分布在亚洲，北至俄罗斯西伯利亚，南至印度、印度尼西亚。分布于我国的虎有东北虎、华南虎和孟加拉虎。东北虎分布在黑龙江、吉林；华南虎分布在中南、华东、西南；孟加拉虎分布在云南、西藏。

虎全身呈橙黄色，并有黑色条纹。虎有白色变种，其全身呈乳白色，带有深褐色或黑色条纹，眼睛呈蓝色，产在印度雷瓦地区。

虎是孤独性和夜行性动物。雌虎和雄虎各有自己的领地，平时互不往来，只有在繁殖季节才凑到一起。虎捕食各种它能猎杀的动物。以东北虎为例，它的食物主要是野猪和几种鹿科动物（马鹿、驼鹿、梅花鹿、狍、麝），也捕猎黑熊、猞猁、狼等食肉类动物，甚至袭击体重达三四百千克的东北棕熊。虎的视觉发达，听觉灵敏，爪牙强大，无论是坚硬的牛皮，甚至大象的厚皮，都能被它深深撕裂。由于对虎的栖息地的破坏，虎的数量逐年减少。据调查估计，我国野生东北虎只有约20只。

华南虎 HUA NAN HU

是我国的特有亚种，国际有时称为“中国虎”或“厦门虎”。华南虎原来是我国分布最广、数量最多的虎亚种，现在估计野生数量不会多于50只。华南虎已经被列为世界十大濒危物种之首，野生华南虎约20～30只。

儒艮 RU GEN

海牛目 儒艮科 别名：人鱼、美人鱼

国内分布于广东、广西、海南、台湾等省区的沿海，但分布区狭窄，数量稀少。国外分布于印度洋、太平洋周围，即非洲东岸、亚洲东南部沿海至澳大利亚北部沿海。

儒艮是较大型的动物，体长一般为2.70～3.50米，体重300～400千克。

儒艮栖息在热带亚热带的浅海和港湾中，喜欢成群活动，少则几只，多则几十只，它们主要吃浅海中生长的各种海草及海藻。在沿海同一地区常能见到同一群儒艮出没。儒艮的视觉不佳，听觉良好。儒艮性情温和，从不攻击其他海兽或鱼群。儒艮哺乳幼仔时，常以前鳍抱幼仔在胸前，浮出水面让幼仔哺乳，以致被古代航海水手误认为美人鱼，我国古代也有关于美人鱼的传说。

白鳖豚 BAI JI TUN

鲸目 喙豚科 别名：白鳍豚、白旗豚

白鳖豚是我国特有的水生哺乳动物，素有“水中大熊猫”的美称。它生活在长江中下游及其连通水系—洞庭湖、鄱阳湖、洪湖等水域。

白鳖豚身体呈纺锤形，体长1.5～2米，最大可达2.5～2.6米，体重200～250千克。前额呈圆形，突起的部位是发声器官。

白鳖豚喜群居，通常成对或三五只在一起活动，多时可达

10余只，以淡水鱼类为食，也吃水草及水生昆虫。白鳖豚是现存的几种淡水鲸之一，在生物学、仿生学和生理学等方面具有广泛的科学价值。白鳖豚的大脑特别发达，在世界现存的几种淡水豚类中，属白鳖豚的脑量最大，脑分化最完善。外观可以明显地分为大脑、中脑和延脑。白鳖豚每胎1仔，多在3～4月产仔。寿命可达30多年。

由于生存环境不断恶化，白鳖豚的数量逐年减少，根据最新监测结果，白鳖豚已经不足100只。如不采取有效措施加以保护，白鳖豚将在今后25年内从地球上消失。

—● 中华白海豚 ZHONG HUA BAI HAI TUN

鲸目 海豚科 别名：华白豚、白牛

中华白海豚分布于我国浙江、福建、广东、广西、海南、台湾等省区的沿海，多栖息在内海港湾及河口一带。

中华白海豚体呈流线型，体长可达2.5米。吻突狭长，约占体长的8%。成体全身乳白色，体背侧等处略带黑色斑点，眼眶黑色，颇为可爱。

中华白海豚一般数只或单独行动。性情活泼，经常在水面跳跃戏水，有时能跃出水面1米多高。它行动敏捷，游泳迅速。有跟随船只的癖性，常尾随作业渔船之后，捕食漏网之鱼。它还往往随潮流追踪鱼类而进入港湾河道，有时为追食鱼类溯河而上数十千米。母子豚间有强烈眷恋之情，如仔豚被网获，母豚往往徘徊在附近不忍舍弃。中华白海豚以鱼类为食，也吃虾类和乌贼等。同其他海豚一样，它可作为仿生学的研究对象。

香港特别行政区为加强对中华白海豚和江豚的保护，准备把中华白海豚和江豚的重要栖息地——西南大屿山和索罟群岛作海岸公园。

—● 亚洲象 YA ZHOU XIANG

长鼻目 象科 别名：印度象、大象



国内仅分布于云南省与缅甸、老挝相邻的边缘地带。国外分布于南亚及东南亚。

亚洲象仅次于非洲象，是陆地上第二位的大动物。亚洲象体重可超过5吨，但一般体重为3.5～4吨，体长5.5～6.4米。

象是群居性动物，基本以家族为单位，一般在清晨、黄昏和夜晚活动，无固定的栖息地，当食物短缺时便迁徙到其他地区。主要以各种多汁植物为食，如芭蕉、野果、嫩枝叶和草等。其嗅觉和听觉发达，视觉较差。象的长鼻不仅是呼吸器官、嗅觉器官和味觉器官，还起着胳膊和手的作用，既能拾起最细小的东西，也能卷起千斤的重物。长鼻还是象的有力武器。象的巨大耳廓不仅能帮助谛听，也起散热的作用。象没有固定的繁殖季节，每胎产1仔，幼象出生时体重约为90千克，肩高约1米。

我国野生亚洲象总数约为200～250头。

蒙古野驴 MENG GU YE Lü 18

奇蹄目 马科 别名：野驴、亚洲野驴

国内分布于内蒙古、新疆、甘肃等省区。国外分布于俄罗斯、蒙古、中亚地区及伊朗、叙利亚、阿富汗等地。

蒙古野驴为大型有蹄类。外形似骡。身躯比家驴高大，耳长，前额无额毛，既无肩纹，也没有肢纹，叫声似马嘶，而不像驴叫。

蒙古野驴属典型高原寒漠动物。栖息于海拔3800～5000米的高原亚寒带开阔草甸和寒冻半荒漠、荒漠地带。野驴在春夏



季结为小群，以一头强健的雄驴为领队。秋季，野驴自动聚集成几十头乃至上百头的大群，野驴无固定栖息地，清晨到有水源处饮水，白天大部分时间在水源附近觅食沙漠植物和休息。野驴迁徙性大，每天能走很多路，它们行走时排成一行，一般雄驴领先，雌驴在后，幼驴居中。野驴很善跑，能一口气跑40～50千米，最高时速可达64千米。

—● 西藏野驴 XI ZANG YE Lü

奇蹄目 马科 别名：亚洲野驴、藏驴

国内分布于西藏、青海、新疆、甘肃及四川。国外分布于印度、尼泊尔及克什米尔。

在各亚种野驴中，西藏野驴体型强大，肩高可达1.35米，体长可超过2.20米。西藏野驴的毛色较深，近于棕红色，下体呈白色，背腹部毛色的界线较低；蒙古野驴毛色较淡而发灰，背腹部毛色的界线在腹侧上部。

西藏野驴的生活习性与蒙古野驴近似。野驴的听觉、视觉、嗅觉都很灵敏，一般500米内的动静能很快发觉。野驴的配偶期多在8～9月，翌年6～7月产仔，每胎产1仔。新出生的小野驴，数小时后即可跟着雌驴跑。

野驴有两种，一种产于非洲，一种产于亚洲。家驴的野生祖先是亚洲野驴。

—● 野马 YE MA

奇蹄目 马科 别名：普氏野马、蒙古野马

原生地为新疆阿尔泰附近，向东延伸至蒙古大戈壁草原。现野生种群已经绝灭。在人工圈养或半散发状态下生活的野马还有一定的数量。

野马与家马的主要区别是：①没有额毛或只有极短的额毛。②鬃短而直立，不向侧垂。③头部比例较大，四肢显得粗壮。④尾毛及四肢色深，一般为黑色或黑褐色。⑤耳朵比一般家马稍长。野马与家马的根本区别是染色体的数目不同。野马的染色体比家马的多一对，即野马33对，家马32对。

野马栖息在荒漠或半荒漠草原地带，一般结成6～15匹的小群，由一匹强壮的雄马率领，在一定的范围内活动。野马习惯吃粗质的杂草和野生的灌木。在冬季食物短缺时，它常用蹄扒开积雪，觅食枯草和苔藓，并以雪解渴，野马的嗅、视、听觉都很敏锐。

新疆野马繁殖中心现正精心实施着野马放归自然计划。

野骆驼 YE LUO TUO

偶蹄目 驼科 别名：双峰驼、野驼

国内分布于新疆及中蒙交界处。国外分布于蒙古。

野骆驼和家骆驼在形态上有明显的区别：野骆驼头小颈长，腿部长且细，身躯高大，耳、尾较短，尾毛较稀。野骆驼和家骆驼最明显的区别是驼峰，野骆驼的驼峰小而尖，呈圆锥形，上面毛很稀少，而且从不垂向一侧。在毛色上，家骆驼多为深黄或棕色，也有全白色的，而野骆驼则几乎全为浅棕黄色的，只是颈毛和尾毛色比较深。

野骆驼生活在自然条件极端恶劣的地方，那里夏季酷热，冬季严寒，经常狂风大作，飞沙走石，极其干旱缺水，植物也稀少。野骆驼性情胆怯而机警，嗅觉和听觉特别敏锐。它善于奔跑，时速达30千米。野骆驼的食物以含淀粉较高的骆驼刺为主，有时也吃猪毛菜、红柳、芦苇、梭梭等植物。

野骆驼的濒危程度超过大熊猫，野生数量十分稀少，国际

保护界十分关注。联合国全球环境基金（GEF）近些年来启动了专项研究和保护计划。

麂鹿 XI LU 20

偶蹄目 麂鹿科 别名：小麂鹿、鼠鹿

国内仅分布于云南最南端。国外分布于东南亚。

麂鹿是偶蹄目中体型最小的动物，体长约40～47厘米，体重约3千克。雌、雄均无角，上下颌均有犬齿，雄性上颌的犬齿尤为发达，露出唇外。

麂鹿栖息在热带海拔较低的稀树草丛、灌丛和阔叶林。除配偶季节外，一般营独居生活。它们体型小，行动敏捷，奔跑速度快，性情胆小怯懦，谨慎仔细，警觉性强。白天隐匿在丛林间休息，夜间出来活动觅食。主要以植物叶茎为食物，多为嫩草、茎、嫩芽、榕树果，以及落下来的各种野果、浆果，也吃昆虫、蝼蛄、小哺乳动物等。麂鹿在密林中有它们穿行其间的隧道似的小路，它们就像飞驰而过的影子一样出现在这些小路上。

麂鹿在我国分布面积非常狭小、数量极少，估计不足100只。世界上只有几家动物园展览过麂鹿。

黑麂 HEI JI

偶蹄目 鹿科 别名：毛额黄猄、黑黄猄、红头鹿、蓬头麂

黑麂是我国特有的种类。仅分布于我国安徽、浙江和与之接壤的福建、江西部分地区。

黑麂是麂中体型最大的。体长约120厘米，肩高50～60厘米，体重20～30千克。

黑麂栖息在海拔1000米左右的山地阔叶林中。有游走觅食的习性，吃几口食物，走动一会儿，又回过头来觅食，如此重复多次，直到吃饱为止。以乔、灌木嫩枝叶，花果或草本植物为食。黑麂性情胆小怯弱，恐惧感强，多营独立生活。

黑麂分布区域比较狭窄，数量稀少，处于高度濒危状态。关于黑麂的记载和生态资料非常少。近年来，我国的动物学家对黑麂作了不少调查研究工作，对其生活习性和分布有了进一步了解。



白唇鹿 BAI CHUN LU

偶蹄目 鹿科 别名：岩鹿、白鼻鹿、黄鹿

白唇鹿是我国的特产动物，分布于青海、甘肃、四川、西藏。

白唇鹿的下唇和喉部为白色，故名白唇鹿。白唇鹿是世界上分布于海拔最高地带的一种大型鹿类，一般生活在海拔三四千米以上的山地，夏季甚至能上升至海拔5000米的山地生活。白唇鹿活动于高山灌丛和高山草甸区，它体毛厚密，不畏风雪严寒，善于爬山奔跑，喜欢在水源附近活动。主要吃草，兼食灌木的细枝嫩芽，为了寻找食物，能长距离迁移。喜结小群生活，非繁殖季节雌雄分群，在繁殖季节则集大群活动，有时一群可达百只以上。在此期间，雄鹿之间将展开剧烈的求偶争斗。

坡鹿 PO LU

偶蹄目 鹿科 别名：海南坡鹿、泽鹿、眉角鹿

国内仅分布于海南省。坡鹿是泽鹿的一个亚种，泽鹿在国外分布于中南半岛和印度。是一种高度濒危的鹿科动物。

坡鹿体形与梅花鹿相近，但较小，四肢修长，苗条健美。坡鹿一般栖息在地势平缓、景观开阔的海拔200米以下的低山、平野地区，喜欢活动于矮灌木林或多草的沼泽地带。坡鹿宽大叉

开的蹄子适于在沼泽地行走，有时还到水中去。坡鹿白天隐藏在灌木或草丛间休息，清晨和傍晚出来觅食。警觉性高，每吃三两口便抬头张望，谛听动静，匆匆吃食，即行遁藏。喜食青草、芦苇、沼泽植物，也吃树叶、嫩芽等，并爱舐含盐碱土。夏季，雄鹿往往独居，雌鹿则组成数只的小群；冬季，组成较大的群。

梅花鹿 MEI HUA LU

偶蹄目 鹿科 别名：花鹿



梅花鹿在我国曾广泛分布，后由于捕猎过多，现仅在长白山区、四川省北部、安徽省北部及台湾省残存少数个体。国外分布于日本、朝鲜、俄罗斯、越南。

梅花鹿是一种中型鹿，雄鹿有角，雌鹿无角。梅花鹿冬毛为棕色，厚密而无白色斑点；夏毛为红棕色，比冬毛稀薄并有明显的白色斑点，臀部有白色斑块。

梅花鹿多栖于针、阔叶混交林的边缘和山地草原。黄昏和清晨时活动、觅食。食性极为广泛，主要以草、树叶、嫩芽、树皮、苔藓等为食。野生梅花鹿已所剩无几，亟待加强保护，但可以发展人工养殖，因为梅花鹿全身是宝。鹿茸、鹿胎、鹿心、鹿鞭、鹿尾、鹿筋、鹿血都是名贵的药材。鹿肉可食，味道鲜美，容易消化，是上等滋补品。梅花鹿具有很高的经济价值。现在，我国的养鹿事业蓬勃发展，驯养方式已发展成放牧式。

豚鹿 TUN LU

偶蹄目 鹿科 别名：芦鳐鹿

分布于南亚和中南半岛。国内仅分布于云南南部。

豚鹿向前跑动时，头部低垂，不像其他鹿那样昂首窜跳。由于豚鹿比较矮小、躯体粗壮，因此姿态、体型都有点像猪，因而得名豚鹿。

豚鹿喜欢水，生境包括热带河畔的密草丛林区、多草的从积平原或河口的小岛，也包括河口的草原和多苇的沼泽地。豚鹿性情比较孤独，经常独栖，有时成对出现，偶尔也有三五只在一起觅食的现象。它们白天在丛林中休息，晚上出来觅食。主要吃各种草，有时也吃树木的嫩芽、嫩叶，还喜欢吃落到地上的花和野果。豚鹿的视觉、嗅觉和听觉都相当敏锐，只是跑得不快。

麋鹿 MI LU

偶蹄目 鹿科 别名：四不像

麋鹿是我国最著名的特产鹿科动物之一，它在世界上的名声甚至大于大熊猫和金丝猴。

麋鹿是一种非常特殊的大型鹿类。由于它头似马、角似鹿、蹄似牛、尾似驴，从整体看，一无所像，故俗称“四不像”。

因环境变迁和长期过度捕猎，野生的麋鹿约在一千年前绝迹。18世纪时，清朝封建统治者在北京南海子皇家猎苑饲养了一群。1865年秋，法国传教士大卫隔墙发现了这种世界珍兽，并于1866年1月用纹银20两换得两张麋鹿皮和两个头骨，运往巴黎。后因列强人侵，麋鹿被运到国外。麋鹿先后在欧洲许多动物园展出过，最后只有英国贝福特公爵在其私人别墅乌邦寺饲养的一群日益兴旺，反倒成了世间唯一的种群。1985年以来，我国又引回80多只麋鹿，饲养在北京南苑和江苏省大丰县，现已发展为数百头。一部分已移到湖北省石首，现该种群正成功地发展着。

野牛 YE NIU 24

偶蹄目 牛科 别名：白肢野牛、白袜子、野黄牛

国内分布于云南省。国外分布于印度、孟加拉、尼泊尔、不丹和中南半岛。



野牛躯体巨大粗壮，是各种野牛中体型最大的一种。雄性体长近3米，肩高可达2.2米，体重超过1吨。雌性体长平均约2.1米。野牛通身为棕黑色至赤褐色，仅四肢小腿为白色，好像穿着白袜子，故别名“白袜子”。

野牛是典型的热带森林动物，常年栖息在热带和亚热带的阔叶林及稀树草丛间。它经常在近水源的林间草地活动。野牛喜欢群居，多为几头至十几头在一起活动。在清晨和黄昏时出来觅食，白天躲在密林遮荫处休息和进行反刍。主要吃草和嫩枝芽，特别喜欢吃笋和嫩竹。野牛的嗅觉极好，听觉也比较灵敏，但警觉性不高。遇见敌害时，毫不畏惧。野牛的唯一敌害是虎，但虎也只敢伺机袭击牛犊。

据调查，野牛数量估计有700～800头。

野牦牛 YE MAO NIU

偶蹄目 牛科 别名：牦牛

野牦牛是我国的特产动物，分布于西藏、青海、新疆、甘肃。国外分布于印度和尼泊尔。

野牦牛身躯高大粗壮，雄性肩高可达2米，体重达500～600千克，但雄性家牦牛体重很少超过300千克。野牦牛的角远比

家牦牛发达。野牦牛通体为黑褐色，体毛浓密而粗糙，其胸腹部的长毛几乎垂到地面，而家牦牛有棕、白、黄等杂色。

野牦牛是当今世界上分布在最高地带的大型有蹄类动物。它们栖息在海拔4000～5000米的高山峻岭和非常荒凉的地方。栖地环境恶劣，它们生性耐寒，不怕风雪。野牦牛喜欢群居，夏季常结十余只的小群活动，冬季结成百只以上的大群。野牦牛在清晨或傍晚觅食，以粗劣的野草充饥，以雪水解渴。白天常到陡峭险阻处休息反刍。

藏羚 ZANG LING

偶蹄目 牛科 别名：藏羚羊、一角兽

藏羚是我国著名的特产动物，分布于我国青藏高原，偶而有少数流入印度和尼泊尔境内。

藏羚在形态上有两个主要特征：第一是角型特殊，角几乎从额上竖直长出，弯度很小，细长如鞭，角的最长记录是72.4厘米，但一般不超过60厘米。双角长得十分匀称，在远处从侧面看，好像只有一只角，故有“一角兽”之称。第二特征是鼻吻部膨大，鼻腔宽阔，吻部多毛。

藏羚是典型的高原动物，栖息在海拔4000～5000米的高原地带。夏季在开阔的山谷或草原上有水、草的地方生活，寒冬迁往避风向阳的沟谷。藏羚喜欢群居。食物是高原地区所特有的低矮植物和草。藏羚警觉性高，奔跑速度快，其时速可达60千米以上，足以把狗和狼远远抛在后面。

藏羚绒轻软纤细、弹性好、保暖性强，被誉为“羊绒之王”和“软黄金”。昂贵的藏羚绒披肩、围巾成为西方时装界的时尚，在暴利的驱使下，盗猎和非法贸易肆无忌惮、禁而不止。我国乃至国际上已加大执法力度，目前，盗猎活动已有所收敛。

普氏原羚 PU SHI YUAN LING

偶蹄目 牛科 别名：黄羊、滩黄羊

我国特产的普氏原羚曾分布于内蒙古、青海、宁夏、甘肃等省区，现可能仅存于青海湖边。

普氏原羚四肢纤细。角弯曲而短，末端相对钩曲。夏季体毛沙黄，冬季颜色较淡，呈棕黄或乳白色。

普氏原羚栖息在荒漠与半荒漠草原地区，一般不上高山或纯戈壁地带。冬季则向南作水平迁移，追寻无雪或雪薄处和水源、草被较为丰盛的地方越冬。春末夏初时北返。喜群居，数十只或数百只结群活动。性机警，行动迅速敏捷，疾驰如飞。主要以禾本科、莎草科及其他沙生植物的嫩枝、茎、叶为食；冬季也啃食干草茎、枯叶。饱食后常到有水源的地方饮水。普氏原羚每年5～6月时产仔，每产一仔，偶有双羔。幼羚出生后3天，即能随雌兽疾走。雌羚产仔后，大群化小，雄性离群另组雄性群，到下次发情期再结成大群。

普氏原羚的数量正在急剧减少，目前仅存不超过200只，正面临灭绝的危险。

高鼻羚羊 GAO BI LING YANG

偶蹄目 牛科 别名：赛加羚羊

国内分布于新疆、内蒙古，迄今已近30年不见踪影。国外分布于蒙古、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯等地。



高鼻羚羊的突出特点是有一个隆起的鼻子。高鼻羚羊栖息在荒漠和半荒漠地带。性好群居，由数只至十余只结成小群，秋季集成大群。高鼻羚羊吃低矮的灌木和草，其中约13%为家畜不喜食的植物，这些植物中常含有

毒物质和盐分，但高鼻羚羊却可以适应，吃含水较多的植物时，它们可以较长时间不饮水。只有在极其干旱的情况下，才结群去找水源。高鼻羚羊嗅觉敏锐，善于奔跑，时速可达60千米。主要敌害是狼、金雕等大型鹰，狐狸也危害幼羚。

高鼻羚羊的重引回项目启动已多年，但迄今未取得成功，有待继续努力。

扭角羚 NIU JIAO LING 27

偶蹄目 牛科 别名：羚牛

扭角羚是一种难得的大型稀有珍贵动物。国内分布于四川、陕西、甘肃、云南、西藏。国外分布于缅甸北部、印度阿萨姆和不丹。

扭角羚有4个亚种，在我国均有分布，其中两个亚种是我国的特产。各亚种的毛色有区别，分布地区由南至北，毛色逐渐变浅。模式亚种喜马拉雅扭角羚大体是鸟褐或茶褐色；不丹亚种肩背部毛色鲜黄；四川亚种大致呈黄褐或灰黄色；秦岭亚种最漂亮，通身披着金黄色长毛，故又称金毛扭角羚。

扭角羚是典型的高山动物。喜欢停留在针叶林和高山草甸之间，白天多隐匿在竹林或石楠丛中休息，清晨和傍晚出来觅食。夏季结成大群，吃青草和其他细嫩的高山植物；冬季分散成小群，下到低处，吃竹叶、嫩枝和树皮。看上去扭角羚躯体粗壮笨重，但在逃避敌害时行动却异常敏捷。

台湾鬣羚 TAI WAN LIE LING 28

偶蹄目 牛科 别名：台湾长鬣山羊、日本鬣羚

台湾鬣羚是我国的特产动物。仅分布于我国台湾省。

台湾鬣羚的外形与鬣羚有些相似，但体型比鬣羚小得多。台湾鬣羚是日本鬣羚的亚种，与鬣羚同属不同种，所以它的体型大小与日本鬣羚更近似。台湾鬣羚雌雄均有角，背毛粗糙稀疏，眼下腺较日本鬣羚小些。

台湾鬣羚栖息在海拔700～3500米高的山区，在海拔1000～2000米的地区最集中。善于在险恶的乱石山崖间跳跃，非常灵活。它发怒时常用前蹄敲击地面，以示警告，同时发出一种如哨声般的尖叫，并用角攻击对方，但不用嘴咬对方。于清晨和黄昏觅食，喜以菌类为食。常独居或三两只在一起活动。

由于产地的开发及非法偷猎，台湾鬣羚的数量急剧下降。现在，这种鬣羚的数量已相当稀少。

赤斑羚 CHI BAN LING

偶蹄目 牛科 别名：红斑羚、红山羊

国内仅分布于西藏。国外分布于缅甸北部及相邻的印度阿萨姆。

赤斑羚与斑羚同属，外形也很相似，但其体型稍大，毛色不同。赤斑羚的毛比斑羚柔软，呈鲜明的棕赤色。雌雄斑羚均有角。

赤斑羚是典型的林栖动物，多活动在密林深处较空旷或林缘多岩陡坡的地方。冬季随降雪状况而向海拔较低处迁移。成对或结成几只的小群活动。行动敏捷，善于攀登跳跃，可从静止的姿态一下跳过1.8米高的围栏。早晨和午后外出觅食和饮水，主要吃草本植物。赤斑羚的数量估计不多，由于赤斑羚栖息在边远偏僻的山区，很少能见到它，因而很珍贵。

北山羊 BEI SHAN YANG

偶蹄目 牛科 别名：悬羊、羱羊

国内分布于新疆、甘肃、青海、西藏等省区。

北山羊体型大，体长1.2米左右，体重达60千克以上。北山羊有弯刀型的巨角。雄羊角上有许多明显的横棱，角长70～140厘米。雌羊角细，长15～28厘米。

北山羊是典型的高山动物，栖息在荒裸无树的岩石坡上，从不下至树林带中，栖处陡峭而艰险，它在悬崖峭壁间行动灵

活敏捷，善于奔跑跳跃，喜群居，常十余只至数十只结群活动、觅食，以各种杂草及灌木嫩枝芽等为食。北山羊的听觉、视觉和嗅觉都很灵敏。雪豹、猞猁和狼等是北山羊的天敌。它们逃避敌害主要靠高超的爬山本领。

—● 塔尔羊 TA ER YANG

偶蹄目 牛科 别名：长毛羊、山羊、喜马拉雅塔尔羊

我国在20世纪70年代初期，通过对喜马拉雅的综合科研调查，才发现西藏境内产塔尔羊。国外分布于尼泊尔、克什米尔及印度。

塔尔羊的外形很像山羊，体形比普通山羊大。塔尔羊全身披长毛，毛粗而密，毛色由赤褐至乌褐不等。

塔尔羊栖息在喜马拉雅山南坡高山之中。塔尔羊喜欢群居，冬季可集上百只的大群。通常选择灌丛深密、山势险恶的地方栖身，爬山的本领高超。它白天隐身于陡峭山坡上的茂密灌丛里，傍晚出来觅食。老雄羊在夏季离群，组成小群，爬上最隐密的山林中栖居，直到9月中才返群，一起过冬。

塔尔羊在我国境内仅限于喜马拉雅山南坡的个别谷地，分布范围相当狭小，估计现存数量为400～500只。

—● 河狸 HAI LI

啮齿目 河狸科 别名：海狸、洪都斯（哈萨克语）

国内仅分布于新疆北部。国外分布于蒙古、俄罗斯和欧洲。另一种它的近亲分布在北美。有的动物学家认为河狸只有一种。

河狸是一种大型啮齿动物，平均体重10余千克。尾巴扁平如桨。前足瘦小灵便，有锐爪，善于握物。后足肥大，趾间有蹼，适于划水。门齿大而锐利，只几分钟就能咬断一棵细树干。鼻孔中有小瓣，入水时能自动闭塞，耳廓小而圆，里面有油性密毛，具有防水功能。肛门前方有一对分泌腺，能分泌“河狸香”，这是河狸用来标记领地的特殊物质。

河狸被誉为动物界的工程师。它能根据水位的变化，在河湖中筑起堤坝，以保持生活区内稳定的水位。河狸修的堤坝一般长几十米，有的长达数百米。河狸在美国蒙大拿州杰斐逊河上筑的坝有700米长，人可以骑马从坝上通过。

由于人类无节制的猎捕，其分布区迅速缩小，现已濒临绝灭。

短尾信天翁 DUAN WEI XIN TIAN WENG

鹱形目 信天翁科 别名：海燕

繁殖于澎湖列岛及台湾附近岛屿，迁徙及越冬季节见于我国东部沿海。国外分布于北太平洋、琉球群岛和小笠原群岛等地。

短尾信天翁是大型海洋鸟类，两翼展开可达3米，体长约95厘米。短尾信天翁的翅膀狭长，飞翔力强，适于在海上长途旅行，有借助海面上升气流滑翔的高超技巧。常在清晨捕食夜间出现在海水上层的乌贼、鱼类及其他浮游生物。它爱吃从轮船上扔到海里的动物内脏和其他食物，所以总喜欢尾随轮船作长距离飞行。短尾信天翁除繁殖期外很少上陆。

短尾信天翁的自身繁殖能力低，加之人们为了取其羽毛而大量捕杀，目前数量已极其稀少，亟待加强保护。

白腹军舰鸟 BA FU JUN JIAN NIAO

鹈形目 军舰鸟科 别名:圣诞岛军舰鸟

国内主要分布于西沙群岛一带。国外分布于马来西亚和印

度尼西亚周围海域。

由于白腹军舰鸟多繁殖于圣诞岛，故又名圣诞岛军舰鸟。白腹军舰鸟是大型热带海鸟，体长约95厘米。白腹军舰鸟有裸露的红色喉囊，用以暂时贮存所捕食的鱼。求偶时雄鸟的喉囊膨胀起来并变成亮红色。

白腹军舰鸟是典型的热带海鸟，它依靠强大的翅膀和长尾几乎整天在海洋上空飞翔，很少降落到海面上，仅夜间栖宿于岸边林带或岛屿的树上。飞翔极为迅捷和灵巧，取食主要在空中进行，除能追捕飞鱼外，还掠夺鲣鸟及鸥类捕获的鱼类。当地渔民称白腹军舰鸟为导航鸟。解放前，渔民出海捕鱼时，常把这种鸟带到船上，一旦遇上天气突然变坏，辨认不清方向时，就将鸟放出，按鸟飞行的方向行驶，便可避免灾难。白腹军舰鸟几乎四季均可繁殖。

—● 白鹳 BAI GUAN

鹳形目 鹳科 别名：东方白鹤、老鹳

白鹳有3个亚种，指名亚种主要分布于欧洲和非洲；亚细亚亚种分布于俄罗斯、巴基斯坦和我国新疆一带；东方亚种分布于乌苏里江和黑龙江下游及我国的东部地区。在欧洲繁殖的白鹳常分两路迁徙到非洲南部越冬，繁殖于我国东北和内蒙古的白鹳，冬季则主要在长江下游越冬。



白鹳为大型涉禽，体长约110厘米。它飞行时常翱翔，伫立时颈部喜缩成S形，能以上下嘴相击发出敲梆子似的响声。白鹳栖息在有树的开阔沼泽、苇

塘、池塘和浅水地区。它视觉敏锐，性情文静而机警。筑巢于水域附近的高大树上。食物以鱼类为主，也吃蛙及昆虫，偶而捕食小型鼠类。白鹳为候鸟，每年3月初开始陆续迁到繁殖地，在水域附近的大树、屋顶或烟囱等高处营巢，巢的直径可达一米多。每产3～6枚乳白色卵，雌雄轮流孵卵，但以雌鹳为主。

在欧洲某些地区，白鹳喜欢在屋顶上筑巢，当地村民认为白鹳在屋顶上筑巢是“吉祥”的象征。今天，在荷兰、德国和奥地利，已慢慢地形成了一些遐迩闻名的“白鹳村”。

白鹳在我国主要越冬地的总数量约为2000～2500只。

黑鹳 HEI GUAN

鹳形目 鹳科 别名：黑老鹳、乌鹳

黑鹳在我国繁殖于新疆、甘肃、青海、内蒙古、河北、北京、东北等地，在长江流域以南地区越冬。国外分布于欧、亚、非三洲。

黑鹳比白鹳小，为中型鹳，体长约100厘米。黑鹳在国内甚为罕见。迁徙或越冬时，常栖于远离人类居住的开阔平原上。黑鹳喜欢在沼泽和潮湿地上觅食，主要吃鱼，也吃蛙、蟹、昆虫、蜥蜴、蛇、鼠等。黑鹤飞行姿态似白鹳，头颈前伸，两脚并拢向后成一直线，两翅扇动缓慢，扇动3～5次之后便平伸不动呈滑翔姿势。黑鹳从不鸣叫，也不会像白鹤那样击嘴发出敲梆子似的响声。黑鹳的视觉、听觉均很敏锐，很远便能察觉人或其他动物。黑鹳虽然孤僻，但有时与白鹳、苍鹭为伴；在它们活动和憩息地附近，还常可看到银鸥、赤麻鸭和白额雁群。

黑鹳是珍稀的观赏鸟类。近年来数量逐渐稀少，估计现存总数约为1000只，亟待加强保护。

朱鹮 ZHU HUAN

鹳形目 鹮科 别名：朱鹭

朱鹮是世界公认的濒危鸟类，过去分布广、数量多，但自

20世纪50年代起数量急剧下降，目前已成为世界上种群数量最少的鸟种之一。仅分布于我国陕西省洋县。

1978年至1981年，中国科学院的鸟类科学工作者，用了3年时间进行野外调查，终于在1981年5月23日和30日在陕西秦岭洋县境内发现了朱鹮。朱鹮体态优美，羽色艳丽，是一种美丽动人的鸟。

朱鹮生活在水田、河滩、池塘、沼泽和山溪附近，平时栖息在高大的树木上，寻找食物时才飞到水田或溪流沼泽地上。飞翔时翅膀鼓动缓慢而有力，飞行高度约20米。叫声似乌鸦。食物为小鱼、泥鳅、蟹、蛙、田螺及水生浮游生物、昆虫等。常有较固定的取食场所。朱鹮巢的区域性明显，不准其他个体进入巢区。每产卵2～4枚，双亲轮流孵卵，雏鸟由双亲共同抚育，亲鸟用半消化的食物饲喂，雏鸟把嘴深入亲鸟喉囊内取食。

中华秋沙鸭 ZHONG HUA QIU SHA YA

雁形目 鸭科 别名：油鸭、鳞胁秋沙鸭

中华秋沙鸭是我国的特产动物。繁殖于内蒙古、黑龙江、吉林等地，在长江流域以南越冬。在国外繁殖于西伯利亚东南部。

中华秋沙鸭为中型鸭。生有一对长冠羽，两翅上各有一白色翼镜，在阳光下闪闪发光。体侧有黑色鳞状斑纹，因此又叫鳞胁秋沙鸭。

中华秋沙鸭栖息在寒温带阔叶林或针阔混交林中，常在溪流、河谷、草甸、水塘及草地等处活动。性机警，稍有惊动就昂首缩颈不动，随即起飞或急剧游至隐蔽处。善于潜水，捕食鱼类，也吃一些昆虫等。中华秋沙鸭的巢多营在距水流很近的天然树洞中，孵卵和哺育后代全由雌鸟承担。中华秋沙鸭属候鸟。9月中旬南迁，翌年4月又迁到北方繁殖。

金雕 JIN DIAO

隼形目 鹰科 别名：法白雕

国内分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、青海、甘肃、山西、陕西、北京、湖北、贵州、四川、云南及西藏等省区。

体型较大，体长近1米。雌雄同色。头、颈黄棕色，上体棕褐色，下体黑褐色。翼下有一白斑，飞翔时看得很清楚。爪长5厘米以上。

金雕栖息在海拔2600～4000米的高山、草原或针叶林地区，冬季多到平原或农林上空活动。常落在高山岩石或大树上。性凶猛，常沿直线或圈状滑翔于高空，飞行迅速。捕食天鹅、雁鸭类及狐、貂、鹿、山羊、家羊等大型动物，也吃小型啮齿动物。筑巢于极难攀登的悬崖峭壁的树上，以树枝等筑巢，内铺以草和毛皮等。有利用旧巢的习性，但每年都增添新的材料。巢高可达1.8米，直径1米多。每年2～3月产卵，每窝产1～2枚，经雌雕约44～45天的孵化，加上双亲近3个月的哺育，幼雕才学会飞行，离巢捕食。

白肩雕 BAI JIAN DIAO

隼形目 鹰科 别名：老雕、御雕

国内分布于新疆（繁殖鸟）；在青海、甘肃、陕西、辽宁及长江中下游、福建、广东等地越冬。国外分布于亚洲、欧洲和东北非洲。

白肩雕有显眼的白色肩羽，故得名白肩雕。白肩雕栖息在山地林间，也活动于平原丘陵。遍常单个或成对活动。经常长时间停落在岩石或地面上，飞翔时，缓慢地鼓动双翼在空中滑翔。白肩雕主要猎食松鼠、花鼠、黄鼠、跳鼠、仓鼠、田鼠、兔、旱獭等小型和中型兽类，以及鸽、鹳、鸭、雁等鸟类。有时也吃尸肉，偶然捕食爬行类。饱食之后，多长时间停息在岩石或地面上。每年4～5月间产卵，每窝产卵2枚，雌雄共同孵卵。

白肩雕在我国极为罕见，应注意加强保护。

玉带海雕 YU DAI HAI DIAO

隼形目 鹰科 别名：黑鹰、腰玉

玉带海雕数量十分稀少，在我国分布于内蒙古、黑龙江、甘肃、青海、新疆、西藏、四川等地。国外分布于西伯利亚、蒙古、巴基斯坦、印度等地。

玉带海雕栖息在海拔3200～4700米的河谷、山岳、草原的开阔地带。它在湖泊岸边捕食鱼和雁、鸭等水禽；在平原及荒漠地带吃旱獭、黄鼠、鼠兔等啮齿动物。它有时在鼠兔或旱獭洞旁十多米处停息，猎物刚出洞探头张望时，即猛扑过去，用利爪将对方擒住。玉带海雕等猛禽趾上长有锐如狮虎的角质利爪，抓获猎物时，这些利爪像利刃似地刺进猎物的要害部位。3月份开始营巢，巢置于高大的乔木上或芦苇丛中、高山岩缝间。

白尾海雕 BAI WEI HAI DIAO

隼形目 鹰科 别名：白尾雕、芝麻雕

国内分布于黑龙江、内蒙古、甘肃；迁徙时见于沿海各省，为华南沿海地区及台湾冬候鸟。国外广泛分布于欧亚大陆北部及非洲西北部、印度北部。

白尾海雕常见于海滨、岛屿、湖岸、江河、沼泽等地附近。多单独活动，飞行较迟缓，看起来悠然自得。休息时，长时间站立在岩石、地面或树枝上。常在水面上空飞行，捕食大型鱼类和水鸟。它在陆地上捕捉啮齿动物、兔和野鸭等。白尾海雕的食量很大，耐饥力强。每窝产卵2枚，偶见3枚。主要由雌鸟孵卵，雏鸟由双亲抚育。

白尾海雕种群数量较低，且有下降趋势。

虎头海雕 HU TOU HAI DIAO

隼形目 鹰科 别名：虎头雕、海雕、羌鹫

国内分布于东北、河北、山西，极为罕见。国外分布于西伯利亚沿海地区及日本、朝鲜。

虎头海雕是海雕中最大最凶猛的一种，主要栖息在近海岸的河流、湖泊等处，有时也飞到山地河湖附近。飞行缓慢，往往频频鼓动双翅，滑翔于空中；有时在空中盘旋；有时停息在海岸沙丘、湖岸等处的高树枝上。大多数单独生活，迁徙时常成小群。叫声有变化，有时激烈，有时尖锐。主要以鱼类为食，也捕食水禽、啮齿动物等，在食物短缺时也吃尸体和腐肉。虎头海雕每年4～5月繁殖，营巢在近海岸的岩壁上或高大的杨、松树上，用树枝造巢，每窝产卵2枚。

白背兀鹫 BAI BEI WU JIU

隼形目 鹰科 别名：拟兀鹫

国内分布于云南。数量十分稀少。

白背兀鹫体长约83厘米。白背兀鹫栖息在山地，但常到开阔的平原地区觅食。一般成群活动。飞行姿态笨重，但有相当强的持久力。地上行走较其他种猛禽稳健。以鼠类、野兔等为食，喜食尸体的内脏，而尸体不一定能经常找到，所以它有较强的耐饥力，不过一旦有机会，一次能吃得很多。它们裸露的头部和颈部，可以很方便地将头伸进死动物的腹腔，而不会污染羽毛和造成阻碍。其颈基部长着一团较长的羽毛构成领襟，像人的餐巾一样，起到防止食尸时弄脏身上羽毛的作用。

胡兀鹫 HU WU JIU

隼形目 鹰科 别名：大胡子鹫、胡子雕、须鹫

国内分布于新疆、青海、甘肃、宁夏、四川及西藏，偶见

于内蒙古、辽宁、河北、山西、湖北、云南等地。国外分布于俄罗斯、中亚、非洲和欧洲部分地区。

胡兀鹫体型很大，体长超过1米，两翼展开可达2.8米。胡兀鹫的主要形态特征是：眼上生有黑而长的刚毛，形成眉状斑纹，颏下生有一簇黑羽，像山羊胡子。

胡兀鹫主要栖息在人类难以接近的高山裸岩地带。常单独活动，有时结成小群飞翔。食物以动物尸体为主，也捕食草原上的病弱动物，食物缺乏时，也捕食山羊、雉鸡、家畜等。它是飞行能手，为了寻找食物，一天可持续翱翔9～10小时，飞行高度可达海拔7000米以上。需要的时候，它可以借助尾羽活动和初级飞羽的微微转动，在离地面3～5米的高度，作快速的贴地飞行。现代高速飞机利用襟翼提高升力，以适应低空飞行的原理与此很相似。

细嘴松鸡 XI ZUI SONG JI

鸡形目 松鸡科 别名：黑嘴松鸡、林鸡、嘟鸡

国内分布于内蒙古、黑龙江最北部地区。国外分布于西伯利亚东部。

细嘴松鸡是亚寒带针叶林带典型的代表性鸟类。喜栖于阔叶树与落叶松的混杂林内，很少到林缘、草甸及农田中活动。冬季常结群往来于河畔及山谷间，并多在树上活动；夏季则多在地面采食。主要以红松、落叶松、桦树等的嫩芽和枝叶为食，也吃部分浆果、草子及蜘蛛、蜗牛、蠕蚓、甲虫、蚂蚁等动物性食物。细嘴松鸡约在3月下旬，当阳坡积雪开始融化时开始发情。雄性间常有夺雌斗争。通常在地面上、倒木下、灌丛中营巢。每窝产卵多为8枚，雌鸟孵卵，雏鸟生长迅速，半月余即能飞到3～4米的高树上。

斑尾榛鸡 BAN WEI ZHEN JI

鸡形目 松鸡科 别名：羊角鸡

斑尾榛鸡是我国的特产鸟类，仅分布于我国甘肃、青海、四川、西藏、云南等省区的局部山区。

斑尾榛鸡体型大小似鸽。尾羽有7～8条黑和棕白并列的横斑，故名斑尾榛鸡。斑尾榛鸡栖息在高山灌丛或针叶林中，尤喜栖于杜鹃灌木丛中。四川地方称杜鹃林为羊角林，故又称羊角鸡。随着分布区的不同，斑尾榛鸡的栖息地高度也不同。随着季节不同，有垂直迁移现象。主要吃植物性食物，如禾本科、沙草科植物的芽、嫩叶、根和种子，也吃小毛虫、伪步行虫和金花虫等。斑尾榛鸡数量稀少，是我国极为珍稀的特产鸟类。

雉鹑 ZHI CHUN

鸡形目 雉科 别名：四川雉鹑

雉鹑是我国的特产珍禽。分布于青海、甘肃、西藏东部、四川西部等省区。

雉鹑在动物分类上属于雉科，但它在绚丽多姿的雉类中极为逊色，长得小而难看，体重不足1千克。

雉鹑是典型的高山地栖雉类，常出没于杜鹃林中的空地。善于在地面上行走，不善于飞行，遇到意外情况突然起飞时，也只能飞几米到十几米。雉鹑的羽色和周围环境十分相似，即使它在附近灌丛中急速行走，如不十分注意，很难觉察它，往往是“只闻其声，不见其踪”。黎明时，人们可以听到雉鹑的宏亮叫声。在大雾或雨雪即将来临时它们往往高声鸣叫。这一特性已被人们用来预测小气候的变化。雉鹑的食物以各种植物为主，幼嫩的根、茎、叶、花等都吃，偶尔也吃昆虫。

四川山鹧鸪 SI CHUAN SHAN ZHE GU

鸡形目 雉科 别名：砣砣鸡、笋鸡

四川山鹧鸪是我国特产鸟类，仅分布于四川西南部，为留鸟。

四川山鹧鸪体长约30厘米。四川山鹧鸪栖息在海拔1200～

1900米高度的栎、栗、杜鹃、油茶等阔叶林下的浓密竹丛、灌木丛中。白天觅食，夜间在竹枝和灌丛上休息。平时单个活动，秋冬季集成小群。主要吃昆虫、蜈蚣、蜗牛以及悬钩子、胡颓子等植物的种子和果实。四川山鹧鸪每年4～6月进入繁殖期，在地面上营巢，每窝产卵5～6枚。

海南山鹧鸪 HAI NAN SHAN ZHE GU

鸡形目 雉科 别名：山赤姑

海南山鹧鸪是我国的特产鸟类，仅分布于海南省中、南部丘陵山地。

海南山鹧鸪体型似鹧鸪，但稍小。海南山鹧鸪栖息在低山丘陵地带的阔叶林、竹林及灌木、杂草丛生地带，在山林下层浓密的竹丛中尤为多见。冬季集成小群，多3～5只在一起，边走边觅食。觅食时走得很慢，扒抓落叶发出“沙沙”声响，此时较易被发现。以小野果和杂草子等为食，也吃蜗牛等。性机警，惊飞时分散潜逃，并发出急速叫声，上树后静伏不动，较难被发现。繁殖季节，分散营巢、产卵和育雏。

黑头角雉 HEI TOU JIAO ZHI

鸡形目 雉科

国内分布于西藏西南隅狮泉河流域的山地。国外分布于克什米尔地区的印度河流域。狮泉河和印度河是同一条河，在我国境内部分叫狮泉河。

黑头角雉单独或结小群在密林中活动。主要吃竹笋、植物嫩叶、细根、种子、浆果、橡实及昆虫等。黑头角雉每年5～6月开始营巢，每窝产卵3～6枚。雄鸟发情时，常竖起蓝色肉角，展开五彩缤纷的肉裾，那情景实不亚于孔雀开屏。黑头角雉产区狭窄，国内外数量都非常稀少，已经引起世界动物学家的广泛重视。

红胸角雉 HONG XIONG JIAO ZHI

鸡形目 雉科

国内分布于西藏春丕山谷及喜马拉雅山北坡。国外分布于尼泊尔、锡金、不丹及印度北部。

红胸角雉是角雉中体型大且色彩艳丽的种类。红胸角雉早晨及黄昏到开阔地区觅食，夜间宿于树上，喜欢吃植物的嫩芽、球茎、细根、果实及种子等。每年春暖花开的季节，是红胸角雉的繁殖时期，这时雄鸟将头上的肉角高高竖起，肉裾也充血膨大展开围在胸前，其肉裾异常绚丽动人。肉裾中央为蓝色，侧部为草绿色，两侧各具4～5个三角形赤红色斑块。雄鸟同时展开尾羽支撑在地面上，并颤抖双翅，发出短促低沉的咯咯叫声，随即与雌鸟交尾。

灰腹角雉 HUI FU JIAO ZHI

鸡形目 雉科

国内分布于西藏东南部及云南的贡山。国外分布于不丹东部、印度阿萨姆及缅甸西北部。

灰腹角雉栖息在海拔1800～4000米的潮湿森林里，常隐匿于茂密的灌丛中。以植物性食物为主，主要吃嫩枝、芽、叶、球茎、细根等，偶尔也吃昆虫等动物性食物。灰腹角雉和其他几种角雉一样，在每年春季发情时，雄鸟有求偶表演。灰腹角雉的肉裾全部展开时中央为黄色，边缘为天蓝色。整个求偶表演及交尾过程不过一二分钟。交尾过后，雄鸟又恢复常态。

灰腹角雉分布地区狭窄，数量极为稀少，又由于产地荒僻，故对灰腹角雉的了解不多。

黄腹角雉 HUANG FU JIAO ZHI

鸡形目 雉科 别名：角鸡、寿鸡、呆鸡

黄腹角雉是我国著名的特产珍禽。分布于浙江、江西、湖南、福建、广东、广西等省区。

黄腹角雉是所有角雉中分布最东和海拔最低的一种，栖息在海拔600～1600米的山地林区。常以家族小群为活动单位，出没于有长流水的沟谷、山洞和较潮湿的悬崖下。栖于丛生着灌木、竹类、蕨类等多层次的杂木林中。以植物性食物为主，也吃白蚁、蚯蚓、蛹和毛虫等动物性食物。性情较为迟钝，不善飞，行动缓慢，故有“呆鸡”之称。黄腹角雉有时和白鹇组成几十只的混合群，但夜宿时分开。3～6月繁殖，雄鸟有激烈的求偶炫耀活动，在树上筑巢，每窝产卵3～4枚，少数可达6枚，雌鸟孵卵。

虹雉（所有种）HONG ZHI

鸡形目 雉科

虹雉体羽光彩夺目的色彩，在鸟类中无与伦比，虹雉正由于其体羽闪耀着彩虹般的金属光泽而得名。分布于我国的虹雉有绿尾虹雉、白尾梢虹雉和棕尾虹雉。

—● 白尾梢虹雉 BAI WEI SHAO HONG ZHI

分布于我国西藏东南部及云南北部、西部等地。国外分布于缅甸东北、印度阿萨姆。栖息在海拔2500～3400米的杉树苔藓林、杜鹃林和竹林边缘，或栖息在山顶草甸上。繁殖季节多单个或成对活动，冬季结成小群，食物主要为野百合、蕨根、竹叶等。白尾梢虹雉在成群活动的地方，总由一只放哨，发现敌害，立即惊叫。其叫声单调，声音沙哑，很像家鹅，故当地群众称它“雪鹅”。每年4月开始繁殖，筑巢于岩石缝隙处，每窝产卵10～12枚。

—● 绿尾虹雉 Lü WEI HONG ZHI

是我国的特产雉类，分布于青海、甘肃、四川、西藏。栖息在海拔3300～4000米的多岩石灌丛、草甸地带。冬季下迁到约海拔1800米的低山常绿阔叶林内。平时成对或结成小群活

动。清晨和黄昏出来觅食，主食植物嫩叶、嫩茎，尤其喜食贝母的球茎，故有“贝母鸡”之称。营巢于陡崖岩洞或稠密灌丛中的地面上，每窝产卵3～4枚，多至11枚。绿尾虹雉数量极少，如不认真加以保护，这种珍禽将会灭绝。

棕尾虹雉 ZONG WEI HONG ZHI

分布于我国西藏南部和东南部，数量极为稀少。国外分布于阿富汗、克什米尔、印度北部、尼泊尔、锡金和不丹。棕尾虹雉是尼泊尔王国的国鸟。栖息在海拔2500～5000米的针叶、阔叶或针阔混交林下的灌丛间。终年成对活动，从不结群。性隐蔽，能飞较长距离。主要以植物的嫩枝、芽苞、块根、叶、花和果实为食。

褐马鸡 HE MA JI

鸡形目 雉科 别名：角鸡、耳鸡、鹞鸡、黑雉

褐马鸡是我国的特产珍禽。仅分布于我国山西省吕梁山脉、河北省西北部山区及北京灵山、小龙门林场。

褐马鸡通体浓褐色，角状耳簇羽白色，腰及尾羽基部白色，头侧赤红，尾羽翘起，羽枝披散下垂，颇具英姿。

褐马鸡栖息在海拔1600～1800米的针阔混交林中，有季节性垂直迁移现象。食物以各种植物的嫩根、茎、叶和果实、种子等为主，也吃蠕虫和各种昆虫。褐马鸡于3月下旬散群，进入繁殖期。这期间面部裸露部分由暗红变为鲜红，尾羽稍张开，体羽油亮，在日光下闪烁着金属似的光泽。雄鸡间有争偶斗争。由于褐马鸡勇猛好斗，尾羽美丽，所以褐马鸡的长尾羽就成了

古代武将帽盔上的装饰。自汉武帝时代起，这种武将戴鹖冠的制度一直传到清朝末年。这也是导致褐马鸡数量大量减少的原因之一。

褐马鸡的数量和分布范围都有限，由于国家采取了有力的保护措施，褐马鸡才开始繁盛起来。

蓝鹇 LAN XIAN

鸡形目 雉科 别名：蓝腹鹇、山鸡



蓝鹇是我国著名的特产珍禽。仅分布于台湾山地。

蓝鹇栖息在山地密林中，多在底层腐殖厚的缓坡地带活动。平时寂静无声，性机警、隐秘、怕人，很难被发现。多于晨昏出来觅食，奔走迅速，夜间在低树干上宿栖。主要吃各种植物的芽、嫩叶、种子、果实以及昆虫等。蓝鹇于每年3～6月繁殖，这期间雄鸟脸的裸出部有小疣状突，额上肉冠及脸部肉垂肿胀通红。雄鸟相遇，常会引起激烈格斗。蓝鹇通常是一雄配多雌，每窝产卵3～8枚，孵卵和育雏一般由雌鸟担任。

黑颈长尾雉 HEI JING CHANG WEI ZHI

鸡形目 雉科 别名：花地鸡、哑吧鸡

国内分布于云南、广西等地。国外分布于泰国北部、缅甸北部和印度阿萨姆。

黑颈长尾雉栖息在海拔1000～2800米的亚热带常绿阔叶林中的沟谷地带。常成对或成小群游荡觅食。主食橡实、浆果、种子、根、嫩芽、叶及蠕虫、昆虫等。它们飞行低而缓慢，很少

鸣叫，而且叫声低沉，几乎听不见，故有“哑吧鸡”之称。性机警，极难发现。黑颈长尾雉4月上旬开始繁殖，在地面或裸岩隙中营巢，每窝产卵6～9枚。

黑颈长尾雉分布狭窄，数量稀少，是罕见种，亟待加强保护。

白颈长尾雉 BAI JING CHANG WEI ZHI

鸡形目 雉科 别名：横纹背鸡、地鸡

白颈长尾雉是我国特产，分布于安徽、浙江、福建、江西、广东、广西、湖南等地。野外种群数量稀少。

白颈长尾雉喜欢栖息在阔叶林或混交林中，如果森林遭到砍伐，它们才转移到针叶林和竹林等其他生境中去。因为它喜欢在地面活动，人们常称它为“地鸡”。依季节的不同而成对或结小群活动。生性怯懦，很少鸣叫，不易发现其踪迹。善奔走和飞翔，很少与其他雉类混居。多于清晨和傍晚觅食，食物以豆荚、种子、浆果、嫩芽、根、茎等为主，也吃昆虫及卵，有时也到农田盗食农作物。4月初发情，一般一雄配多雌，在地面草丛中营巢，每窝产卵4～12枚，多为6～8枚，由雌鸟孵卵。

黑长尾雉 HEI CHANG WEI ZHI

鸡形目 雉科 别名：帝雉



黑长尾雉是我国台湾省特产，仅分布于台湾省高山地区。

黑长尾雉栖息在海拔1600～3300米的原始针、阔混交林或针叶林带的灌木丛中。生性谨慎，很少出声。晨昏间从栖处越过山

顶而下，在阴坡稠密灌丛或竹丛中的地面上觅食。主要吃野草莓、蕨类、植物幼根、竹笋等，也吃少量昆虫。

由于黑长尾雉是高级野味，其两条漂亮的尾羽，是人们喜爱和崇拜的头饰品，因此，捕捉活雉偷运国外，已成为一种牟取暴利的手段。台湾有关方面于1984年发出公告，规定“禁止捕猎、破坏及出口”黑长尾雉等三种珍贵动物。

孔雀雉 KONG QUE ZHI

鸡形目 雉科 别名：孔雀鸡、金钱鸡

国内分布于云南、海南，数量十分稀少。国外分布于锡金、不丹、印度、缅甸、泰国、老挝和越南等地。

孔雀雉是一种小型雉类，孔雀雉的冠羽虽不及孔雀的高耸，但也比较明显；尾上覆羽虽没有孔雀那样的“羽屏”，却有类似的“眼状斑”，故有小孔雀之称。

孔雀雉栖息在海拔1200米以下的丘陵或低山地带。常单独或成对活动。性机警，若受干扰，即行逃离，往往只闻其声，不见其鸟。多在林中灌丛密集的潮湿地面上活动、觅食。以植物性食物为食，也吃昆虫及小动物。

绿孔雀 Lü KONG QUE

鸡形目 雉科 别名：爪哇孔雀、越鸟

国内仅分布于云南西南部。国外分布于印度、中南半岛及印度尼西亚等地。

绿孔雀与蓝孔雀的区别是：雄鸟通体为辉翠蓝绿色，下背部闪着紫铜色光辉，冠羽呈簇状。绿孔雀雄鸟的“羽屏”长达1米多，雌鸟无“羽屏”。孔雀开屏，为人们展现一幅光彩夺目、华贵艳丽的图案。不少人误认为羽屏就是孔雀的尾巴，实际上孔雀的“羽屏”是尾上覆羽，真正的尾羽被掩盖在下面。“羽屏”上具有大型带金属光泽的“眼状斑”，色泽鲜艳，极为美丽。

绿孔雀栖息在海拔1300米以下的热带、亚热带低山河谷地

带。尤其喜欢在靠近溪河沿岸和林中空旷的地方活动。多见一雄伴三五只雌鸟的家族小群在一起活动。脚强健，善奔跑；两翅短圆，不善飞行；鸣声嘹亮，但不悦耳。多在晨昏间觅食，嗜食棠梨、黄泡等浆果，也吃草子、芽苗和作物种子，还兼食昆虫、蛙、蜥蜴等。

绿孔雀野生数量估计不足1000只。

黑颈鹤 HEI JING HE 48

鹤形目 鹤科



黑颈鹤是我国特产的珍稀鹤类，繁殖区在青海、西藏、四川、甘肃、新疆等省区；越冬地在贵州、云南和西藏中南部。国外在不丹和印度存有极小的群。

黑颈鹤是人们发现最晚的一种鹤，直至1876年才被人在青海发现。由于黑颈鹤数量稀少，分布区域狭窄，又是最后被发现的，所以与大熊猫、金丝猴齐名，是举世闻名的稀有珍贵动物。黑颈鹤是一种迁徙鸟类，往返于云贵高原和青藏高原狭窄范围内。多集群活动，主要以湿地植物为食。繁殖于青藏高原海拔2500～5000米高度的湖泊边缘及湖中沼泽地。在沼泽中营巢，每窝产卵2枚，孵化期31～33天。在黑颈鹤产地，民间称这种鹤为“神鸟”，传说清晨听见它的叫声，便可以辨别天气的阴晴。

黑颈鹤种群数量估计约为4000多只。

白头鹤 BAI TOU HE 49

鹤形目 鹤科 别名：玄鹤、锅鹤、修女鹤

国内分布于长江下游、沿海各省及东北各省。国外分布于俄罗斯、日本、朝鲜、韩国。

白头鹤栖息在河口、沼泽地、芦苇丛等湿地环境。在越冬期间，它每天上午到觅食地活动，中午到浅水湖滩休息，天黑前飞回宿地，结成大群在高地过夜。觅食时多以“家庭”为单位，各“家庭”小群间保持一定距离，其成员多为两只成年鹤带一只幼鹤。以小鱼、甲壳类、多足类、软体动物、昆虫及一些水草的根茎为食。其性机警，常有站岗的鹤，遇有惊动，就发出信号。白头鹤每窝产卵2枚，雌雄鹤共同孵卵和育雏。同一窝的两只雏鸟常格斗，故通常只能活一只。

在我国越冬的白头鹤估计约为1000只。

丹顶鹤 DAN DING HE

鹤形目 鹤科 别名：仙鹤、紫鹤

目前全世界已知的鹤类共有15种，我国产的有9种，几乎占世界鹤类的2/3。在这9种鹤中，丹顶鹤是人们最熟悉的一种鹤。除日本、朝鲜、俄罗斯有少量分布以外，主要分布在我国。丹顶鹤的主要繁殖地为内蒙古、黑龙江、吉林和辽宁；主要越冬地是日本、朝鲜半岛中部和我国长江下游湖泊地区及沿海一带。

丹顶鹤那火红的“丹顶”、洁白的身体、漫步的英姿、优美的舞蹈，颇受人们喜爱。雌、雄丹顶鹤从外形上难以区别，但可从其鸣叫声加以区分，雄鹤的叫声是连续的单音节，雌鹤是间断的双音节。

丹顶鹤主要栖息在有水湿地或泛水沼泽地带，通常要求有较高的芦苇等植物为隐蔽条件。食性较杂，主食植物种子、草根、昆虫、鱼、虾、贝类等。每年春天，丹顶鹤成小群从南方陆续飞回繁殖地。丹顶鹤是“一夫一妻制”，配偶有的可维持终身。丹顶鹤可活50～60年，故常被喻为长寿的象征。

白鹤 HAI HE

鹤形目 鹤科 别名：西伯利亚鹤、黑袖鹤

国内分布于东北各省至长江中下游。繁殖地主要在俄罗斯的西伯利亚。冬季到我国、印度和伊朗越冬。

白鹤体型较丹顶鹤略大，它除初级飞羽为黑色外，全身羽色洁白。白鹤被认为是鹤类中体态优美、鸣声动听、姿态高雅的一种。

白鹤是世界瞩目的珍贵动物，栖息在苇塘、草洲、浅湖和近水荒地等湿地环境。多结群活动，白鹤的夜间栖息地与觅食场所，通常在不同区域。白天觅食比较分散，夜间则都要集中在一起过夜。食物主要为水草根芽、小鱼、虾、蛙类和水生软体动物等；夏季还捕食蝗虫。白鹤一般多在每年10月下旬至翌年3月初在我国鄱阳湖越冬。此时正是鄱阳湖的枯水期，水位下降以后有开阔的浅水沼泽环境，而且有丰富的水生植物食源，适宜的气候条件，较少的外界干扰，这些条件综合构成了白鹤的越冬环境。

据世界动物园年鉴记载，在饲养的6种鹤类中，数白鹤的寿命最长，为61年。

赤颈鹤 CHI JING HE

鹤形目 鹤科

赤颈鹤的分布自印度经过东南亚至澳大利亚。主要繁殖于印度、缅甸，有的在我国云南西部和西南部越冬。

赤颈鹤是世界15种鹤类中最大的鹤。赤颈鹤生活在热带地区的开阔河谷地带。经常成对生活，有时携带一只或两只幼鹤一起觅食。以植物根、水生昆虫及软体动物为食。赤颈鹤的家族小群多在一个小范围内共同取食及活动。赤颈鹤每年7～8月繁殖，繁殖期间比较活跃，常展开双翅，低下头，然后跳向空中。每窝产卵2枚或1枚，双亲轮流孵卵，但以雌鹤为主。



赤颈鹤虽然在世界上数量较多，但在我国不仅分布范围小、数量也很稀少，有人怀疑，赤颈鹤在我国已经绝灭了。黑龙江扎龙自然保护区曾引进赤颈鹤，对其做了大量的驯化及研究工作，并成功地繁殖了幼鹤。

鸨（所有种）BAO 51

鹤形目 鸨科

分布于我国的鸨有大鸨、小鸨、波斑鸨。它们的分布区狭窄，数量十分稀少。现分别介绍如下：

大鸨 DA BAO

别名：地鹤、老鸨、羊须鸨

繁殖于我国东北、内蒙古、新疆；在我国东部地区越冬。大鸨是典型的草原鸟类，多栖息在草原及荒漠草原地带。善于奔跑，飞行较为缓慢而且低。多成群活动。主要以嫩绿的野草为食，繁殖时也吃昆虫、蛙类等，特别嗜食蝗虫。每年4～5月繁殖，此间雄鸨有精彩的求偶表演，交配后即各奔东西，“生儿育女”的重任由雌鸨承担。关于大鸨纯雌无雄的说法，可能由此错觉而来。历史上曾流传鸨有雌鸟无雄鸟的错误说法。说雌鸨可以和任何一种雄鸟交配而繁衍后代。后人据此把旧社会开妓院的老板娘称为老鸨。

小鸨 XIAO BAO

别名：地鹤

国内仅分布于新疆。国外分布于印度、欧洲。栖息在荒漠，

也见于废弃的耕地和农田的边缘。冬季常集10只左右的小群。是一种很机警的鸟，一听到危险的声音就立即飞走。主要吃植物的芽、鳞茎、种子，也吃昆虫等。4～5月繁殖，由雌鸟筑巢，每窝产卵3～4枚，孵化期20～22天。

波斑鸨 BO BAN BAO

别名：地鵏

国内仅分布于新疆北部和西部及内蒙古。体型介于大鸨与小鸨之间。常在农田中取食，主要以一些豆科植物为食。平时行动缓慢，但善于奔跑。4～5月繁殖，每窝产卵2～4枚，孵卵和育雏由雌鸟担任。

遗鸥 YI OU

鸥形目 鸥科　别名：中亚鸥、钓鱼郎

国内繁殖于内蒙古，迁徙时经山西、河北、北京等地。在国外分布于哈萨克斯坦和蒙古东部的一些湖泊中。

遗鸥的形态与棕头鸥非常相似，故自1931年发表发现遗鸥这个新种之后，一直被认为是棕头鸥的变型，或者可能是鱼鸥与棕头鸥的杂交种。遗鸥最初的描述像是一个亚种，这是由模式标本的彩色照片看出的。1971年，一位鸟类学家发表文章承认它是一种独立种，并展示了11只遗鸥的照片，指出它与其他鸥的不同处。据描述，遗鸥与棕头鸥的主要不同是：遗鸥暗黑色的头，着色部分很宽，有明显的眼斑、粗壮的嘴及比较鼓而稍长的跗蹠。总之，遗鸥是否为新种，仍无公认的定论，其分类地位尚需进一步调查研究。

四爪陆龟 SI ZHAO LU GUI 52

龟鳖目 陆龟科　别名：草原龟、旱龟

我国有3种陆龟，即四爪陆龟、缅甸陆龟和凹甲陆龟。四爪陆龟国内分布于新疆西部。国外分布于伊朗、阿富汗、印度

等地。

四爪陆龟多栖息于黄土丘陵草原或半荒漠地区。隐匿于洞中，白天外出活动、觅食，以植物的嫩枝叶、草为食，有时也啃食灌林的树皮。每年3～4月相当活跃，此时气候温和，食物丰盛，它们从日出到日落，四处爬行觅食。许多猛兽和猛禽都捕食它们，尤其是幼年的四爪陆龟，更容易受害。

四爪陆龟数量目前估计约1000只，十分珍贵。

鼋 YUAN

龟鳖目 鳖科 别名：绿团鱼、癞头鼋

国内分布于云南、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等地，国外分布于由缅甸向南至菲律宾以及印度等地。

鼋是鳖类中体型较大的一种，一般体长26～72厘米，大者可达1.29米。背甲近圆形，最大直径可达1米左右。它与鳖（甲鱼）的明显区别在于吻突短，长度不到眼径的一半。

鼋栖息在我国南方的江河湖泊中，那里的水色清深，鼋的背腹甲具有很好的保护色，在水中活动时很难被发现。鼋捕食鱼、虾及各种软体动物。鼋每年5～8月繁殖，分批产卵，每次产卵几枚至几十枚。

鳄蜥 E XI

蜥蜴目 鳄蜥科 别名：懒蛇、睡蛇、雷公蛇

鳄蜥在分类上属于独科独属独种。在世界上仅分布于我国广西大瑶山金秀瑶族自治县，故又称瑶山鳄蜥。

鳄蜥的样子像蜥蜴，但尾巴背面两行排列整齐的纵向棱脊，很像鳄的尾巴，因而得名为鳄蜥。鳄蜥体长约15厘米，尾长约20厘米。

鳄蜥喜欢栖息在流速缓慢的山沟小溪或积水荡边。它白天常在树枝上昂首四处张望，寻找食物。受惊时便跳入水中躲藏，潜水可达20分钟之久，因此当地人又称它“落水狗”。主要吃

昆虫、小鱼及蝌蚪等。在冬季天气寒冷、食物短缺时，它在树洞、岩石缝隙或土穴中冬眠，春季温暖时再出来活动。

为了保护这一世界珍稀动物，我国已建立鳄蜥自然保护区。除了严禁捕杀外，还保护其赖以生存的环境。

巨蜥 JU XI

蜥蜴目 巨蜥科

巨蜥分布于南亚、东南亚及澳大利亚北部，约有20多种，我国只产一种。分布于广东、广西、云南及海南等地。

世界上最大的蜥蜴是分布在印度尼西亚科摩多岛上的科摩多巨蜥，头尾全长达4米左右。巨蜥是世界上体型第二大的蜥蜴，体长约2米。

巨蜥栖息在山区溪流附近、潮湿的森林中或河口、水塘附近。昼夜均外出活动，以清晨和傍晚最频繁，它善于游泳，也会爬树。它捕捉鱼、蛙、虾、蟹等为食，能爬上树去捕食小鸟和鸟卵，也吃其他爬行动物、鼠类和昆虫以及动物尸体，偶尔还会到村庄里盗食家禽等。巨蜥每年6月间在岸边洞穴或水边树洞里产卵15～30枚。

蟒 MANG

54

蛇亚目 蟒科 别名：黑尾蟒、南蛇、蚺蛇、琴蛇

蟒分布于亚洲南部。在我国分布于云南、贵州、福建、广东、广西、海南等地。

蟒体长一般为5～6米，长者可达7米以上，体重约60千克。

产于我国的蟒是世界上最大的三种蟒之一。

蟒栖息在热带及亚热带地区的森林或溪涧附近。蟒猎食时，先迅速咬住猎物，然后用前半段身躯紧紧地缠绕几圈，将猎物活活勒死后，再从容吞吃。鳞能吞食比自己躯体粗得多的动物。因为蟒的新陈代谢缓慢，饱餐一顿后可以数周甚至数月不吃。关于蟒如何凶猛和躯体多么巨大的传说很多，其实蟒很少伤人。蟒一般在6月开始产卵，每次产卵10～100枚。雌蟒孵化时体温比平时高3～6℃。

扬子鳄 YANG ZI E

鳄目 鼍科 别名：中华鼍、土龙、猪婆龙



扬子鳄是我国的特产动物，分布于长江中下游一带，主要产于安徽、江苏、浙江和江西的局部地区。

扬子鳄体长2米左右。皮肤革质，有角质大鳞及骨板，背面及尾部鳞片略呈方形，并纵横成行排列；鼻孔及耳孔有活动瓣膜，潜水时瓣膜关闭。趾间有蹼，爬行和游泳都很敏捷，尾长而侧扁，粗壮有力，既能在水里推动身体前进，又可作为攻击和自卫的武器。

扬子鳄栖息在河流、水塘、沼泽等浅水区域，白天隐藏在岸边洞穴里，夜晚出来猎食。主要吃鱼、蛙、水禽和鼠类。洞穴建在近水的地方，洞有数个出入口，可通到陆地和水中。每年10月下旬至翌年4月间进行冬眠。在夏季天气炎热而又干旱无雨时，亦进行较短时间的休眠。

调查显示，野生的扬子鳄目前已不足200条。但我国保护

区里的扬子鳄已发展成世界上最大的扬子鳄人工种群，使扬子鳄这一濒临灭绝的珍稀动物成功地跨过了“濒危线”。

—● 中华鲟 ZHONG HUA XUN

鲟形目 鲟科 别名：鳇鱼、鲟鲨、腊子

中华鲟是江海洄游性鱼类，主要分布于我国长江、珠江、钱塘江和黄河等大江中。目前，黄河、钱塘江均已绝迹，珠江数量极少，仅长江数量较多。

中华鲟体重大多有50千克以上，其中以100～200千克的为多，最大的体重可达500千克，四川省民间有句俗语：“千斤腊子万斤象（指白鲟）。”

中华鲟是珍贵鱼类，它至今仍保留着古老的软骨硬甲形态，所以被称为古生物活化石。中华鲟有固定不变的洄游之路。生殖季节在秋季，亲鱼从近海泅游到长江上游的金沙江一带产卵。孵化出来的幼鲟顺江漂流游入大海。大约10年后，成熟的幼鲟从大海返回长江上游的产卵场去繁殖后代。1981年葛洲坝大江截流成功，切断了中华鲟的回归之路。后据调查表明，中华鲟在大坝下游又觅到了新的产卵场。与此同时，有关科研单位每年向长江投放人工繁育的幼鲟数十万尾。

—● 达氏鲟 DA SHI XUN

鲟形目 鲟科 别名：沙腊子、小腊子

主要分布于我国长江中上游干支流的河口地区，以四川江段为主。

达氏鲟个体较小，体长约1米，体重5～15千克。达氏鲟主要栖息在泥沙底质的宽阔湾沱，故被沿江渔民称为“沙腊子”。每年6～8月涨水季节，由于进入长江上游各大支流索饵，8～9月洄游到深水处越冬。达氏鲟和中华鲟都是白垩纪残留下来的孑遗种类，所以在学术上具有重要的价值，被列为珍贵种类。由于达氏鲟具有性成熟早、定居、杂食性等特点，可作为三峡水

库等大型水库的养殖对象。

—● 白鲟 BAI XUN

鲟形目 匙吻鲟科 别名：象鱼、象鼻鱼、剑鱼、鲔



主要分布于我国长江、钱塘江和黄河下游地区，偶尔也进入沿江的大型湖泊中。白鲟一般体长2～3米多，体重在200～300千克，最大体长可达7.5米，体重达1000千克。四川俗语“千斤腊子万斤象”中的“象”就是白鲟。因其鳃盖大，形如象耳，吻形长如象鼻，因此得名“象鱼”。

白鲟是我国的特产珍稀鱼类，也是世界上最大的淡水鱼。生活在河流的中下层。性情凶猛，主要吃其他鱼类，也吃虾、蟹等动物。白鲟科化石见于白垩纪末期，白鲟科鱼类现仅存2个种，一种为产于北美密西西比河流域的匙吻鲟。另一种即产于我国的白鲟，它们具有重大的动物地理学、鱼类以至脊椎动物的起源与演化等多方面的研究价值。白鲟是一种极有开发前途的鱼类。

国家重点保护野生动物（二级）

短尾猴 DUAN WEI HOU 58

灵长目 猴科 别名：红面猴、断尾猴、大青猴

国内分布于南部和西南部。国外分布于印度和中南半岛。

短尾猴，顾名思义尾巴很短，只有5.5～7厘米，只占身长的1/10，而猕猴和台湾猴等的尾长都超过身长的1/2。由于其颜面为褐红色，故又称“红面猴”。不同地区的短尾猴的形态有差别。以广西为例，分布在广西南部的短尾猴毛稀而长，呈褐黑色。而广西北部的短尾猴的毛则较短而浓密，呈青灰色。因而有“青猴”之称。

短尾猴生活在热带和亚热带地区，栖息于多岩石而有树木的山上。喜欢在地面上活动，常数十只一起过着群居生活。它们夜晚休息睡觉，白天出来活动、觅食。食性较杂，除吃野果、野菜、嫩叶、花芽、竹笋等植物性食物外，也吃昆虫、螃蟹、青蛙等动物性食物。

猕猴 MI HOU

灵长目 猴科 别名：广西猴、恒河猴、黄猴

猕猴广泛分布于我国长江流域及以南各地区，在陕西、山西、河南、河北、青海、西藏有少量间断分布。国外分布于尼

泊尔、印度、孟加拉、巴基斯坦、阿富汗和东南亚地区。

猕猴体型较小，面部肉色没有毛，臀部有红色胼胝；两颊有供暂时储藏食物的颊囊。因最初定名的标本在孟加拉恒河畔采得，所以又称作“恒河猴”。

猕猴为半树栖性，喜欢在植被茂盛的河岸边或沿河两岸的岩壁上活动。喜群居，常结成十余只甚至一二百只的大群在一起生活。每群有一体格健壮的雄猴作首领，就是所谓的“猴王”。猕猴的听觉、视觉灵敏，行动敏捷，善于攀缘跳跃。它们夜间在树上或岩洞中休息，白天在树上或地上活动觅食。主要以野果、野菜为食，也吃竹笋、芭蕉花、椰子花，偶尔也吃鸟蛋和昆虫。

藏酋猴 ZANG QIU HOU

灵长目 猴科 别名：四川断尾猴、青猴、红面猴

藏酋猴是我国的特产猴类。主要分布于四川西部、北部，西藏及甘肃南部；陕西、湖北、湖南、安徽、江西、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南等省区也有分布。

藏酋猴是猕猴属中体型最大的一种。短尾猴和猕猴一般重10千克左右，而雄性藏酋猴有20多千克重，甚至有过一只重33.5千克的记录。老年的猴子在两颊和颏下常生出相当长的须毛，这个特点在猴类中是独一无二的。

藏酋猴栖息在高山峡谷的阔叶林、针阔混交林或稀树多岩的地方。由于体毛厚密，很能耐寒。喜欢群居，常结队下山觅食。主要吃野果、野菜、植物种子，偶尔也吃昆虫、蛙类、小鸟和鸟蛋等。生活在峨眉山、黄山上的猴子就是藏酋猴。由于这些猴子见惯了游山客，大都不怕人。早在明清时期，峨眉山就有“山猴与人相亲”的生动记载。

穿山甲 CHUAN SHAN JIA

鳞甲目 鲮鲤科 别名：鲮鲤



国内分布于南方各省。国外分布于缅甸、锡金、尼泊尔等地

穿山甲除腹面及四肢内面生毛外，其余部分被角质鳞甲。头部细长成锥形，四肢短，各具五趾，趾有爪，前肢第三趾之爪长细而弯曲，适于挖掘。

穿山甲是南方润湿地带丘陵山地的一种食蚁兽。一般单独或成对生活。善于挖洞，居住在地洞中。洞的直径约15～30厘米，洞深约3～4米，末端有圆的窝，周长约2米。穿山甲营夜间生活。主要吃白蚁和蚂蚁，其中白蚁约占全年食物总量的2／3。有时也吃某些软体的昆虫和昆虫的幼虫。穿山甲遇到敌害时，如来不及跑回洞穴，便将身体蜷成一个圆球，边缘锋利的鳞甲片竖立起来，起到有效的保护作用。

—● 豺 CHAI

食肉目 犬科 别名：红狼、豺狗、棒子狗、亚洲野狗

豺在我国分布广泛，除台湾、海南及南海诸岛外，其余省份均有分布，但数量稀少。国外分布于亚洲东部、南部，北至西伯利亚。

豺体型比狼小，比狐大。体毛赤棕色，所以又称“红狼”。豺栖息环境较为广泛：包括森林、山地和热带丛林，以南方有林的山地、丘陵地区数量较多。性群居，经常5～10只或10余只成群活动，多在晨昏外出猎食。性情凶猛，行踪诡谲，往往采取围攻的方法捕食狍、麂、麝、野猪等，敢于成群进攻马鹿或扭角羚等大型动物。过去常把豺和狼视为害兽，其实，它们在生态平衡中起着重要的作用，应该保护它。

—● 黑熊 HEI XIONG

食肉目 熊科 别名：狗熊、黑瞎子

黑熊的分布地区较广，在我国几乎遍布南北各地。国外分布于亚洲大陆及其邻近岛屿。

黑熊体型比棕熊小，体重一般在100～150千克，个别可达200千克。全身毛色黑而富有光泽，胸前有一由白色短毛构成的新月形斑，这是黑熊的主要特征。

黑熊栖息在山林中，有垂直迁移现象，夏季多登至高山处，冬季下至低山处。善于爬树和游泳。食性很杂，由于捕猎能力低，一般很少食肉，以植物性食物为主，如各种浆果、野果、块根、嫩芽、野菜等，也吃鱼、蛙、鸟卵及小型兽类，喜欢掏蜂巢。性孤独，不喜合群。黑熊有冬眠习性，在南方有的地区它不冬眠。黑熊嗅觉和听觉较灵敏，但视觉较差，故有“黑瞎子”之称。

—● 棕熊（包括马熊）ZONG XIONG

食肉目 熊科 别名：马熊、人熊

国内分布于黑龙江、吉林、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、贵州等省区。国外分布于欧亚和北美等地。

棕熊共有10余个亚种，我图产3个亚种，即东北棕熊、马熊和喜马拉雅棕熊。棕熊体毛为深棕色，但不同亚种和产地的棕熊，其体型大小和毛色也各有差异。我国产的棕熊一般体长约2米，肩高约1米，体重可达200千克以上。

棕熊栖息在山地林区，夏季到海拔较高的山上，春秋两季下到海拔较低处，冬季则多在洞中冬眠。棕熊喜欢独居，只在每年的春末夏初发情期才结伴。它们各有自己的地盘，互不侵扰。棕熊的嗅觉和听觉灵敏，奔跑速度也相当快。棕熊是以素食为主的杂食动物，主要吃野果、青草、树根、种子及昆虫、鱼、鸟、狍等，最喜欢吃蜂蜜。

小熊猫 XIAO XIONG MAO

食肉目 浣熊科 别名：小猫熊、九节狼、金狗

国内分布于四川、西藏、青海、陕西、贵州、云南等省区。国外分布于印度、尼泊尔、锡金和缅甸等地。

小熊猫蓬松的长尾上有9个棕褐色与黄白色相间的环纹，故有“九节狼”之称。

小熊猫栖息在高山峡谷地带。夏季多栖息在溪流河谷有树荫的坡地，冬季则转移到阳光较充足的山坡河谷边。多结成家族小群活动。白天通常在树上休息睡觉。夜间以空树洞或石洞为穴。清晨和傍晚出来觅食，喜欢吃嫩竹叶、竹笋，其食物99%由竹子组成；也吃草、根茎、坚果、野果，有时也吃鸟卵及小鸟等。它行动灵活，善于攀爬，遇有危险时，会立即爬到大树很高很细的枝头上躲藏起来。

石貂 SHI DIAO

食肉目 鼬科 别名：榉貂、岩貂、扫雪

国内主要分布于西北、华北和西南多省区，国外分布于欧亚大陆。

石貂栖息在荒沟、岩坡、沟渠及灌木林边，通常在树洞中、岩石缝间、碎石空隙等处躲藏休息。晨昏间活动频繁，善攀缘，性胆大凶狠。石貂虽然善于爬树，但在遇到危险时，多在地面上逃跑并躲藏到乱石堆中去。主要捕食各种野鼠、松鼠以及野兔、鸟类等，也吃植物性食物，如浆果、野果等。石貂能捕食大量鼠类，因而对农业有利。

石貂数量十分稀少，许多地区已濒临绝灭。

黄喉貂 HUANG HOU DIAO

食肉目 鼬科 别名：青鼬、蜜狗、黄猺、黄颈黄鼬

黄喉貂在我国分布较广，几乎遍及南北各地。国外分布于俄罗斯东部、朝鲜半岛、印度和东南亚等地。

黄喉貂是一种林栖动物，穴居在树洞或岩洞中。晨昏间活动比较频繁。多数成对活动，成群活动较少。行动小心而隐蔽，善于攀缘树木，是鼬科动物中比较喜欢上树的种类。黄喉貂性情凶猛，动作极为灵敏，能像狼一样合伙捕杀比它大几倍的动物，如小鹿、赤麂等食草兽，有时连紫貂也受其害。黄喉貂以动物性食物为主，除捕食小鹿、麂、松鼠、野鼠、野兔、雉鸡及小鸟等动物外，还经常上树采食各种野果。因为黄喉貂嗜食蜂蜜，故有“蜜狗”之称。

水獭（所有种）SHUI TA

食肉目 鼬科

分布于我国的水獭有3种，即普通水獭、江獭和小爪水獭。3种水獭的栖息环境和分布地域不同，但外形十分相似，容易混淆。

—● 水獭 SHUI TA

别名：獭、獭猫、鱼猫



分布于欧洲、亚洲和非洲北部，我国南北各地都有分布。

栖息在河流和湖泊一带。尤其喜欢生活在两岸林木繁茂的溪河边和大面积的沼泽地、低洼湿地以及池塘等处。水獭是半水栖兽类，是优秀的游泳和潜水能手。食物以鱼类为主，也吃蛙、龟和水生无脊椎动物，还猎食鸟和小哺乳动物。在亚洲，人们驯养各种水獭帮助人来捕捉鱼。

小爪水獭 XIAO ZHUA SHUI TA

别名：山獭、油獭、水獭

小爪水獭分布于亚洲南部。在我国分布于广东、广西、海南、云南、西藏和福建的局部地区。

顾名思义，小爪水獭的爪很小，其爪不突出趾垫。小爪水獭的习性与水獭相似，通常栖息在河流、湖泊和溪水的地方。多结成小群在一起生活。小爪水獭善于游泳，行动矫健敏捷。其趾端的触觉非常敏锐，曾有人看见它拿小石子玩，就像魔术师变戏法一样。在小爪水獭和水獭共同分布的地区，不会出现相互竞争食物的现象，原因是小爪水獭主要吃贻贝、蜗牛和蟹，不像水獭那样吃鱼、蛙较多。

江獭 JIANG TA

国内仅分布于云南省西部的盈江县和广东省台山县等地。小爪水獭和江獭种群数量都不多，对其应加强保护。

斑林狸 BAN LIN LI

食肉目 灵猫科 别名：斑灵狸、虎灵猫、点斑灵狸

国内分布于西藏、云南、四川、贵州、广东、广西等省区，分布范围虽广，但数量非常稀少。国外分布于尼泊尔、不丹、锡金、印度、缅甸、越南、老挝等地。

斑林狸体型较小，纤细而优美。尾长30～35厘米，约占体长的80%～90%。斑林狸栖息在海拔2700米以下的热带、亚热带森林及林缘灌丛、草丛等处。斑林狸为夜行性动物，善于攀缘，主要在地面活动。行动快速敏捷，故又叫“彪鼠”。主要捕食鼠类、蛙类、小鸟和昆虫等。

大灵猫 DA LING MAO

食肉目 灵猫科 别名：九节狸、九江狸、灵狸、麝香猫

国内主要分布于南方各省。国外分布于印度、孟加拉、尼

泊尔和中南半岛。

大灵猫体型远大于家猫，体长60～84厘米，体重6～11千克。大灵猫外貌很像小灵猫。但从以下几点可以很容易把这两种动物区分开：大灵猫体型比小灵猫大，吻部比小灵猫的长，而且没那么尖；两耳之间的距离比小灵猫的大；沿背脊从头部到尾基部有一条竖立着的黑色长鬃毛。

大灵猫栖息在树林、灌丛和草丛中。一般营独居生活，白天在茂密的灌丛和高草中睡觉，晚上出来活动猎食。它在林缘、溪水畔和村落附近觅食，捕食小哺乳动物、鸟、蛇、蜥蜴和昆虫，也吃鸟卵、果子和根茎。大灵猫产的灵猫香数量比小灵猫的多。灵猫香可入药，其功用与麝香相似，因而大灵猫又称“麝香猫”。

小灵猫 XIAO LING MAO

65

食肉目 灵猫科 别名：七间狸、香狸子、香猫、笔猫

国内广泛分布于华东、华南和西南。国外分布于印度、斯里兰卡和印度尼西亚等地。

小灵猫体型比家猫略大，体长45～63厘米，体重一般为2～4千克。全身棕灰色，其上布满黑色斑点，背部有6～8道深色纵向斑纹，尾上有7～9个黑白相间的环纹，故又名“七间狸”。

小灵猫栖息在多树的山地，喜居于混交林灌木丛及草丛中。小灵猫属杂食性动物，吃各种小动物，如鼠类、蛙、蜥蜴、鸟及昆虫，也吃鸟卵、野果和树根，还喜欢吃腐肉。小灵猫跟大

灵猫一样，肛门附近都有一对隆起的腺体，在遇到敌人时会排出大量奇臭的分泌物，作为自卫武器。这种分泌物叫作灵猫香，经过加工精炼可制成定香剂，是制作香水的原料。小灵猫的针毛及尾毛均可制笔，故有“笔猫”之称。

草原斑猫 CAO YUAN BAN MAO

食肉目 猫科 别名：野猫、土狸子

国内分布于新疆、甘肃、宁夏、四川、云南等省区。国外广泛分布于欧洲、非洲大部分和亚洲中部与西部。

草原斑猫体型粗壮，大于家猫，体长50～70厘米。草原斑猫能适应各种生境，从宽阔平原的湖边、河汊到孤立的沙丘，以及芦苇、灌丛中都能见到它。它一般居住在洞中，有时也栖于树窟内，并常利用獾的废巢。在山区，它一般生活在海拔2000米以下地区。草原斑猫昼夜均活动，往往单独捕食，隐蔽守候猎物。它主要吃啮齿动物，如：麝鼠、黄鼠、家鼠及跳鼠，还捕食雉等体型较大的鸟类，也吃蜥蜴、昆虫、浆果、沙棘等。叫声与家猫相似，善于游泳和爬树。

荒漠猫 HUANG MO MAO

食肉目 猫科 别名：草猫、漠猫、草狯狸

荒漠猫是我国十分珍贵稀少的特产动物。分布于四川、青海、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古、新疆等省区。

荒漠猫体型略大于家猫。体重约8千克。荒漠猫栖息在高山森林、荒漠及草原边缘地区。栖息高度为2800～4100米。在西北地区常栖于荒漠和草原的边缘，在青海则见于祁连山地。荒漠猫属夜行性动物，白天很少活动，夜间出来觅食。主要捕食草原、沙漠中的鼠兔、鼢鼠等小型啮齿类动物，有时也吃鸟类和蝙蝠。由于荒漠猫数量极为稀少，其生境又在高山森林或荒漠地区，因而人们对它的生态、习性知道得很少。

丛林猫 CONG LIN MAO

食肉目 猫科 别名：狸猫、麻狸

国内仅分布于云南和西藏南缘，数量非常稀少。国外分布于亚洲中西部与南部。

丛林猫体长60～75厘米。丛林猫栖息在岸边灌丛、山地林缘或具高草的田野。丛林猫是夜行性动物，多在清晨前或黄昏后觅食，白天很少出来活动。丛林猫多居于獾、豪猪或狐的旧洞里。主要捕食鼠类、兔和较大型禽类，如雉、鹧鸪等，偶尔也吃腐肉及果实。它的嗅觉、听觉灵敏，善于爬树、跳跃。性情凶猛，敢与狗斗。

猞猁 SHE LI

食肉目 猫科 别名：猞猁狲、马猞猁、羊猞猁、林狍

猞猁广泛分布于欧洲和亚洲北部，在我国分布于北方各省和青藏高原。

猞猁生境相当复杂，随产地不同，其适应的生活环境也不同。它基本上是北温带寒冷地区的产物，其体毛厚长，能耐寒，不畏风雪。猞猁在清晨和黄昏时特别活跃。主要靠视觉和嗅觉猎食，听觉器官也很发达。主要捕食各种野兔；还捕食各种松鼠、野鼠以及各种鸟，特别是野鸽和雉类；有时还袭击麝、狍子和小鹿；冬季也猎杀体弱或生病的驼鹿、驯鹿等大型动物。猞猁勇猛有力，行动敏捷灵活，善于攀爬，也会游泳。

兔狲 TU XUN

食肉目 猫科 别名：羊猞猁、乌伦、“玛瑙勒”（蒙）

国内分布于新疆、西藏、青海、四川、甘肃、内蒙古、河北等地。国外分布于中亚诸国及蒙古。

兔狲体型大小似家猫，体毛长而密；体长47～65厘米，体重2～3千克。

兔狲栖息在草原、荒漠或戈壁地区，也能生活在林中。它

一般独栖，不成群。主要在夜间活动、觅食。兔狲主要猎食小型啮齿动物，如鼠类，也吃小鸟、卵和昆虫。在冬季食物短缺时，它白天也会出来猎食或是潜伏在村落附近寻找食物。兔狲的视觉、听觉器官非常发达，叫声和家猫相似，但比家猫叫声粗哑。在向敌人进攻时，会发出刺耳的鼻嗤声。

金猫 JIN MAO

68

食肉目 猫科 别名：原猫、狸豹、芝麻豹、黄豹、红春豹

国内分布于陕西、甘肃、四川、河南、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南、西藏等省区。国外分布于南亚和东南亚。

金猫是一种大型野猫。成年雄猫体长可达90～110厘米，体重10～16千克，雌猫体重一般为8～12千克。

金猫栖息在热带、亚热带山地各种森林中。金猫是孤独的夜行性动物，生活比较隐蔽，因而很难见到。性情凶野勇猛。食物以小啮齿类动物和鸟类为主，有时也袭食小型的鹿、麂、麝等。

渔猫 YU MAO

食肉目 猫科

国内仅于台湾省有过记录。国外分布于尼泊尔、印度、缅甸、泰国至印度尼西亚。

渔猫体长66～85厘米。渔猫一般生活在水边灌木丛中。是一种有趣的动物，常到河流或溪流附近捕鱼吃。捕鱼时蹲伏在

河边岩石或小悬崖边，待小鱼游近后，突然用爪捕捞，将鱼掷到岸上。渔猫不仅吃鱼，还吃螃蟹、啮齿类动物、鸟类、甲壳类、软体动物等。渔猫性情凶残，敢于攻击体型比它大很多的动物。在人工驯养数年后仍具有攻击行为。

鳍足目（所有种）

鳍足目动物是适应水栖生活的食肉哺乳动物。分布于南北半球寒带和温带海洋。鳍足目动物的身体一般呈长纺锤形，四肢变为鳍状，适于游泳，故名“鳍足目”。鳍足目动物一生大部分时间生活在水中，通常仅在休息、交配、产仔和换毛时期才到陆地或冰块上来。鳍足目动物主要种类有海狗、海豹、海狮、海象等。

海豹 HAI BAO

栖息在太平洋和大西洋，全世界都有分布。海豹是我国海域数量较多的种类，多见于渤海和黄海。海豹一生大部分时间在大海中，只在繁殖和休息时才爬上海岸。海豹多在浮冰上产仔，幼仔全身乳白色，是很好的保护色。有护幼习性，小海豹被捕时，大海豹往往跟着不放。

海狗 HAI GOU

栖息于北太平洋，在我国偶见于黄海和东海。雌雄海狗体型差异很大，雄性体长约2.5米，重约300千克；雌性体长约1.5米，重60余千克。海狗平时生活在大海，生殖、换毛或休息时到陆地或冰上来。海狗喜欢吃乌贼，也以各种鱼类为食，食量很大，一天食鱼可达20多千克。

海狮 HAI SHI

主要有北海狮、南海狮、南美海狮和灰海狮。北海狮体型最大。海狮在我国偶见于东海。海狮家族是“一夫多妻制”。一

般每个生殖群中，有雌海狮10～20头。雌海狮只关怀自己的亲生儿女，对同伴的儿女却残酷无情，不但不给奶吃，还会恐吓、威胁。

—● 海象 HAI XIANG

分布于北极圈内，我国没有分布。

其他鲸类（一级保护之外）

鲸类分布于全世界各海洋。

鲸类是完全水栖的哺乳动物。外形似鱼，大小随种类而异，最小的体长只有1米左右，最大的体长达30米，体重达150吨。前肢呈鳍状，后肢完全退化；有的背上有鳍；尾呈水平鳍状。皮下有一层厚脂肪，借此保温和减少身体比重，有利于浮游。

鲸用肺呼吸，在水面吸气后即潜入水中，可潜泳10～45分钟。一般以浮游动物、软体动物及鱼类为食，有的种类也捕食企鹅、海豹等。胎生，通常每胎1仔。



鲸目分两个亚目。

（1）须鲸亚目：无齿，有鲸须，如长须鲸、蓝鲸、小鳁鲸等。

（2）齿鲸亚目：有齿，无鲸须，如海豚、江豚、抹香鲸、虎鲸等。

分布于我国海域的鲸类有露脊鲸、灰鲸、蓝鲸、长须鲸、鳁鲸、小鳁鲸、座头鲸、抹香鲸、虎鲸、伪虎鲸、真海豚、宽吻海豚、江豚等。

体型最大的蓝鲸是世界上现存的最大动物。

虎鲸 HU JING

鲸目 巨头鲸科 别名：逆戟鲸

多结小群活动，属于母系制，典型虎鲸群的成员有：祖母、母鲸和它的子女。呼吸时喷出的雾柱高1～2米。往往只呼一次就行大潜水。潜水时能游极远的距离。游泳速度很快，时速可达30海里。虎鲸富有眷恋性，通常不轻易离开负伤的同伴。虎鲸除食大型鱼类外，还追食海豹、海狗、海象、海豚等，甚至袭击大型的须鲸类。旅行家常把虎鲸说成变化无常的“海妖”，渔业人员则把虎鲸称作“海上霸王”。通过对虎鲸的观察研究，发现虎鲸智力出众，完全可以成为人类的朋友。

江豚 JIANG TUN

鲸目 鼠海豚科 别名：江猪、海猪、海和尚

在我国分布于各海区沿岸及各大河口，在长江中的分布可达湖北宜昌一带，偶有少数进入洞庭湖内。江豚对环境的适应能力很强。通常栖息在咸淡水交界的海域，也能在淡水中生活。一般不密集成大群，在春季繁殖期单一水域内往往有数十头至成百头，但群体比较疏散。食性较广，以鱼类为主，也吃虾类和头足类。

海豚 HAI TUN

鲸目 海豚科

喜群居，常数十头乃至数百头成群。喜食群游鱼类，常追逐鱼群向各处移动，渔民往往根据海豚的出没来判断鱼群的所在。

目前海豚已成为科学研究的重要对象。它具有精密的声纳系统，能够准确无误地识别目标。海豚的大脑特别发达，按脑与体重的比例，仅次于人类，而且大脑沟回很多。海豚的学习和模仿能力远远超过猴子和猩猩。古今中外流传着许多有关海豚与人交朋友，以及海豚救人的动听故事。

伪虎鲸 WEI HU JING

鲸目 巨头鲸科 别名：拟虎鲸

个头比虎鲸小得多，雄鲸体长只有5.7米，雌鲸更小。伪虎鲸喜欢结群活动，多结成数十头或数百头甚至上千头的大群。游速较慢，不喜欢跃出水面。每回呼吸3～4次，喷出的雾柱高约1米。伪虎鲸没有虎鲸凶猛、大胆和狡猾，以乌贼、各种鱼类为食。有时为追逐鱼群进入内湾，世界各地多次发生数十头或上百头伪虎鲸搁浅的事件。

小鳁鲸 XIAO WEN JING

鲸目 鳁鲸科 别名：明克鲸、尖嘴鲸、小须鲸、缟臂鲸

国内渤海、黄海、东海、南海均有分布。

小鳁鲸多单独活动，在小范围内可发现10～20头的散群。如发现虾群或小鱼群时，会游来争食，吃完后又各自分散。食物以太平洋磷虾和小鱼类为主。小鳁鲸冬春季多游向低纬度水域，夏秋季则北上觅食达高纬度水域。呼吸时喷出的雾柱细而稀薄，高1.5～2米，消失得很快。游泳速度一般每小时5～7海里，快时可达10海里。小鳁鲸每产一胎，偶有双胎。母子鲸眷恋性很强，母鲸有保护仔鲸的习性。

长须鲸 CHANG XU JING

鲸目　鳁鲸科　　别名：长箕鲸、长皱鲸、鳍鲸

国内渤海、黄海、东海、南海均有分布。

长须鲸多结群游动，一般2头或3头一起并游，即家族小群：母仔鲸、雌雄鲸或雌雄鲸带幼鲸。长须鲸大部分时间浮游在水面的上层，吞食太平洋磷虾和结群性小型鱼类。成大群栖游时，游速较慢；当其远距离游动时，每小时可快达14海里。长须鲸喷出的雾柱细高，非常匀整，至上部顶端散开。长须鲸多在冬季交配、妊娠期11～12个月，出生幼鲸体长可达5～6米，哺乳期约6～7个月。

灰鲸 HUI JING

鲸目 灰鲸科　别名：克鲸、腹沟鲸

国内分布于黄海、东海、南海。

灰鲸体长10～15米，重达30余吨。灰鲸南北洄游比较有规律。它们夏季出现在北太平洋，主要吃底栖甲壳动物，晚秋开始沿海岸向南迁移，到低纬度暖水域产仔。首批来到越冬产仔区的是以妊娠鲸为主的生殖群；接踵而来的是未妊娠的雌鲸和多数雄鲸；最后一批是未成熟的幼鲸。灰鲸的眷恋性很强，如果雌鲸被捕，雄鲸就依依不舍，如果仔鲸受伤，雌鲸和雄鲸就会奋起救助。

露脊鲸 LU JI JING

鲸目 露脊鲸科　别名：黑露脊鲸、脊美鲸、直背鲸

国内分布于黄海、东海、南海。

露脊鲸体长约17米，重约60～70吨。头部具有角质瘤，最大的瘤位于上颌前端，所以又称瘤头鲸。露脊鲸多单独或两三头一起，在接近海湾和岛屿周围栖游。常栖游于海水的上层，把整个背部露出水面，故称露脊鲸。露脊鲸主要吃浮游甲壳动物和小型软体动物。由于露脊鲸行动缓慢，性情温顺，过去常被

大量杀戮，现已成稀有种，已经受到国际条约的保护。

麝（所有种）SHE

偶蹄目 麝科 别名：香獐、獐子

分布于亚洲，大多数分布在我国。

麝体型很小，肩高只有50～60厘米，臀高略高于肩部。在鹿类中几乎所有雄鹿都生有或长或短的角，但麝雌雄都不生角。雄麝的犬齿很长，突出口外，呈獠牙状。麝肚脐处有香囊，能产生麝香。麝多生活在山林地区。清晨、傍晚时出来活动，白天隐身于矮灌丛或深草丛中，性怯弱、机警，稍有险情，便奔逃隐匿起来。

麝究竟有几种，至今仍有争议，暂作如下5种，即原麝、林麝、马麝、黑麝、喜马拉雅麝。

—● 原麝 YUAN SHE

国内分布于黑龙江、吉林、河北、山西、内蒙古、新疆等省区。栖息在多岩石的针叶林。性孤独，不结群。白天隐伏休息，多在晨昏间活动。以地衣、苔藓、杂草及灌木嫩枝叶等为主要食物。

—● 林麝 LIN SHE

国内分布于四川、西藏、青海、宁夏、陕西、湖北、湖南、贵州、云南、广东、广西等省区。林麝栖息在海拔2000～3800米的针阔混交林中，是典型的林栖动物。它体小善跳，能登上倾斜的树干，像只大鸟似地立在树枝上。主要在晨昏活动。喜食松萝，也吃树叶、杂草。

—● 马麝 MA SHE

别名：高山麝

国内分布于甘肃、青海、四川、宁夏、云南、西藏等省区。

栖息在海拔3300～4500米林线上缘的稀疏灌丛间，最高可上升至海拔5000米处活动。性孤独、胆怯，除繁殖期间外，多单独生活。多在清晨和旁晚觅食，主要以多种高山灌木树叶和青草为食。

黑麝 HEI SHE

别名：褐麝、黑獐子

国内仅分布于西藏、云南。是我国发现最晚的新麝种。栖息在海拔3800～4200米的针叶林线附近，多在晨昏时活动，以各种苔草、杜鹃、高山柳等植物为食。

喜马拉雅麝 XI MA LA YA SHE

国内仅分布于西藏喜马拉雅山。国外记录于尼泊尔、锡金。

河麂 HE JI

偶蹄目 鹿科 别名：獐、牙獐

国内分布于浙江、江苏、福建、湖北、湖南、安徽、广东、广西等省区。

河麂是一种小型鹿，肩高50～60厘米，体重9～11千克。河麂在分类上不但自成一属，而且在鹿科中自成一亚科，被认为是一种最原始的鹿。其主要特征是：雌雄均无角；雄性上颌犬齿发达，长而弯曲形成獠牙露出唇外；雌雄有鼠蹊腺，为其他各种鹿所没有。

河麂喜欢栖息在有芦苇的河边、湖边和沼泽地带，也到地丘和高草丛生的旷野去。河麂不同于其他几种小型鹿的特点是：一是喜欢集成小群活动，常三五只甚至十只八只在一起生活；二是多产，这在鹿类中是独一无二的，雌河麂虽然仅有两对乳头，但每胎多生2～4只，甚至5～7只。雌兽将幼仔藏在草丛中，轮流给幼仔哺乳。

马鹿（包括白臀鹿）MA LU

偶蹄目 鹿科 别名：赤鹿、黄臀赤鹿、八叉鹿

国内分布于东北、内蒙古、西北、华北及西藏。国外分布于亚洲北部、中欧、西北非及北美等地。

马鹿的白臀鹿亚种臀部的黄色斑十分大，几乎盖住整个臀部。马鹿栖息在混交林、高山的森林草原或是稀疏的灌木林中，夏季则到高山树木茂盛的地方去。马鹿营群居生活，常三五只一起活动。雌雄马鹿平时分居，雌鹿与幼鹿在一起，雄鹿独栖或结成“单身汉”群。马鹿与大多数鹿一样，也是在清晨与傍晚饮水和觅食。夏季有时到沼泽或湖边去洗浴。主要吃树叶、嫩枝、嫩芽和草。马鹿性情机警，善于奔跑，嗅觉和听觉敏锐，但视觉较差。求偶期雄鹿经常鸣叫，声音深沉，响亮有力。雄兽间常展开激烈的求偶斗争。

水鹿 SHUI LU

偶蹄目 鹿科 别名：水牛鹿、黑鹿、春鹿



国内分布于华南、西南、台湾和海南。国外分布于印度、斯里兰卡、中南半岛、印度尼西亚和菲律宾等地。

水鹿一般栖息在海拔1400～3500米的各类森林、稀树高草坡等环境中，喜欢活动于夹杂在森林中的草坡地带。有季节性小区域的垂直迁移现象。其活动范围大，没有固定的窝，很少到远离水的地方去。水鹿全年均喜欢在泥水中跋涉，甚至在冬天地面上出现寒霜时，也常见到水鹿卧在浅水中。水鹿在雨后特别活跃，夏天常到偏僻的水洼地打滚洗浴，

弄得满身泥污借以防止蚊蝇。水鹿主要在夜间活动、觅食。它主要吃草，尤其喜欢吃靠近水源的嫩草，也吃树叶、嫩芽和野果。

驼鹿 TUO LU

偶蹄目 鹿科 别名：犴、堪达犴

国内分布于东北、新疆等地。国外分布于欧亚和北美大陆的北部。

驼鹿是世界上现存最大的鹿，体长2.5～3米，体重可达800千克。驼鹿肩胛上有一个突起的峰，所以叫它驼鹿。

驼鹿喜欢栖居在有茂密的柳树、杨树和桦树的潮湿地带，从不栖息在多岩石的山地。它没有固定的栖地，经常往来于森林和有水源的地方。驼鹿吃各种树叶、嫩枝、嫩芽和树皮；有时到水中去吃漂浮在水面上的植物和水生植物。它善于游泳，常游过湖泊觅食。它的听觉和嗅觉敏锐，但视觉较差。成年驼鹿强壮有力，甚至能击退大型食肉兽。

黄羊 HUANG YANG

偶蹄目 牛科 别名：蒙古瞪羚、蒙古原羚

国内仅分布于内蒙古。国外分布于蒙古及俄罗斯西伯利亚南部。

黄羊体型大小与山羊相似。肩高约76厘米，体重约20～30千克；雄羚角型简单，但美观对衬，雌羚无角。

黄羊喜欢栖息在半沙漠地区的草原地带，营群居生活，常数十只在一起。秋季常集合成大群，有时一群可集成数千只，一望无边，蔚为壮观，向南方水草丰盛的地方迁徙，春季再迁回北方。黄羊在清晨和傍晚觅食，主要吃草原上的各种植物。黄羊过去数量多、分布广，由于过度捕猎和草原环境恶化，数量急剧下降，分布区显著缩小，目前，黑龙江、吉林、辽宁、河北境内已不见黄羊的踪迹。

藏原羚 ZANG YUAN LING 75

偶蹄目 牛科 别名：原羚、藏黄羊、小羚羊、山黄羊

国内分布于西藏、新疆、青海、甘肃、四川、内蒙古等省区。

藏原羚体型矫健，四肢细长；雄羚生有细而长的角，雌羚无角；体毛灰褐色，腹部及四肢内侧白色，在强烈的阳光下，远看其体色近似沙土黄色，因而又得名“黄羊”。

藏原羚栖息在海拔3000～5000米的各种草原环境中，多在草本植物生长较好及水源充足的地方活动，活动范围不大固定。营群居生活，夏秋季多结成几只到十几只的小群活动，冬春季结成较大的群。主要在清晨和傍晚觅食，以多种草本植物为食，常到湖边、山溪旁饮水。主要天敌是狼和猞猁。

藏原羚过去的数量可观，现由于人类活动的干扰，盗猎现象也时有发生，其数量急剧下降，亟待加强保护。

鹅喉羚 E HOU LING

偶蹄目 牛科 别名：长尾黄羊、粗脖羊、瞪羚

国内分布于内蒙古及西北地区。国外分布于中亚地区。

鹅喉羚体型很像黄羊，故也有人称它为“黄羊”。雄羚在发情季节喉部和脖颈特别膨大，如同甲状腺肿胀，因而名为鹅喉羚。鹅喉羚是典型的荒漠草原和荒漠戈壁动物。雄羚在夏季离群独栖或结成雄羚群，雌羚和幼羚在一起生活。平时营小群生活，秋季集成百余只大群作季节性迁徙。它们喜欢在开阔地带活动，善于奔跑。晨昏觅食频繁，有较为固定的活动范围。以梭梭、骆驼蓬、猪毛菜、冰草、芨芨、针茅、嵩草、早熟禾及野葱等为食。性敏捷胆怯，稍有动静，刹那间就跑得踪影全无。

鬣羚 LIE LING 76

偶蹄目 牛科 别名：苏门羚、明鬃羊、岩驴

国内主要分布于黄河以南大部份省区以至西藏、四川、云

南等地。国外分布于南亚及东南亚各国。

鬣羚似羊而体型较大；雌雄均有一对短而尖的角，耳长似驴，颈背有鬣毛。

鬣羚栖息在海拔2000～3000米的阔叶林及针阔混交林中，常在岩石嶙峋的山坡或树木丛生的峡谷中活动。通常独栖或结成家族小群活动。多在清晨和傍晚觅食，主要吃青草、种子、树叶、嫩枝、幼芽和菌类。它们有固定的往来行走的小路，还有明确的休息场所、排便处和蹭角的地方。夏季喜欢在悬崖上的大树下乘凉和休息，冬季则常到岩洞中或垂岩下避风的地方过夜。它善于攀登悬崖峭壁。在受到惊扰时，能迅速奔跑，跳过险恶的山崖。

—● 斑羚 BAN LING

偶蹄目 牛科 别名：青羊、野山羊

国内分布于东北、华北、西北、华南和西南等省区，国外分布于印度、尼泊尔、缅甸及俄罗斯的西伯利亚。

斑羚体型比山羊略小，肩高58～72厘米，体长90～120厘米。雌雄间差别不大，雌雄均有角。

斑羚是典型的林栖兽类。喜欢居住在多草而崎岖的山上或靠近树林的岩石地带。性孤独，不合群。雄羚一般独栖，雌羚和幼羚一起生活。清晨和傍晚时活跃，主要吃草、嫩芽、细枝、野果、苔藓、地衣等。清晨取食后便到水源处饮水，然后到有阳光的石崖上去休息。斑羚的毛色与岩石及周围环境融合在一起，即使它毫不隐藏地卧在那里也不易被发现。斑羚常到有天然盐碱块的地方去舔食盐碱。

—● 岩羊 YAN YANG

偶蹄目 牛科 别名：崖羊、石羊、青羊、蓝羊

国内分布于云南、四川、西藏、新疆、青海、甘肃、陕西、宁夏、内蒙古等省区。国外分布于尼泊尔、锡金和克什米尔等

地区。

岩羊体色与岩石相近，腹部及四肢内侧为白色。雌雄均有角，但雌羊角比雄羊角小得多。角型奇特，易于辨认。

岩羊是一种典型的高山动物，多栖息在海拔4000～5500米的高山裸岩带及与之相接的高山草甸山坡上，从不到林线以下的地区生活。岩羊营群居生活，可见数百头的大群。夏季时老年雄羊喜欢到高处去，9月前后回到群中，这时大群分散成一雄多雌的小群。它们喜欢在乱石上蹦跳，满山奔跑。没有固定的取食时间，白天在高山草甸上时而吃食时而休息。主要吃草和灌木嫩枝叶。岩羊的视觉、听觉、嗅觉都很灵敏。

盘羊 PAN YANG

偶蹄目 牛科 别名：大头弯羊、大角羊、大头羊

国内分布于西藏、新疆、四川、青海、甘肃、陕西、内蒙古等省区。国外分布于俄罗斯、蒙古、尼泊尔及克什米尔等地。

盘羊是现存羊中体型最大的一种，在外文书中，它被称为“亚洲巨野羊”。体重可达110～120千克，最重的竟达150千克。雌羊小得多，体重一般不超过80千克。雌雄均有角，雌羊角短小；雄羊角全长可超过1.5米，角长的世界记录是190.5厘米。产于我国的盘羊中比较著名的亚种有：产于内蒙古大青山一带的“大头羊”、产于青藏高原的西藏盘羊和产于帕米尔高原及附近地区的马可波罗羊。

盘羊经常栖息在同一地区，虽有季节性迁徙，但在一定范围内活动。盘羊栖地有明显围绕水源的特点。多在清晨和傍晚取食，主要吃杂草和树叶。它们的视觉和嗅觉非常灵敏。在发现有危险时即用前足击地报警。盘羊寿命约12～15年。

雪兔 XUE TU

兔形目 兔科 别名：白兔、变色兔

雪兔分布于北极及其附近的寒带地区，在我国分布于新疆、

黑龙江、内蒙古等省区。



雪兔冬毛全身雪白，仅耳尖及眼圈呈褐色；夏毛头部、背部为棕褐色或棕黄色，腹部白色。

雪兔主要栖息在森林边缘、森林草原及丛林地区，也栖于湖泊及河流的沿岸。多在夜间活动，白天隐居洞穴中。主要吃草本植物，冬季取食树枝、树皮、干草等植物。其天敌有猞猁、狼、黄鼬以及鹰、鸮等。冬季，雪兔喜欢生活在在桤木丛生的灌丛中，灌丛旁常有一些低矮的柳树，雪兔只要钻出灌丛跑过去就能吃到可口的嫩柳树枝。可是雪兔为了躲避敌害的袭击，轻易不跑到雪地上去，以免招来杀身之祸。

海南兔 HAI NAN TU

兔形目 兔科 别名：草兔

国内仅分布于海南省，是海南省的特产。

海南兔体型较小，体重不超过2千克。栖息在丘陵平野的灌丛低草坡中。黄昏后开始外出活动、觅食，午夜前最活跃。性情怯弱，御敌能力差，仅能以隐匿和迅速逃跑的办法躲避敌害。由于以前过度捕猎，海南兔数量急剧下降，估计已不足千只，亟待加强保护。

塔里木兔 TA LI MU TU

兔形目 兔科 别名：莎车兔

仅分布于新疆塔里木盆地及罗布泊低地。

塔里木兔是平原荒漠的典型种类，适应干燥气候，主要栖

息在塔里木河沿岸，白天外出活动、觅食，以芦苇、罗布麻、骆驼刺和甘草等为食。早晨和黄昏常到水边饮水。每年可繁殖2～3窝，每窝3～5只。

巨松鼠 JU SONG SHU

啮齿目 松鼠科 别名：树狗、藤狸、黑果狸、黑狸

国内分布于云南、广西和海南等省区。国外广泛分布于亚洲南部。

巨松鼠因体型大而得名，体长可达40厘米，尾比体长。巨松鼠栖息在热带季雨林的高树上，是典型的树栖动物。营巢居生活，巢筑于20米以上的树上或桠杈上。喜欢独栖或成对活动，很少集群，偶见2～3只在同一树上取食。巨松鼠白天活动，上午10时前和下午4时后至黄昏，是一天中最活跃的时间。中午前后一般在高树上休息。其性机警，稍有惊动便疾速攀枝逃遁，瞬间不见其影。跳跃力强，相隔2米的树枝可一跃而过。巨松鼠吃植物性食物，主食各种树果，在果实缺少季节，也吃植物嫩芽、叶和花蕊等。

巨松鼠种群数量数十年来显著减少，很多地方已经绝迹。

角䴙䴘 JIAO PI TI

䴙䴘目 䴙䴘科 别名：王八鸭子、水驴子、水葫芦

国内分布于东北、西北、华北和长江下游等地。国外分布于北美洲、欧洲北部、地中海和亚洲北部。

角䴙䴘的夏羽自眼后侧有一簇金栗色的饰羽伸向头后，呈双角状，故称角䴙䴘，俗称长耳䴙䴘。

角䴙䴘喜欢生活在水生植物丰富的湖泊、池塘、沼泽及宽阔的河流中，一般单只或成对活动。善于游泳和潜水，潜水深度可达3.6米。出水面时，常常先把嘴尖、鼻孔和眼睛伸出，观察敌情。这种特点很像鱼鳖，因而俗称“王八鸭子”。角䴙䴘求偶时有独特的表演，样子十分有趣。它在水面上造半飘状浮巢。

一窝产卵2～7枚。

赤颈鹎鹱 CHI JING PI TI

鹈鹱目 鹈鹱科 别名：王八鸭子

国内分布于内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、天津、福建、广东等省区，国外分布于全北区。

赤颈鹈鹱栖息在低山地带的江河、湖泊、水库等处。善于游泳和潜水，潜水时间很长。遇到危险时，并不马上起飞，而是潜入水中隐蔽起来。常在水草中觅食，也在水中捕捉食物。食物主要是鱼类，也捕捉甲壳类、水生昆虫和蛙类等，也吃幼嫩的水生植物。

鹈鹕（所有种）TI HU

鹈形目 鹈鹕科 别名：塘鹅、伽蓝鸟、淘河鸟

鹈鹕科共有8种鹈鹕，分布在欧洲、亚洲、非洲、北美洲等地的温暖海岸地带。我国只产2种鹈鹕，即白鹈鹕和斑嘴鹈鹕，它们通常在新疆罗布泊一带繁殖，在东部沿海各省越冬。

鹈鹕是一种大型游禽，体长150～200厘米，体重约12千克。嘴宽大尖长，尖端有钩，下颌底部有一个巨大并能伸缩的喉囊，用来兜捕和暂时贮存猎得的鱼类。

鹈鹕是一种古老的大型水鸟。主要栖息在沿海、河川及湖泊等处。主要产于热带，我国数量不多，北方更不常见。它们喜欢结群活动。飞行迅速，常俯冲入水捕鱼，或在河湖边等待鱼群；饥饿时常集群进入水中，合力用翅击水，赶鱼至浅水区捕食。善于游泳，但不潜水。每天除了入水游泳、捕食以外，大部分时间在岸上晒太阳或整理羽毛。鹈鹕双翅宽阔，飞翔力强。主要捕食鱼类，也吃甲壳类、两栖类以及小鸟。鹈鹕常结群营巢在高树上，通常产卵2～4枚，由双亲孵卵和育雏。

鲣鸟（所有种）JIAN NIAO

鹈形目 鲣鸟科

鲣鸟科共有9种鲣鸟，主要分布在热带和温带海洋的岛屿和沿岸地区。分布于我国的鲣鸟有2种，即红脚鲣鸟和褐鲣鸟，主要分布于海南、台湾、广东、福建、浙江等省。

红脚鲣鸟体羽主要为白色，初级飞羽黑褐色。褐鲣鸟上体、前颈和胸部褐色，下体纯白色。喉部肌肉松弛，故能吞大鱼；翅尖长，善飞翔；尾羽长，呈楔形。

鲣鸟大部分时间在海洋上活动，仅夜间和繁殖期在海岛上度过。鲣鸟成群在空中翱翔，俯视海中的猎物，一旦发现鱼群，会立即收敛双翅，伸直头颈，自高空笔直俯冲入水捕食。有时在水里猛追鱼群，可潜入水中二三米深。它把数次捕到的鱼暂存于富有弹性的喉囊中，然后一跃而出水面，飞到海面上空。鲣鸟成群繁殖于海岛上，雌雄共同营巢，共同喂养雏鸟，雏鸟成长迅速，3周后就能随亲鸟到海边飞翔。

海鸬鹚 HAI LU CI

鹈形目 鸬鹚科 别名：乌鹈

海鸬鹚分布于我国黑龙江、吉林、辽宁、福建、广东、台湾等省。

海鸬鹚体长约70厘米。体羽主要为黑色。海鸬鹚集小群生活于海洋、河口附近，沿海小岛尤为常见。海鸬鹚善于游泳，能潜水，以鱼类、甲壳动物等为食。饱食后栖于崖上，或展开双翼晒太阳。栖地积累大量鸟粪，含磷和其他物质，为肥原。在岛屿的悬崖上或岩礁上营巢，每窝产卵2～3枚。

黑颈鸬鹚 HEI JING LU CI

鹈形目 鸬鹚科 别名：鱼鹰

国内仅分布于云南省。

黑颈鸬鹚体长约50厘米。体羽主要为黑色。黑颈鸬鹚栖息

在滇西高原海拔500～1500米的河谷地带，多结小群在田坝区的沼泽地、水库、坝塘及河滩中活动，以鱼、虾及昆虫等为食。善于游泳和潜水，飞翔能力也较强，但在地面上行走时显得笨拙。

黑颈鸬鹚在春末夏初繁殖，雌雄共同营巢，轮流孵卵。喂雏鸟时，雏鸟把嘴伸入亲鸟的口腔里，取食亲鸟吐出的半消化食物。

黄嘴白鹭 HUANG ZUI BAI LU

鹳形目 鹭科 别名：塘白鹭、白老鹳、白老

鹭科鸟，广泛分布于南北纬60度间的大陆各处。我国产20种，全国各地都有分布，但以东南沿海各地较多。黄嘴白鹭分布于吉林、辽宁、山东、河南、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等省区。

黄嘴白鹭体羽乳白色，有羽冠，嘴黄色，故名黄嘴白鹭。黄嘴白鹭常集成小群活动于河口沿岸及港湾的沼泽湿地，也见于树上或岩礁上。以鱼类、甲壳动物、昆虫和蝌蚪等为食。性机警，见人即飞，飞行距离较短，约飞10～50米就降落。有结群营巢、修整旧巢及和池鹭、夜鹭、牛背鹭混群共栖繁殖的习性。数量较少，属珍稀鸟类。

岩鹭 YAN LU

鹳形目 鹭科

国内分布于浙江、福建、广东、海南、台湾等省。

岩鹭与大白鹭、中白鹭、白鹭和黄嘴白鹭同为白鹭属鸟，但其他4种的体色都是白的，唯有岩鹭体羽暗灰色，后头有细长羽冠，胸有细长饰羽。岩鹭多栖息在海岸岩礁上。大多单独活动，有时三五成群，飞行缓慢而有节奏。食物以鱼、甲壳类、贝类等为主。岩鹭营巢于海岛树林或岩石上，每窝产卵3～5枚，多为3枚。

—● 海南虎斑鸦 HEI NAN HU BAN JIAN ····· 84

鹳形目 鹭科 别名：白耳夜鹭

是我国特产鸟类，数量稀少。曾分布于浙江、安徽、福建、广西和海南等省区，现仅见于广西南部，其他地区几十年来未见报道。

海南虎斑鸦上体暗褐色，冠羽黑色，眼后有一条白色条纹向后延伸至耳羽上方；下体白色，胸及体侧杂以灰栗色斑纹。

海南虎斑鸦栖息在高山的山沟河谷或其他水域附近，白天隐蔽休息，早晚活动、觅食。食物为小鱼、蛙类和昆虫等。

—● 小苇鸦 XIAO WEI JIAN

鹳形目 鹭科

国内分布于新疆。

小苇鸦体型较小，体长约30.5厘米。栖息在沼泽地、苇塘、湖岸等处。单独活动，行踪隐蔽，不易被发现。白天藏于茂密的苇蒲丛中，早晚出来活动、觅食，食物主要为螺、虾、昆虫、鱼、蛙等。受惊后多飞离不远即落近处密丛。5～8月繁殖，多小群营群巢，每窝产卵4～7枚。数量稀少。

—● 彩鹳 CAI GUAN ····· 85

鹳形目 鹳科 别名：白头鹮鹳

国内主要分布于四川、河北、江苏、福建、广东、广西、云南、海南、西藏等省区。20世纪50年代后国内未见报道。国外分布于自印度到中南半岛。

彩鹳体长约1米。栖息在多植物的海岸边或沼泽、河流附近地区。通常成小群出没于沿岸一带，也发现有的单独生活。它们很喜欢在被洪水淹过的稻田上活动，有时停落在树上休息。常见它在浅水处把喙插入水底淤泥中搜索食物吃。食物以鱼、蛙、昆虫及软体动物为主，也取食少量植物性食物，偶尔捕食小型陆上脊椎动物，主要是鼠类。繁殖期展翅跳跃，起舞求偶。

雌雄共同营巢，每窝产卵3～5枚，偶有6枚。雌雄共同孵卵、育雏。国内罕见，估计已绝迹。

白鹳 BAI HUAN

鹳形目 鹳科　别名：黑头白鹳、白油老鹳

白鹳繁殖于我国黑龙江，在福建、广东、海南等省越冬。国外分布于亚洲、非洲及太平洋西南部。

白鹳体羽白色；嘴细长而下弯，呈黑色；头和颈裸露，呈暗蓝黑色；繁殖期羽衣增添光彩，腰及尾上覆羽具淡灰色丝状饰羽；颈基出现一圈羽毛，胸呈饰羽状。

白鹳是一种内陆水鸟，主要栖息在有树木和灌丛的大片沼泽地，也见于河流、水库、湖泊，或者徘徊于农田附近。多成小群活动，而且跟其他种鹳、鹮混群。在浅水处涉水，捕食鱼、虾、软体动物、两栖动物等，饱食后站立在沙滩浅水中或群栖于树上。叫声是一种奇特的轰隆声。白鹳5～6月繁殖，成小群营巢于水边的大树上，每窝产卵2～4枚，双亲轮流孵卵。雏鸟生长很快，约30天左右就能离巢活动。

黑鹳 HEI HUAN

鹳形目 鹳科　别名：东方黑鹳、疣头鹳

国内仅偶见于云南西南部。国外仅分布于印度北部。

黑鹳体长约60厘米，雌雄同色；体羽大都灰褐色，带蓝绿色光泽；嘴细长而弯曲；头部裸露，有黑色光泽；头顶部分覆以红色乳突，故俗称疣头鹳。

黑鹳多栖息在平原耕地、残茬地、干河堤等地，偶尔也到沼泽地活动。通常成对或呈家族小群一起生活，有时亦见单个活动。跟其他大型涉禽如白鹳、白鹤、鹭等相比，似乎不大喜欢长时间呆立着“沉思”，而总是繁忙地到处觅食。食物主要是小鱼、甲壳类、昆虫、蠕虫及脱落到地上的种子，也吃蛇和青蛙等。喜栖于树上。飞行姿态很像雁和鹤，头颈前伸，脚向后。

鸣叫声有点像猛禽，尖叫二或三个音节。在繁殖期，黑鹳鸣声响亮而特别。雌雄亲鸟共同在大树冠的高处营巢，每窝产卵2～4枚。双亲轮流孵卵，共同育雏。

彩鹳 CAI HUAN

鹳形目 鹳科

国内偶见于上海以南至福建沿海岛屿。国外除北欧和北美外，分布于各大洲的湖泊、沼泽地带。

彩鹳成群栖息在内陆湖泊、沼泽附近，有时也到稻田中活动。彩鹳体色艳丽，全身羽毛以栗紫色为主，带有绿色金属闪光，故得此名。常可见彩鹳在浅水处大步探索着前进，并突然将嘴插入水或泥中刺捕食物。主要捕食鱼、虾、昆虫、软体动物、蚯蚓及蛙，有的还捕捉水蛇。栖宿地距取食地一般较远，常结群往返飞行。飞行时头、颈前伸，呈长波浪式，鼓翼和滑翔交替，振翅比鹭类迅速但显得费力。

彩鹳在我国极为罕见，是珍稀的观赏鸟，应采取有力措施，切实对其加强保护。

白琵鹭 BAI PI LU

鹳形目 鹳科 别名：琵琶鹭、匙嘴鹭

国内分布于东北、华北及西北地区，在长江下游及东南沿海地区越冬。国外分布于亚洲及南欧至非洲。



白琵鹭全身披有洁白的羽毛，具有琵琶状的大嘴，故名白琵鹭。白琵鹭栖息在沼泽、河湖岸边和苇塘等

湿地环境中。喜欢群居生活，成群飞翔时组“人”字形。白琵鹭喜食各种鱼类、虾、青蛙、蝾螈及软体动物，也吃昆虫和水生植物。白琵鹭不但善于涉水，还会游泳。它筑巢于茂密的水草丛中，或常年积水的苇塘深处，常与白鹮、草鹭、苍鹭等杂居营巢。雌雄鸟共同营巢，每窝产卵3～5枚，雌雄鸟轮流孵卵。

黑脸琵鹭 HEI LIAN PI LU

鹳形目 鹮科 别名：黑面琵鹭、小琵鹭、匙嘴鹭

国内分布于辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、贵州、广东、广西、海南、台湾、香港等省区。

黑脸琵鹭体型略小于白琵鹭，体型、体色与白琵鹭十分相似，主要区别是：眼先、额部裸出并与嘴基相连，裸皮为黑色；夏羽羽冠较长，橙黄色也较深；嘴黑色，无黄色端部。

黑脸琵鹭栖息在沼泽湿地、河湖岸边及苇塘等低洼积水处。以各种鱼、甲壳类、软体动物、两栖类及昆虫等为食。巢多筑在临水的高树上，多为群巢。每窝产卵4～6枚。

红胸黑雁 HONG XIONG HEI YAN

雁形目 鸭科 别名：苍雁、赤胸雁

偶见于我国湖南洞庭湖及广西南宁等处，为冬时迷鸟。繁殖于俄罗斯北部，冬季迁徙到里海南部和咸海一带。

红胸黑雁是羽色鲜艳的小型雁类，体长约55厘米。

红胸黑雁是典型的北极海洋鸟类，能耐严寒。在繁殖地栖居于海湾、河流或湖泊附近的丘陵苔原地带；在南方越冬时，常出现在近水的开阔草原地区。飞行时无一定队形，行动活泼而迅速。活动的特点是保持同种的群，一般不混群，但在迁徙时常与灰雁混群；越冬时常跟小白额雁合在一起，但始终保持单独的小群。食物几乎纯为植物性食物，主要吃杂草嫩芽、种子和鳞茎，还善于挖掘埋藏在地下的块根和芽。

—● 白额雁 BAI E YAN

雁形目 鸭科 别名：大雁、石雁

国内分布于东北、新疆、西藏、东部沿海各省，国外广泛分布于北半球。

白额雁在我国为旅鸟和冬候鸟，每年入秋以后，成群由北方迁至我国境内，翌年2～3月逐渐迁离北归。迁徙时多在夜间飞行，由老雁带领，排成“人”字队形。抵达越冬地区后分散成小群活动。越冬期间多栖于开阔草原、沼泽、河流和沿海岸线一带。主要以各种湖草为食，也吃谷类及其他植物的种子、芽、嫩叶、根等。白额雁每年5～6月繁殖，每窝产卵4～7枚。白额雁越冬期间常遭大量捕杀，目前数量急剧减少，已成为稀有种，亟待加强保护。

天鹅（所有种）TIAN E

雁形目 鸭科

天鹅属于鸭科天鹅属，天鹅属有7种，分布在亚洲、欧洲、南北美洲、澳洲等地区。我国有3种，即大天鹅、小天鹅和疣鼻天鹅。

天鹅在我国新疆、青海、内蒙古和东北地区繁殖，雌雄鸟终生成对，每窝产卵4～7枚，由雌鸟孵卵，雄鸟在附近护卫。秋季迁徙到南方各地越冬。迁徙时通常组成6～20只的小群，排列成“一”字或“人”字形，飞得很高，中途休息或过夜时，群中有一两只天鹅站岗放哨。第二年春天，又集群飞回北方原处繁殖。

—● 疣鼻天鹅 YOU BI TIAN E

它是由其嘴基具黑色疣状突起而得名。又由于其鸣声沙哑而低沉，故又称“哑天鹅”。常在水草丰盛的河湾和开阔的湖面上游荡觅食。以蒲草等水生植物的根、茎、叶和果实，以及小鱼、水生昆虫等为食。疣鼻天鹅繁殖期在芦苇丛中或湿地上集

群营巢，每对天鹅要占据大片的芦苇滩和宽阔的水面；少量利用旧巢，稍加整理就开始产卵。



大天鹅 DA TIAN E

它的鸣声响亮，顾又名“咳声天鹅”。常栖于多蒲苇、水草丰盛的大型湖泊中，食料较丰富的池塘、水库也能见到它们的踪迹。主要以水生植物的根、茎、叶和种子为食，也啄食少量的软体动物、水生昆虫和蚯蚓等。其嘴强大，掘食本领很强，能挖食深藏在淤泥下的食物。繁殖期营巢于芦苇深处，每窝产卵4~9枚，由雌鸟孵卵，雄鸟守护。

小天鹅 XIAO TIAN E 90

除体型稍小外，其嘴和颈均显得短些，故又名“短嘴天鹅”。在北极苔原地带繁殖，在中国为旅鸟和冬候鸟。它们是秋冬季节常见的一种天鹅，在越冬地其数量比大天鹅和疣鼻天鹅均较多。栖息于多芦苇和水草的湖泊、水库和池塘，常结群活动。性较活泼，叫声清脆。小天鹅性机警，稍有动静，觉察的天鹅会发出鸣叫，整群小天鹅就将立即起飞。觅食时，总有一对天鹅警觉地守卫。食物主要为水生植物的根、茎、叶和种子等，也吃少量水生昆虫、蠕虫、螺类和小鱼。

鸳鸯 YUAN YANG 91

雁形目 鸭科 别名：匹鸟、官鸭

鸳鸯有两种：林鸳鸯分布于北美洲，鸳鸯分布于亚洲东部。鸳鸯在我国繁殖于东北和内蒙古，冬季迁往长江中下游、东南、西南等地。国外分布于俄罗斯、朝鲜及日本；偶见于印度。

鸳鸯雌雄异色。雄鸟羽色鲜艳华丽，头具羽冠，眼后有白色眉纹，翅上有一对栗黄色扇状“帆羽”，十分醒目；雌鸟体羽灰褐色，仅带白色眉纹。

鸳鸯栖息在溪流、河湖、沼泽、水库等处，喜结小群活动。多在晨间和下午觅食，上午多在水面宽阔处浮游戏水，然后多在一个安全幽静的石块上晒太阳并梳妆打扮。鸳鸯以动物性食物为主，如蚂蚁、蝗虫、蚊子、甲虫，以及蝼蛄、虾、蜗牛、蜘蛛、小鱼、蛙等；也吃一部分植物性食物，如青草、草子、水生苔藓类等。夜间宿于河边的树林中。群中领头的鸳鸯多停栖在较高处或显眼的地方，一旦发现敌情会立即扑翅领飞，到数十米外的灌木丛中隐蔽。

鸳鸯羽色美丽，又是成对活动，自古以来就被誉为爱情的象征，是人们最喜爱的观赏鸟之一。

其他鹰类（一级保护之外）

隼形目 鹰科

隼形目鸟是世界性分布的鸟，从南北极到赤道，从海洋到陆地，从高山到平地，从森林到草原，到处都有它们的踪迹。

分布于我国的鹰科鸟类全部受到国家保护，除被列为一级保护动物的金雕、白肩雕、玉带海雕、白尾海雕、虎头海雕、白背兀鹫、胡兀鹫之外的其他鹰类，均被列为二级保护动物，其中有：黑翅鸢、褐冠鹃隼、凤头鹃隼、蜂鹰、鸢、栗鸢、苍鹰、褐耳鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、棕尾鵟、大鵟、普通鵟、毛脚鵟、白脸鵟鹰、灰脸鵟鹰、棕翅鵟鹰、鹰雕、草原雕、乌雕、白腹山雕、小雕、棕腹隼雕、林雕、白腹海雕、渔雕、黑兀鹫、秃鹫、高山兀鹫、白尾鹞、草原鹞、乌灰鹞、鹊鹞、白头鹞、白腹鹞、短趾雕、蛇雕、鹗。

鹰是人们最熟悉的鸟类之一，被称为鸟中之王。人们赞赏鹰的体魄、鹰的勇敢和鹰的无坚不摧的力量。

高山兀鹫 GAO SHAN WU JIU

别名：坐山雕

国内分布于甘肃、青海、宁夏、四川、西藏、新疆等省区。栖息在海拔2500～4500米的高山、草原及河谷地区，多单个或结成十几只的小群活动。在空中搜索食物，以动物尸体、羊、牦牛胎盘等为食。性贪食，但耐饥力强。早春筑巢于悬崖峭壁，每窝产卵1枚。

黑翅鸢 HEI CHI YUAN

国内分布于河北、浙江、云南、广西等地。体长约33厘米。上体淡蓝灰色，下体白色，有深棕色和暗褐色纵纹。多单独飞翔于田间、疏林或草坡上空，有时停息在树梢或电线杆上。以鼠、小鸟、蝗虫等为食。

蜂鹰 FENG YING

别名：凤头蜂鹰

国内分布于内蒙古、东北、河北、山西、青海、新疆、山东、江苏、华南、西南等地。栖息在稀疏的针叶林、阔叶林或针阔混交林中，多在村落、草原、农田附近活动。嗜食蜜蜂、胡蜂等的成虫及幼虫，故称蜂鹰，也吃蜂蜜、蜂蜡，兼食鼠、蛙、蛇、蜥蜴等。

鸢 YUAN

别名：黑鸢、鹞鹰

国内分布几乎遍及各地，但数量稀少。多栖息在山谷树林中或旷野的高树上，在山地、草原、田野、荒漠和城郊村落都

能见到它们的踪迹。天气晴朗时，常单独翱翔于空中，它的视力极好，能在高空搜索地面的猎物，主要以鼠、兔、蛙、鸟为食，也吃大型昆虫、鱼和动物尸体。

栗鸢 LI YUAN 94

别名：红老鹰

国内分布于西藏、浙江、山东、江西、湖北、云南、广东、广西、福建等地。较为罕见。栖息在江河和沼泽附近，常成对或单个活动于田间及村落附近，有时停息在大树上。以蛙、鱼、鼠和大型昆虫为食，也啄食动物腐尸。

苍鹰 CANG YING

别名：黄鹰

国内除海南外，各地都有分布。栖息在山地森林一带，多单只活动，常在空中作直线滑翔，有时扑翼与翱翔交替。视觉敏锐，发现地面猎物即俯冲而下，捕获猎物后将利爪刺入猎物胸部，而后撕裂而食。有时也隐匿在林中，突袭猎物。主要以鼠类为食，也吃鸟类和野兔。

赤腹鹰 CHI FU YING 95

别名：鸽子鹰

国内分布于西南、华南、华北和海南、台湾等地。栖息在山地林缘，多活动于山地和村落之间。常在林区外围和平原空

旷地带空中作圈状飞翔；有时停落在大树稍或电杆上窥伺猎物，发现猎物即俯冲而下捕食，食物主要为昆虫、蛙、蜥蜴、小鸟等。

雀鹰 QUE YING

别名：雀鹰子、鹞、雀儿鹰

国内各省均有分布。夏季栖息在山地森林，冬至丘陵平原。多单独活动，白天多在开阔田野、草原地带及村落附近等处游荡觅食，有时停落在树上窥伺猎物，常见它在疏林和灌木丛中穿梭追捕小鸟，捕到后能边飞边食。食物以小型鸟类和鼠类为主，也吃昆虫。

松雀鹰 SONG QUE YING

别名：松子鹰

国内分布遍及全国东部、南部地区。栖息在低山及草原疏林地带，也生活在平原地区。多单独活动，常在空中经久旋飞，直线飞行时小幅扑翼与短距离滑翔交替。性凶猛机警，主要猎食鼠类，也吃野兔、小鸟、昆虫、蛙和蜥蜴等。4～6月繁殖，每窝产卵4～6枚。

棕尾鵟 ZONG WEI KUANG

国内分布于甘肃、新疆、西藏、青海、四川等地。体长44～48厘米。栖息于荒漠、半荒漠及砾石滩地区，多单独活动。以啮齿类、两栖爬行类、小型鸟类及昆虫等为食。在岩壁平坦处或树木上营巢。每窝产卵2～4枚。

20世纪50年代以后，棕尾鵟在我国较少发现。

大鵟 DA KUANG

别名：花豹

国内分布于东北、内蒙古、西北、华北和华南等地。大鵟羽

色变异较大，可分为淡色、暗色和中间色三种类型。繁殖期多栖息在山间及林地，冬季常至开阔的草原、田野觅食。食物以鼠类为主，其性凶猛，飞翔灵活，常作圈状翱翔。

普通鹫 PU TONG KUANG

别名：土豹、鸡姆鹞

国内分布几乎遍及全国各地。多栖息在开阔的山地、疏林、旷野、农田及村落附近。秋、冬时多单独活动。飞行时会发出似猫叫的鸣叫声。视觉敏锐，总是窥伺猎物，一旦发现，立即抓捕。食物以鼠类物主，也捕食大型昆虫、蛙、鸟、蜥蜴等。

灰脸鹫鹰 HUI LIAN KUANG YING

国内分布于东北、华北和东南沿海各省。栖息在山地林间或森林边缘附近的草原、田野及沼泽湿地。多结小群活动，飞翔迅速。主要以昆虫、鼠、蛙为食，也吃蛇、鸟、蜥蜴、鱼等。多在松树等乔木上营巢，每窝产卵2～4枚，多为2枚。

草原雕 CAO YUAN DIAO

别名：大花雕、角鹰

国内分布于新疆、青海、西藏、内蒙古、黑龙江等地，迁徙时见于甘肃、吉林、辽宁及河北。国外分布于亚细亚中部、蒙古、印度、缅甸等地。主要栖息活动于开阔的草原地带。多单独活动，迁飞时有的结成三五只的小群。平时多在150～200米高的空中低飞，它有时孤独地停落在高树顶上，有时守候在啮齿动物的洞口附近。主要以啮齿动物为食，也捕食鸟类、爬行动物和其他小型兽类。每年4～5月产卵，每窝产卵2～3枚，孵卵期45天。

乌雕 WU DIAO

别名：小花皂雕、花皂雕、花雕

国内分布于新疆、内蒙古、东北；在浙江以南沿海各省越冬。国外分布于欧洲、北非、印度和西伯利亚。栖息在沼泽地附近的林区，也常在河谷和开阔的平原上空飞翔活动。有时停落在大树上，窥伺猎物，食物以鼠、兔、蛙、鱼为主，也吃昆虫、鸟类、蜥蜴及动物尸体。在高树上或崖逢中筑巢，一般产卵2枚。

近些年来，鸟雕数量不断减少，应引起足够重视。

秃鹫 TU JIU

别名：坐山雕、狗头鹫

国内分布于新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古及四川等省区。秃鹫体型巨大，体长100～127厘米。多栖息在海拔2000～5000米的山区，也到平原或草原活动。多单独飞翔，有群食现象。食物主要是大型动物的尸体，也吃小兽、蛙和昆虫。秃鹫整天清除尸体，为人类打扫卫生，是大自然的“清道夫”。2月下旬开始营巢，巢多筑于高大的乔木上，每窝产卵1～2枚，雌雄共同孵卵、育雏。

白腹鹞 BAI FU YAO

国内分布于内蒙古、东北、河北、北京、天津、甘肃、青海、江苏、上海、浙江、山东、江西、湖北、四川、华南。白腹鹞体长55厘米。上体大都黑色，下体白色。栖息在近水源的芦苇沼泽地和树丛中。食物主要为鼠类和昆虫。白腹鹞在地面营巢，卵为淡黄色。

蛇雕 SHE DIAO

国内分布于安徽、贵州、云南、广东、海南、广西、福建、台湾等省区。数量稀少。栖息在深山密林中，也见于沿海岛屿。常在空中盘旋，发出似啸声的鸣叫，或站在高处窥伺猎物，一旦发现地上有蛇，便俯冲急下抓捕。它用双爪抓住蛇身，用利

嘴钳住蛇头，直至把蛇头弄碎，才开始吞吃。除蛇以外，还捕食蛙、蜥蜴、鼠、鸟和甲壳动物等。筑巢于高大树上，每窝产卵1枚。

鸮 E

别名：鱼鹰、鱼雕

国内分布于内蒙古、东北、华北、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏等地。迁徙时见于东部沿海，为华南沿海至台湾冬候鸟。数量稀少。常栖于水域附近，多在江河、湖泊、水库、海滨一带活动。性机警而凶猛。食物以鱼类为主，有鸟类中的“渔夫”之称，也吃蛙、蜥蜴、鼠、鸟等。

隼科（所有种）

隼形目 隼科

隼科鸟是一类飞行快速的猛禽。这一类猛禽的身体呈流线型，肩部宽阔有力，尾部细长，双翅尖长。我国有隼科鸟12种，即：小隼、红脚小隼、阿尔泰隼、猎隼、矛隼、游隼（花梨鹰）、燕隼（青条子）、猛隼、灰背隼（朵子、鸽子鹰）、红脚隼（青燕子、白指甲鹞）、黄爪隼、红隼。

小隼、红脚小隼、红脚隼、黄爪隼、红隼是食虫益鸟，猎隼为食鼠益鸟。

猎隼 LIE SUN

别名：兔虎

国内分布于新疆、青海、甘肃、四川、内蒙古、西藏等地。冬季南迁。栖息在开阔地、荒漠和宽广的未耕种地区。能在空中快速追捕猎物。食物以鼠类和鸟类为主，鸟类中多取食野鸭、鸥类和鸠鸽类，也捕食野兔、蛇、蛙等。猎隼多营巢于高大的树上或高山岩壁间，偶尔夺占鹭或其他大型鸟类的巢。

游隼 YOU SUN

别名：花梨鹰

国内分布于东北、华北及长江以南至广东。游隼常在开阔的农田、河谷、草地、低山丘陵和海滨湿地上空飞行。飞行迅速，每小时能飞140～360千米。可在高空追捕飞鸟，发现猎物，即高速俯冲，用脚掌将猎物击昏或在空中抓捕。食物以鸟类为主，还捕食鼠、兔和蝗虫。多在人迹罕至的悬崖绝壁缝隙中营巢，每窝产卵3～5枚，雌雄共同孵卵，但以雌鸟为主。

燕隼 YAN SUN

别名：青条子

国内除海南省外，各省区都有分布。栖息在林间和田间的疏林中，多单独或成对生活，常停落在高大乔木或电线杆上。清晨和黄昏间活动频繁。飞行迅速敏捷，鼓翼与滑翔交替，有时能短暂停悬于空中。能冲入燕群抓捕飞燕，也能捕食蝙蝠。食物以小鸟和昆虫为主。

红脚隼 HONG JIAO SUN

别名：青燕子、白指甲鹞

国内除青海、新疆、西藏、浙江、安徽、广东、台湾外，各省区均有分布。栖息在林区开阔地带、田间、草地等处。红脚隼能停飞于空中，以头向下频频鼓动翅膀而不滑翔。红脚隼是著名的益鸟，嗜食蝗虫、蝼蛄等害虫，食物中昆虫约占90%，也捕食鼠类、小鸟、蜥蜴和蛇。

红隼 HONG SUN

别名：红鹰、茶隼

国内分布较广，几乎遍及各省区。红隼多见于农田旷野及疏林地带。单独或成对活动。游荡觅食时喜欢高飞，猎食时则作低空飞行，有时在空中盘旋，搜索地面猎物。冬时食物以鼠

类为主，也吃小型鸟类；夏时主要啄食昆虫，也吃小型爬行动物。是著名的食虫益鸟。

黑琴鸡 HEI QIN JI

鸡形目 松鸡科 别名：乌鸡、黑雷鸟、黑野鸡

国内分布于新疆、内蒙古、东北及河北北部等地。国外分布于欧洲、西伯利亚、蒙古北部及朝鲜东北部。

黑琴鸡雄鸟全身几乎为黑色，翼上具宽阔的白色横斑，外侧尾羽向外明显弯曲，呈镰刀状；雌鸟全身的大部分为黄褐色，带有黑色或褐色横斑，外侧尾羽不向外弯曲。

黑琴鸡是落叶松和混交林的林栖鸟类，但不栖于太密的林中。秋季、冬季因觅食而游荡，行程可达数百千米。夏季主要食物为乔灌木的嫩枝、叶、芽、果实和浆果等；冬季主食桦树、柳树、榛树的嫩芽和嫩枝等。在严寒的冬天，它们整夜和白天的大部分时间均钻在雪里避寒。次年春天返回繁殖地。夏季在阔叶林内筑有栖息巢的草丛中过夜。秋季，幼鸟能独立觅食时也不离开雌鸟，形成家族群．逐渐聚成大群，一大群有几个或几十个家族构成，数量多时可达数百只。到冬季又开始分散成小群进行游荡。善奔走，飞行强健迅速，但距离不远。警觉性不高，在树上时有人走到树下也不飞走。

镰翅鸡 LIAN CHI JI

鸡形目 松鸡科

国内主要分布于东北黑龙江下游及小兴安岭一带。国外分布于俄罗斯西伯利亚。

镰翅鸡雌雄羽色相似，初级飞羽状如细镰，故称镰翅鸡。

镰翅鸡是典型的针叶林鸟类，栖息在冷杉、云杉和落叶杉等针叶林中，常见于有越桔、悬钩子、醋栗等坚果植物和有草类覆盖的稠密森林中，或在有田野、草地、林间空地等相交替的山地森林中。除繁殖季节外，过着独居生活。食物以植物质

为主，包括植物的枝芽、花蕾、种子及浆果，育雏期间还捕喂一些昆虫。镰翅鸡营巢在近树根旁或灌丛下的地面上，较为隐蔽，巢呈皿形，内铺枯草叶等，每窝产卵多为8枚，雄鸟不参与孵卵和育雏。

据新华社报道，镰翅鸡已在中国境内灭绝。

柳雷鸟 LIU LEI NIAO

鸡形目 松鸡科 别名：雪鸡、柳鸟、雷鸟

国内仅分布于黑龙江流域。数量极为稀少。国外分布很广，从北美洲北部到整个欧亚大陆北部的森林带和森林草原带，甚至冻原地带。

柳雷鸟是典型的寒带及亚寒带鸟类。夏秋季栖于桦树幼林、有块状松林的苔藓沼泽地、桦树为主的混交林，以及耕地附近的小片阔叶林中。冬季栖息在河边柳丛和小片森林的沿河地区。是典型的植食性鸟类，很少吃昆虫。所食植物随季节不同而变化。常结群20～30只，直至早春才分群成对生活。4～5月间发情。巢筑于地上草丛间，每窝产卵多为7枚。

岩雷鸟 YAN LEI NIAO

鸡形目 松鸡科 别名：雪鸡

国内仅分布于新疆阿尔泰山地区。数量稀少。国外分布很广，包括北美、欧亚的冻原地带，欧洲西部及斯堪的纳维亚半岛。

岩雷鸟栖息在高山针叶林、矮桦灌丛、亚高山草甸以及高山草甸地区。以植物茎、叶及果实等为食，嗜食桦树叶。夏季多三五只一起活动，冬季多结成大群，有时可达几百只。自卫能力很弱，主要靠羽色的变化来保护自己，得以生存。

花尾榛鸡 HUA WEI ZHEN JI

鸡形目 松鸡科 别名：飞龙、树鸡、松鸡

国内分布于内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北等省区。国外广泛分布于欧亚大陆北部。

花尾榛鸡是我国松鸡科鸟类中最小的一种。花尾榛鸡是典型的森林鸟类，栖息在林下植被繁茂、浆果丰富的松树、云杉、冷杉等针叶林中。在林相杂乱、浆果灌丛多的林中也较多。因为各地环境、季节和海拔高度的不同，其栖息环境变化很大。除繁殖季节外，多成小群活动。主要取食植物的嫩枝、芽、嫩叶、花、浆果及种子等，也吃昆虫及其他无脊椎动物，特别嗜食松子、榛子、橡子和杨柳及桦树的芽苞、嫩尖、花序、以及各种果实和种子。

雪鸡（所有种）XUE JI

鸡形目 雉科

雪鸡属于雉科雪鸡属。分布于我国的雪鸡属鸟类有淡腹雪鸡和暗腹雪鸡。

—● 淡腹雪鸡 DAN FU XUE JI

别名：雪鸡、藏雪鸡

国内分布于新疆、西藏、甘肃、青海、四川等省区。

淡腹雪鸡栖息在海拔3000～6000米的高山裸岩、荒漠或半灌丛地带。主要吃各种植物，包括球茎、块茎、根、草叶等，有时也啄食各种昆虫和小型无脊椎动物。

—● 暗腹雪鸡 AN FU XUE JI

别名：雪鸡、高山雪鸡

国内分布于新疆、西藏、甘肃、青海等省区。暗腹雪鸡栖息在具有裸岩和冲积碎石的高山草甸和灌丛草甸带，最高可达海拔5000米以上，平原少见，多集小群活动，多则可达数十只一群。脚强健有力，善跑，很少飞。晨昏出来觅食，午间和夜晚隐于灌丛或岩石下，以植物性食物为主，也吃昆虫。

红腹角雉 HOG FU JIAO ZHI 107

鸡形目 雉科 别名：灰斑角雉、黄连鸡、哇哇鸡

国内分布于甘肃、四川、西藏、云南、贵州、广西、湖北等省区。国外分布于印度、缅甸、越南等地。

红腹角雉头顶羽中藏有一对钴蓝色肉角、喉下具钴蓝色的肉裾，在繁殖季节求偶时肉角竖起，肉裾膨大，肉裾中央密布淡蓝色点斑，两边缘具9个对称的赤红色斑块。

红腹角雉栖息在海拔1000～3500米的阔叶林和针阔混交林内。冬季随雪线下移迁至海拔较低处，翌年3～4月随雪融化又向上迁移。性较孤独，多单只活动。冬季多见家族小群在一起活动、觅食，吃植物性食物，主要啄食多种草本和蕨类的嫩叶，也吃果实、种子和地下茎，偶尔吃一些昆虫和软体动物。白天在地上活动，夜间在树上栖息，栖息的高度多为5～15米。雄鸟的“哇、哇”叫声，似小孩啼哭，故有“哇哇鸡”之称。4～6月繁殖，在树上筑巢，每窝产卵3～5枚，由雌鸟孵卵。

血雉 XUE ZHI 108

鸡形目 雉科 别名：松花鸡、松鸡子、笋壳鸡

国内分布于四川、甘肃、陕西、青海、西藏、云南等省区。国外仅见于尼泊尔、锡金、不丹。

血雉体型似小型母鸡。血雉栖息在雪线附近的高山针叶林或针阔混交林中，随季节变化有垂直迁移现象，这种迁移与雪线进退有关。血雉喜欢结小群生活，冬季集群稍大些。它们早上由较寒冷的山谷向已有

阳光的山顶游荡，午后又逐渐由山顶向下迁移。血雉在林中或林边开阔地上觅食，食物主要是绿色植物及其种子，也吃一些昆虫及卵、软体动物等。血雉在4～7月繁殖。每窝产卵5～12枚，多为6～8枚。

白马鸡 BAI MA JI

鸡形目 雉科 别名：藏马鸡、雪雉、大雪鸡

白马鸡是我国的特产，分布于西藏、青海、四川、云南等省区。

白马鸡栖息在海拔3500～3900米的亚高山针叶林中，有垂直分布现象，冬季下移至针阔混交林活动。多结小群，至秋季则结成更大的群。有时和血雉、雉鹑一道在树枝上栖息。多在林间草地或林缘地带觅食，活动范围不大，斜坡和空旷的草地上很少见到。白马鸡多用嘴挖土觅食，成年白马鸡的食物以植物为主，食物有明显的季节性变化。幼马鸡的食物以昆虫为主。

藏马鸡 ZANG MA JI

鸡形目 雉科 别名：哈曼马鸡

藏马鸡是我国的特产，仅分布于西藏。

栖息在高山的针阔叶混交林、针叶林及林线上缘的疏林灌丛，多在灌丛、草甸及杜鹃丛中活动、觅食。喜结群生活，秋冬季可结成七八十只的大群。刨食植物根茎，啄食植物嫩枝、叶等。雏鸟食物以昆虫等为主。每年5～6月繁殖，每窝产卵6～9枚。

专家建议列入国家二级重点保护野生动物名录。

蓝马鸡 LAN MA JI

鸡形目 雉科 别名：马鸡、松鸡、角鸡

蓝马鸡是我国的特产，分布于四川、青海、甘肃、宁夏等省区。

蓝马鸡是典型的亚高山针叶林和高山灌丛鸟类。秋后雪线下移，蓝马鸡常随之迁到有水的山谷或开阔的灌丛平原。秋季开始结群，逐渐迁入林中或林缘附近活动。繁殖季节则成对散居。平时拂晓开始活动，在林中或灌丛间觅食，常边吃边叫，此起彼伏；中午隐匿于灌丛间；傍晚开始活跃；夜间，鸡群为了自身的安全，多栖息于高大浓密的树冠中。飞翔能力不强，易遭猛禽及狐、狼等捕食。蓝马鸡主要吃多种植物的叶、芽、果实和种子，也吃一些谷物和昆虫。

宁夏回族自治区人民政府已将蓝马鸡定为“区鸟”。

黑鹇 HEI XIAN

鸡形目 雉科 别名：鸬雉

国内分布于西藏、云南等省区。

黑鹇体长56～60厘米。雄鸟体羽主要为黑色，故名黑鹇。头顶具黑羽冠，背羽具紫色金属光泽；尾长而侧扁、呈屋脊状；胸羽呈披针状，呈白色而沾灰；脸部裸皮红色，在繁殖期有细小的疣状突。雌鸟体羽主要为红褐色，具棕纹及黑褐色不规则斑。

黑鹇栖息在海拔1300～3300米的阔叶林中。多见于箭竹丛及林间草丛，成对或与幼鸟一起活动。食物以植物嫩叶、种子为主，也吃昆虫。黑鹇于5～6月产卵，每次产卵约16枚，孵化期23～25天。

黑鹇分布区狭小，数量稀少，应加强保护。

白鹇 BAI XIAN

鸡形目 雉科 别名：白雉、银雉、白鹇鸡、越禽

国内广泛分布于南方各省。国外分布于中南半岛。

白鹇栖息在多林山地，尤其喜欢在山林下层的浓密竹丛间活动，多见于从山脚至海拔1500米之间。多在晨昏活动，白天隐匿不见。白鹇爱清洁，常做沙浴。白鹇觅食时边走边叫，叫



声粗糙。食物主要为昆虫幼虫及各种浆果、种子、嫩叶、草子、苔藓等，饱食之后常栖息于茂密的矮树上，夜间亦栖宿于树枝上。白鹇4月份开始繁殖，繁殖期间，雄鹇好斗，甚至打得头破血流、精疲力尽。筑巢于灌木丛间的地面凹处，每窝产卵4~6枚。

原鸡 YUAN JI

鸡形目 雉科 别名：茶花鸡、茶花鸡、山鸡

原鸡属有4种，即绿领原鸡、黑尾原鸡、灰纹原鸡和红原鸡。分布在亚洲南部。我国只产红原鸡一种，分布于云南、广东、广西、海南等省区。

原鸡形态与家鸡十分相似，但稍小，尾长而下垂，特别是一对中央尾羽特别长，呈镰刀状，为闪闪发光的蓝黑色。

原鸡栖息在热带、亚热带森林及灌丛地带，喜欢在灌丛中活动。原鸡羞怯怕人，视觉、听觉灵敏，性机警，稍有风吹草动，便惊起直飞，或迅速奔入灌丛、树林中。雄原鸡的啼声很像家鸡，但较尖而短，很像家养小公鸡的叫声。听起来其声仿佛是“茶花两朵”，故又有“茶花鸡”之称。雌原鸡下蛋后并不啼鸣。原鸡是杂食性鸟类，晨昏间活动觅食。以植物性食物为主，如坚果、种子、嫩芽、根、茎、叶等，也吃动物性食物，如蚯蚓、白蚁、幼蛾、蠕虫等。

四种原鸡中，红原鸡是家鸡的祖先，在我国驯化原鸡为家鸡至少有3000多年历史。

勺鸡 SHAO JI

鸡形目 雉科 别名：柳叶鸡、山麻鸡、角鸡、松鸡

国内分布于西藏、云南，往北至甘肃、陕西、辽宁，往东至广东、浙江、福建等省区。国外分布于阿富汗向东至尼泊尔。

勺鸡栖息在海拔700～4000米的落叶阔叶林或针阔混交林中，特别喜欢在高低不平且密生灌丛的多岩坡地或阳坡的山沟两侧林内活动，很少飞出林外，有季节性垂直迁移现象。雌雄终生成对，很少结群，在冬季有时能见到松散的小群。勺鸡夜间栖于树上，白天在灌丛、草地里活动觅食，几乎完全啄食植物性食物，主要吃蕨类、草本植物和灌木的花、嫩叶、幼芽、也吃草子、菌类及植物果实和种子。勺鸡每年繁殖一次，其间雄鸟有精彩的求偶表演。

白冠长尾雉 BAI GUAN CHANG WEI ZH

112

鸡形目 雉科 别名：地鸡、长尾鸡、翅鸡



长尾雉属有5种，除赤颈长尾雉分布在日本外，其余4种均分布于我国。白冠长尾雉分布于我国中部山地。

白冠长尾雉体型大小似家鸡；尾羽特别长，雄鸟的长尾达一米多，雌鸟尾短，只有33厘米左右。京剧舞台上常用此雉的长尾羽作为武生头盔上的冠饰。名为“雉鸡翎”。

白冠长尾雉栖息在海拔400～2600米的山地阔叶林中，尤其喜欢在离庄稼地不远的林区生活。他的双翅较长，能作长距离飞行。当快速飞行时能骤然停止直线降落，因为它具有能转动和扩张的长尾羽。这种雉听觉、视觉灵敏，性机警，一有动

静，在其他雉类尚未觉察时便能发现，并立即起飞。它跑得也很快，可以从猎狗面前溜之大吉。食性较杂，但以植物性食物为主，随季节不同而有差异。繁殖期间雄雉好斗。白冠长尾雉羽色华丽，姿态优美，长尾秀丽夺目，是著名的观赏鸟。

锦鸡（所有种）JIN JI

鸡形目 雉科

锦鸡属仅有两种，即白腹锦鸡和红腹锦鸡。前者分布于我国西南和缅甸东北部；后者分布于我国中部和中西部山区，以秦岭和西秦岭山脉最多，陕西省宝鸡市就是以盛产红腹锦鸡而得名。红腹锦鸡的分布区在白腹锦鸡栖息地东北，基本不相重叠，但在接触的地方有杂交现象；而且两种雌鸟的形态，卵的颜色、形状和大小，孵化期，雏鸟形态等都很相像，说明两种锦鸡亲缘关系很近。

白腹锦鸡 BAI FU JIN JI

别名：铜鸡、银鸡、笋鸡

栖息在海拔1200～3500米高的山地林间，常栖于林下灌丛或矮竹间，主要吃植物性食物，以植物茎、叶、花、果实及种子为主，繁殖季节也吃动物性食物。白腹锦鸡平时单独或成对活动，秋冬时，常结成20～30只的群。夏季迁到高山有岩石的峭壁之处。白腹锦鸡在人烟稀少的地面营巢，巢很简陋。雌鸟产卵约需7～12天，每天或隔天产卵1枚。由雌鸟孵卵，其恋巢性极强。

红腹锦鸡 HONG FU JIN JI

别名：金鸡、锦鸡、红鸡

栖息在多岩石的低山。在针、阔叶常绿落叶混交林和落叶常绿混交林中数量较多。夏季常单独或成对活动，冬季有时结成小群。出没于矮树丛或竹林间。红腹锦鸡吃灌木的叶、种子、嫩芽和竹笋，也吃昆虫、蜘蛛等动物性食物。红腹锦鸡在春暖花开的时候繁殖。此时，雄鸟会展开橙褐色的披肩，显现出背上金黄色的羽毛，闪耀着深红色的胸羽，在雌鸟面前炫耀。

两种锦鸡均为驰名中外的观赏鸟，颇受人们喜爱。

灰鹤 HUI HE

鹤形目 鹤科 别名：玄鹤、番薯鹤

灰鹤是鹤类中数量最多最常见的一种。在我国繁殖于新疆西部、内蒙古和黑龙江北部，在长江以南至海南省越冬。在国外，广泛分布于欧洲、亚洲和北非。

灰鹤栖息范围很广，主要在滩涂、湖泊水边、草滩沼泽等湿地生境活动，灰鹤不可能飞落在树上。灰鹤喜欢涉于河湖的淡水中。多集群活动，警惕性高，很难接近。灰鹤的食性很杂。动物性食物有昆虫、环节动物、软体动物、鱼类、两栖动物、爬行动物、小鸟及鼠类等，植物性食物有水草、野草种子及谷粒等。灰鹤在4～5月间繁殖，每次产卵2枚，雌雄鹤轮流孵卵。

沙丘鹤 SHA QIU HE

鹤形目 鹤科 别名：加拿大鹤、棕鹤

沙丘鹤主要产于从古巴经美国到加拿大北部和西伯利亚东北部。偶见于我国，为迷鸟。

沙丘鹤是一种美丽的鹤，全身棕灰色，唯有头上裸露的皮肤呈鲜红色，固又有“棕鹤”之称。

沙丘鹤的骨骼化石曾发现于距今900万年的上新世地层堆积中，可以说是世界上最古老的一种现代鸟类。沙丘鹤栖息在

沼泽湿地。以水生昆虫、植物嫩茎叶等为食。它的性情活泼，善于跳跃，繁殖季节边跳边舞，最高可跳3米多。每窝产卵2枚，孵化期28天左右，雏鹤羽毛呈黄褐色。

白枕鹤 BAI ZHEN HE

鹤形目 鹤科 别名：红面鹤、白顶鹤

白枕鹤在我国繁殖于内蒙古、黑龙江、吉林等省区，越冬于长江中下游的江苏、安徽、湖南、江西以及福建等省。国外繁殖于俄罗斯，冬季见于日本及朝鲜半岛。

白枕鹤是候鸟，夏季到北方繁殖。3月下旬飞往繁殖地，多结成大队飞翔，排成“一”字形或“人”字形。到达后多以家族小群活动。早期迁来时，由于沼泽地被冰雪覆盖，主要吃植物种子、草根、谷物及少量死鱼、昆虫等；5月后，天气转暖，食物丰富，转向以鱼、虾、贝壳、蚌等动物性食物为主，兼食玉米、小麦及植物根、茎、叶等。

白枕鹤叫声洪亮，它们在起飞、飞翔、觅食、宿营时都会鸣叫。当空中有鹤鸣叫时，地面的鹤也会呼应。

全世界野生种群估计为5000只，其中约60%在我国的鄱阳湖越冬。

蓑羽鹤 SUO YU HE

鹤形目 鹤科 别名：闺秀鹤

国内繁殖于新疆、内蒙古、黑龙江、吉林等省区，在西藏南部越冬。

蓑羽鹤是鹤类中最小的一种。它的体态高贵、文静而秀丽，性情胆小羞怯，不喜欢与其他种鹤合群，而喜欢独处，故又有“闺秀鹤”的美称。蓑羽鹤栖息在芦苇沼泽地及近水荒地等处，成小群活动。食物以植物的嫩芽、种子为主，也吃鱼、蜥蜴、软体动物及昆虫等。3月中旬迁到繁殖地。每窝产卵2枚，雌雄轮流孵卵。

长脚秧鸡 CHANG JIAO YANG JI

鹤形目 秧鸡科

分布于我国新疆、西藏等地。

长脚秧鸡体长约25厘米。栖息在草地或开阔地。以昆虫、蠕虫、草籽为食。

姬田鸡 JI TIAN JI

鹤形目 秧鸡科

分布于我国新疆。

姬田鸡体长约20.5厘米。栖息在多草丛的河岸边和沼泽地区。以水生昆虫为食。属于稀有种。

棕背田鸡 ZONG BEI TIAN JI

鹤形目 秧鸡科

国内分布于西藏、四川、贵州、云南等省区。数量稀少。

棕背田鸡体长约19.7厘米。栖息在林中小溪附近湿地灌丛及湿草地。以水生昆虫为食。

花田鸡 HUA TIAN JI

鹤形目 秧鸡科

国内繁殖于内蒙古，迁徙经我国东部，冬侯鸟见于江西、福

建、广东等省。

花田鸡体长约14厘米。栖息在小河、湖泊、沼泽附近的草丛中，并多在那里觅食，以藻类、水生昆虫、甲壳动物及软体动物等为食。

—● 铜翅水雉 TONG CHI SHUI ZHI

鸻形目 雉鸻科

国内分布于云南省西南部。数量十分稀少。

铜翅水雉体长约30.5厘米。头颈、下体黑色，具绿色金属闪辉；从眼到颈有白色条纹；背、内侧初级飞羽橄榄铜绿色；尾下覆羽栗色。

铜翅水雉栖息在平原植物茂密的水域中，常见在植物覆盖的大池塘和沼泽地活动。以昆虫、蜗牛、小鱼和水生植物为食。平时成对或以家族小群在一起活动。在繁殖季节，雄鸟有占据领地的现象，除雌鸟外，不准别的雄鸟进入。7～8月产卵，每窝产卵4枚。

产于我国的雉鸻科鸟类还有水雉，该种未被列入国家保护动物名单。为了区别我国雉鸻科鸟类中的保护种和非保护种，现将水雉的分布和生活习性等简介如下。水雉在我国分布于华北、华东、华中、华南及四川等地。栖于水草茂密的池塘或沼泽地，能在漂浮的水面莲叶上走动。

—● 小杓鹬 XIAO SHAO YU

鸻形目 鹬科 别名：小油老罐子

国内分布于东北、内蒙古、向南经沿海各省至广东、海南、台湾等省。国外分布于俄罗斯西伯利亚和澳大利亚等地。

小杓鹬栖息在海岸及近海岸的草原、沼泽、池塘、河口三角洲、河岸洼地及水田等处。涉水于浅滩或淤泥中觅食，主要吃小鱼、蛙类、软体动物、甲壳动物、蠕虫、昆虫以及藻类，很少到深水中去。当潮水上涨时，小杓鹬活动较少，潮水退后，就

到被海水淹过的沙地上觅食。性好群居，并常与其他鹬混群。小杓鹬在西伯利亚北部繁殖。在草丛中的地面凹处筑巢，每窝产卵4枚左右，雌雄鸟轮流孵卵。孵卵时如遇上敌害，担任守卫任务的亲鸟会假装受伤，把敌害引开。

小青脚鹬 XIAO QING JIAO YU

鸻形目 鹬科 别名：诺氏鹬

国内分布于东南沿海各省及海南、台湾。

小青脚鹬栖息在海岸线、沼泽、池塘、河口三角洲等处，单独或呈家族小群活动。善奔跑，飞翔力也强。常立于海滨低岩的顶处等待退潮。退潮后，在淤泥或沙里用嘴探索食物。当嘴刺人淤泥不够深度时，就跳起来用整个身体的重量向下压，以增加嘴插入泥中的深度。食物为昆虫、软体动物、甲壳动物、环形动物等。小青脚鹬繁殖于西伯利亚东部。在沿海砂砾上挖穴为巢，每窝产卵3～5枚，多为4枚。

灰燕鸻 HUI YAN HENG

鸻形目 燕鸻科

国内分布于云南省。

鸻类鸟是嘴短而强直的中型或小型涉禽。我国有鸻类鸟13种，多为冬候鸟或旅鸟，最常见的种类的金斑鸻（也称金鸻），它啄食危害农作物的昆虫，对农业有益；常见种还有金眶鸻及个体稍大的凤头麦鸡。

灰燕鸻体长约18厘米。灰燕鸻见于水域沙滩上，常在空中或掠过水面捕食昆虫，以直翅目、双翅目昆虫等为食。

全世界有燕鸻科鸟类17种，我国有2种，即灰燕鸻和普通燕鸻。灰燕鸻为稀有种和保护种。普通燕鸻以蝗虫、甲壳类等为食，是益鸟，也应该注意保护它。

小鸥 XIAO OU 118

鸥形目 鸥科

国内分布于内蒙古、新疆、河北、江苏等省区。

小鸥体长约27.5厘米。头部黑色，上体淡白色；下体白色，微染玫瑰色；冬羽头部白色，头顶和颈带黑色斑块。见于大型水域。以昆虫为食。数量很少，属于稀有种。

黑浮鸥 HEI FU OU

鸥形目 鸥科

国内分布于新疆等地。

黑浮鸥体长约24厘米。翅长超过尾端，尾端略成叉形，趾间有瓣蹼，适于游水。栖息在沿海、河川和湖沼地带。以水生昆虫和昆虫为食。数量很少，属于稀有种。

黄嘴河燕鸥 HUANG ZUI HE YAN OU

鸥形目 鸥科

国内分布于云南。

黄嘴河燕鸥体长约43厘米。翅长而尖，尾呈深叉形；脚具全蹼，适于游水。常结成小群，活动于江河上空或河滩上，以食鱼类为主，也吃蛙、蝌蚪、甲壳类和水生昆虫。数量稀少，应加强保护。

黑嘴端凤头燕鸥 HEI ZUI DUAN FENG TOU YAN OU

鸥形目 鸥科

国内分布于山东沿海（夏候鸟）及福建、广东沿海一带（旅鸟）。

黑嘴端凤头燕鸥体长约42厘米。冠黑色，颈和下体白色，背灰白色，翅和尾珠灰色。栖息在港湾、河口以及岛屿周围。以鱼、虾和昆虫为食。

黑腹沙鸡 HEI FU SHA JI

鸽形目 沙鸡科 别名：沙鸡、沙半鸡

国内仅见于新疆北部、西部。数量相当稀少。国外分布于俄罗斯南部、中近东地区及非洲西北部。



黑腹沙鸡体长约39厘米。体大如鸽；嘴为鸡嘴状，翅、尾尖长，中央一对尾羽特别延长呈针状；上体大都呈沙灰色，杂有暗黄色；下体栗色，胸灰色，下缘有一黑色狭纹；腹和两胁具一宽大的黑褐色带斑。

黑腹沙鸡为稀有种类。主要栖息在海拔500～900米的荒漠、半荒漠草原地区。多成对或结小群活动。除越冬期外，很少结成大群。常在日出前或日落后作长途飞行，到有水源的地方喝水。饮水动作像鸽子。以植物种子及嫩芽等为食，也吃少量的甲虫及昆虫幼虫。黑腹沙鸡营巢于地面，每窝产卵多为3枚，偶见2枚。

我国产3种沙鸡科鸟类，除黑腹沙鸡外，还有毛腿沙鸡和西藏毛腿沙鸡。西藏毛腿沙鸡为稀有种类，也应该注意保护它。

绿鸠（所有种）Lü JIU

鸽形目 鸠鸽科

分布于我国的绿鸠共有8种，分别介绍如下：

针尾绿鸠 ZHEN WEI Lü JIU

国内分布于云南、四川。栖息在热带季雨林中，以无花果

及其他野果为食。

—● 楔尾绿鸠　XIE WEI Lü　JIU

国内分布于云南、四川、西藏。栖息在常绿阔叶林或混交林中，以果实为食。

—● 红翅绿鸠　HONG CHI Lü　JIU

国内分布于陕西、四川、贵州、广西、云南、海南、台湾等省区。栖息在山地森林，食物主要为浆果、野果及草子等。

—● 红顶绿鸠　HONG DING Lü　JIU

国内仅分布于台湾省。栖息在常绿阔叶林，它的体色和树叶相近，所以不易被发现。以蔷薇科等果实为食。

—● 黄脚绿鸠　HUANG JIAO　Lü　JIU

国内仅分布于云南。栖息在热带亚热带的雨林和季雨林中。秋、冬季数十只结群，夏季多单个或成对活动，食物为浆果和榕树等果实，也吃谷物。

—● 厚嘴绿鸠　HOU ZUEI　Lü　JIU

国内分布于云南、广西及海南省。栖息在丘陵及山地密林中。喜欢在无花果、山地榕等生境中活动、觅食。榕树果成熟季节，可见同一棵榕树上，厚嘴绿鸠与针尾绿鸠、八哥等多种鸟百余只，共同觅食。

—● 灰头绿鸠　HUI TOU Lü　JIU

国内仅分布于云南西双版纳。栖息在热带雨林和次生林中，单个或结小群在林中活动，嗜食果实。

—● 橙胸绿鸠　CHENG XIONG Lü　JIU

国内仅分布于海南省，见于台湾省的为迷鸟。栖息在热带

雨林中。多集小群活动，有时混于其他鸟群中。主要以无花果果实为食，也吃种子和昆虫。

黑颏果鸠 HEI KE GUO JIU 121

鸽形目 鸠鸽科 别名：黑颏绿鸠、小绿鸠

国内分布于台湾省。



黑颏果鸠体长约27厘米。雄鸟，头、颈部、上胸为灰白色；后头至后颈绿色；背部绿色并具浅黄光泽；下胸有一紫褐色横带，腹淡灰绿色。雌鸟，头至颈部和胸略带绿色，额至前头灰绿色。

黑颏果鸠栖息在热带、亚热带森林。不结大群，以果实和浆果为食。在树上筑巢，巢形平台状，每窝产卵1枚。黑颏果鸠的经济意义主要是观赏。其观赏价值主要指作为一个物种的观赏价值。

皇鸠（所有种）HUANG JIU

鸽形目 鸠鸽科

皇鸠属于鸠鸽科皇鸠属。分布于我国的皇鸠属鸟类有绿皇鸠和山皇鸠。

绿皇鸠 Lü HUANG JIU

别名：绿南鸠、大绿鸠

国内分布于云南、广东、海南。

绿皇鸠栖息在平原至丘陵的阔叶林中，多单个活动，冬季

集成小群。以野果、种子和嫩芽为食，也吃少量昆虫。

山皇鸠 SHAN HUANG JIU

别名：灰头南鸠、栗背皇鸠、大山鸽

国内分布于云南、海南等省。

山皇鸠主要栖息在高山林区，有时也到开阔的平原地区活动，有比较固定的栖息地。它善于飞行，早出晚归。以多种植物果实为食，尤其爱吃橄榄、榕树、乌榄、琼楠等果。

斑尾林鸽 BAN WEI LIN GE

鸽形目 鸠鸽科

国内分布于新疆西部及天山。

斑尾林鸽栖息在阔叶林中，常结群活动，冬季群集更大。在地面、树丛或灌丛间觅食，以各种野果、浆果及种子为食。为稀有种。野生的鸽双翅较短，胸肌发达，飞翔能力很强。双脚短健，在地上走得也很快。一般栖居在山区的岩壁。常见的鸽属鸟类有岩鸽和原鸽。原鸽是家鸽的祖先。

鹃鸠（所有种）JUAN JIU

鸽形目 鸠鸽科

分布于我国的鹃鸠属鸟类有3种，即斑尾鹃鸠、棕头鹃鸠、乌鹃鸠，3种均为稀有种类。现分别介绍如下：

斑尾鹃鸠 BAN WEI JUAN JIU

别名：花斑咖追

国内分布于四川、云南、福建、广东、海南等省。栖息在海拔1800米以下的热带雨林和季雨林中。单个、成对或集小群活动。以多种野果，尤其是各种小浆果和榕树果为食，也吃稻谷和草子。在树上营巢，每窝产卵1～2枚，雌雄共同孵卵、育雏。数量稀少，属珍稀种类。

棕头鹃鸠 ZONG TOU JUAN JIU

别名：小赤鹃鸠

国内仅见于云南省西双版纳。栖息在海拔600米以上的热带森林，多单个或成对活动。以野果为食，也吃草子和谷物。营巢于竹林或灌丛，巢用苔藓作垫，每窝产卵1枚。

乌鹃鸠 WU JUAN JIU

别名：赤鹃鸠

国内仅见于台湾省。体长约38厘米。在山地森林中栖息、觅食。

鹦鹉科（所有种）

鹦形目 鹦鹉科

鹦形目只有一科，即鹦鹉科，可分为8亚科82属332种。我国只有2属7种，即红领绿鹦鹉、绯胸鹦鹉、大绯胸鹦鹉、花头鹦鹉、灰头鹦鹉、长尾鹦鹉、短尾鹦鹉。

鹦鹉分布于亚洲南部、澳洲、非洲及中南美洲。澳洲种类最多，中南美洲最繁盛。鹦鹉在鸟纲分类系统树上独出一枝，与其他目鸟类没有连续性。鹦鹉最突出的特点是嘴和脚的结构。嘴外形似鹰和鸮类，有的钩状嘴的弯度甚至超过鹰和鸮。上嘴基部跟鹰类一样有蜡膜，多数有毛，鼻孔开在蜡膜中。上嘴跟头盖骨由可动关节相连，所以鹦鹉的嘴能稍向上张开，这是其他鸟类所没有的。鹦鹉的舌是微妙的感觉器官，呈厚的肉质，尖端呈梨形或呈毛刷状乳突。脚的构造也很特殊，其第二三足趾向前，第一四足趾向后，为对趾足。羽色多种，尾长短不一，形状多变。

现将分布于我国的7种鹦鹉分别介绍如下：

红领绿鹦鹉 HONG LING Lü YING WU

别名：粉红领鹦鹉



国内分布于广东珠海万山群岛及附近沿海一带。栖息在山麓开阔地附近，它们飞得很高，有时会突然降落到地上。主要以谷物、木棉花及其他浆果为食。这种鹦鹉在香港很多，是从外地引入的，已经成为香港一幅动人的大自然景色。

绯胸鹦鹉 FEI XIONG YING WU

别名：鹦哥

国内分布于西藏、云南、广东、广西、海南等省区。绯胸鹦鹉栖息在海拔不很高的山麓常绿阔叶林中，白天多结小群在树上啄食坚果、浆果及其他果实，有时也到田间啄食玉米、谷物等。夜间宿栖于树上。绯胸鹦鹉羽色艳丽，善学人语，是理想的观赏鸟。由于过度猎捕，如今野生的已极为罕见。

大绯胸鹦鹉 DA FEI XIONG YING WU

别名：大紫胸鹦鹉

国内分布于西藏、四川、云南、广西等省区。栖息在海拔

2000～3000米的森林中。多结30～50只大群活动，飞行急速，边飞边鸣，叫声粗厉，群喧嘈杂。以球果种子、其他种子、坚果等为食。秋季常到田间啄食谷物，或停落在胡桃、板栗等树上啄食果实；有时也到松树上啄食嫩松果。

—● 花头鹦鹉 HUA TOU YING WU

国内分布于云南、广西、广东，但十分罕见，有人怀疑我国可能没有这种鹦鹉。花头鹦鹉见于低山和平原地带，喜欢在开阔林地和耕地周围的林木中集群活动。多在树上攀缘活动，也到地面觅食，以种子、浆果、坚果、花瓣、叶芽等为食，尤其喜食榕果、枣类核果等，也吃谷类。

—● 灰头鹦鹉 HUI TOU YING WU

国内分布于四川、云南。栖息在山谷雨林及山坡疏林的阔叶树上，秋冬时，到山林边缘地带多野果的树上及耕地等处活动、觅食。春夏多单独或成对活动，秋冬多结成数十只的大群。食物以无花果、其他野果和种子为主，也吃玉米等谷物。鸣声很尖，有时会发出轻柔多变和富于乐感的似细语声。

—● 长尾鹦鹉 CHANG WI YING WU

别名：红颊鹦鹉

国内分布于四川、广西。虽然两省都有记录，但都尚有疑问。栖息在热带雨林的阔叶树上，常集大群快速往返飞行于取食场所和停栖的地方。栖于树顶或飞行时发出粗声刺耳的尖叫声。以浆果、坚果、种子、花蜜、叶芽等为食。

—● 短尾鹦鹉 DUAN WEI YING WU

别名：倒悬鹦鹉

国内分布于云南、广东。数量极少。栖息在热带、亚热带的常绿林中，尤其爱在多花的树木上活动。它常在花枝上倒悬

着啄食花朵，故有“倒悬鹦鹉”之称。以果食、花蜜及种子等为食。

鸦鹃（所有种）YA JUAN 126

鹃形目 杜鹃科

鸦鹃属于杜鹃科鸦鹃属。分布于我国的鸦鹃属鸟类有褐翅鸦鹃和小鸦鹃。

褐翅鸦鹃 HE CHI YA JUAN

别名：大毛鸡、毛鸡

国内分布于浙江、福建、广东、广西、贵州、云南、海南等省区。野外数量极为稀少。栖息在丘陵山地丛林中。不善飞行，多在荆棘蔓枝间跳跃，受惊即下地逃遁。性机警，善隐匿。食性广泛，以毛虫、甲虫、蝗虫、蜥蜴、鼠类等为食，也吃软体动物、植物果实、杂草种子等。多营巢于草丛、灌丛、竹林等处，巢离地面多为1～7米，每窝产卵3～4枚。

小鸦鹃 XIAO YA JUAN

别名：小毛鸡

国内分布于安徽、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南、海南、台湾等省区。小鸦鹃的栖息环境和习性与褐翅鸦鹃相似。善于在地面上行走；翅短圆，不善高飞。多单独在草、灌丛中觅食，很少到空旷或无隐蔽物的地方活动。

褐翅鸦鹃和小鸦鹃都嗜吃农林害虫，尤其爱吃蝗科昆虫，对农林业有利。

两种鸦鹃均可做药用，可发展人工养殖。

鸮形目（所有种） 127

鸮形目鸟类为夜行性猛禽，是数量相当大的一个类群。分布几乎遍及全球，但以东半球热带地区的种类最多。全世界有

鸮形目鸟类134种，分为草鸮科和鸱鸮科，两科在我国均有分布，共27种，即属于草鸮科的仓鸮、草鸮、栗鸮；属于鸱鸮科的黄嘴角鸮、纵纹角鸮、红角鸮、领角鸮、雕鸮、林雕鸮、乌雕鸮、褐鱼鸮、毛脚鱼鸮、黄脚鱼鸮、雪鸮、猛鸮、花头鹰鹛、领鹰鹛、斑头鹰鹛、鹰鸮、纵纹腹小鸮、褐林鸮、灰林鸮、长尾林鸮、乌林鸮、长耳鸮、短耳鸮、鬼鸮。

鸮形目鸟类的主要形态特征是：嘴短壮呈钩形，嘴基具蜡膜并披羽；头大而颈短，具面盘，眼形大；尾羽短圆，一般为12枚，少数为10枚；脚强有力，跗蹠披羽，爪形大而锐利，第4趾（外趾）能向后转动。雌鸟体型比雄鸟大。鸮形目鸟类俗称猫头鹰，多数是著名的农林益鸟，每年能消灭大量害鼠，保护粮食。

现将分布于我国的鸮形目鸟类分别介绍如下：

仓鸮 CANG XIAO

别名：猴面鹰

国内仅分布于云南，数量稀少。栖息在热带、亚热带地区。单个活动，夜间在农田或居民点附近捕食鼠类。它的捕鼠本领很高，发现猎物后，悄悄地滑行，接近猎物时，会发出尖厉的叫声，然后捕而食之。仓鸮每窝产卵2～7枚，雌鸟孵卵，双亲共同育雏。

草鸮 CAO XIAO

别名：猴子鹰

国内分布于安徽、浙江、江西、湖南、福建、广东、广西、贵州、云南、台湾等省区。栖息在山地灌丛中，也见于沿海芦苇中、滩地草丛中。多单独活动，白天隐匿，黄昏开始活动。靠敏锐的听觉和视觉在夜间捕食鼠类。一只草鸮在一个夏季能捕捉老鼠1000只左右。也吃昆虫、小鸟、鸟卵、小蛇和蛙等。

栗鸮 LI XIAO

国内分布于云南、广西、海南。栖息在热带雨林及常绿阔叶林内，在黄昏及黎明前活动，主要以小型哺乳类、蜥蜴、青蛙及大型昆虫为食。3～5月繁殖，营巢在树洞或腐朽的树桩内，每窝产卵3～5枚，雌雄鸟共同孵卵。

黄嘴角鸮 HUANG ZUI JIAO XIAO

国内分布于福建、广东、广西、台湾及海南等省区。栖息在海拔600～2600米的山地针、阔叶林中。喜欢在夜间活动，白天藏在阴暗的地方或洞穴中，主要以大型昆虫为食，也吃小型啮齿类、小鸟和蜥蜴等。黄嘴角鸮的叫声很有特点，为银玲似的双音节的啸声，可延续数小时之久，几只鸟相互呼应。

纵纹角鸮 ZONG WEN JIAO XIAO

是我国十分罕见的小型鸮，新疆有过记录。可能是迷鸟或迁徙时旅鸟。体长约21厘米。栖息在干旱、半干旱地区的有林区、果树区及灌溉农田。多在灌木丛中活动。

红角鸮 HONG JIAO XIAO

别名：夜猫子、聒聒鸟子

国内除青藏高原、内蒙古草原及海南外，各省区均有分布。多栖息在靠近水源的河谷森林中，喜欢停落在阔叶树上。白天隐匿在枝叶间，夜间出来活动、觅食。主要以昆虫和啮齿动物为食，偶尔也捕食小鸟。传说此鸟吃人参种子，所以又称它“棒槌鸟”。

领角鸮 LING JIAO XIAO

别名：毛脚鸮鹗、光足鸮鹗

国内分布于东北、华北、西南、华中及华南部分地区。栖息在山地森林中，也见于园林、寺庙、农耕地及村落附近疏林

中。多单独活动，繁殖期成对。白天隐匿在枝叶繁茂的树冠上或其他阴暗的地方，黄昏开始活动、觅食，直到黎明。食物以鼠类和昆虫为主，对农林业有益。

雕鸮 DIAO XIAO

别名：鹫兔、恨狐、怪鸱、角鸱

国内分布较广，几乎遍及各地。多栖息在山地疏林间，白天在林间隐蔽休息，其听觉灵敏，稍有惊动，立即伸颈张目，观察动静，并随时准备飞走。黄昏开始活动、觅食，飞速不快，没有声音，发现猎物即急扑猎食，雕鸮主要以鼠类为食，对农林业十分有益。

林雕鸮 LIN DIAO XIAO

别名：林鹰鸮

国内分布于四川和云南，为罕见的留鸟，数量十分稀少。林雕鸮在四川栖息于常绿阔叶林，在云南栖息于热带雨林。白天隐匿于茂密枝叶间，黄昏开始外出活动、觅食。主要以鼠及昆虫为食，也吃鸟、小兽、蛇、蜥蜴和鱼等。

乌雕鸮 WU DIAO XIAO

国内分布于江西、安徽、浙江。十分罕见。乌雕鸮是森林鸟类，主要栖息在水源较丰富的森林和灌丛草原地带。以鸦类、蛙、蛇、蜥蜴等为食，也吃鸟蛋。在大树的树杈上筑巢或占用鹰类旧巢，每窝产卵2枚。

褐鱼鸮 HE YU XIAO

别名：酱色鱼鸮

国内分布于云南南部、广东、广西、海南等地。栖息在近水源的乔木上，有时成对栖于枝叶稠密处。褐鱼鸮是半昼性鸮类，下午就开始活动、觅食，常在水面上飞翔猎食，食物以鱼、

蛙为主，一旦发现猎物，即从水中抓出来。

—● 毛腿鱼鸮 MAO TUI YU XIAO

国内分布于东北及内蒙古。为全球性濒危种，十分罕见。栖息在沿两岸有林的河流。喜欢在夜间活动，多站在浅水中等待猎物，主要以鱼类为食，也吃蝌蚪等其他水生动物。

—● 黄脚鱼鸮 HUANG JIAO YU XIAO

别名：黄鱼鸮、毛脚鱼鸮

国内分布于东部、中部和南部。栖息在山林，昼夜活动，黄昏时比较活跃。常落在高高的树枝上，俯视水面，发现有鱼，立即猛扑抓捕。除了嗜食鱼类外，也吃蟹、蛙、蜥蜴、鸟和啮齿动物。

—● 雪鸮 XUE XIAO

别名：白鸮、白夜猫子

国内分布于黑龙江、辽宁、河北、陕西、新疆等省区。栖息在冻土和荒原地带，也见于山地森林。多单独活动，不太怕人。喜欢白天飞翔觅食，主要以旅鼠、雪兔为食，食物短缺时，也捕食其他啮齿动物和鸟类。雪鸮繁殖高潮的出现与旅鼠数量的增长有关。

—● 猛鸮 MENG XIAO

别名：鹰鸮

国内分布于新疆、黑龙江、吉林、内蒙古。栖息在针叶林、针阔混交林、白桦及落叶松灌丛。飞行迅速，飞行时无声。在黄昏或黎明前猎食，性凶猛，动作快，猎食十拿九稳。主要猎取啮齿动物，也吃鸟类和昆虫。

花头鸺鹠 HUA TOU XIU LIU

别名：纵纹小鸮、鸟丫环

国内仅分布于黑龙江、河北。在我国非常罕见。栖息在针叶林或针阔混交林中的开阔地区。飞行时很像啄木鸟，呈上下波状起伏。性凶猛，嘴爪强健有力，偶尔能捕比自身大的猎物。食物以啮齿动物和鸟类为主，也吃昆虫、蜥蜴等。

领鸺鹠 LING XIU LIU

别名：小鸺鹠、衣领小鸮

国内分布于甘肃南部、陕西南部、河南、江苏南部，及以南各地。体长仅15厘米，是我国最小的鸮类。栖息在山地密林中或近水源的乔木林中，尤其喜欢在背阴山沟的密林丛中。领鸺鹠不怕阳光，中午时也出来活动、觅食，食物主要为鼠类、小鸟和昆虫等。

斑头鸺鹠 BAN TOU XIU LIU

别名：横纹鸺鹠、猫王鸟

国内分布于甘肃、陕西、河南、安徽、江西、湖南、山东、浙江、江苏、广东、广西、贵州、云南、西藏等省区。栖息在丘陵、平原地区的丛林中，也见于村庄附近的树上。多单独或成对生活，虽夜间活动频繁，但白天也外出活动。食物以昆虫和鼠类为主，也吃小鸟、蛙、蜥蜴等。

鹰鸮 YING XIAO

别名：褐鹰鸮、青叶鸮、乌猫王

国内分布于东部和南部，从黑龙江、辽宁东部，西南到四川、云南，东南至台湾省等广大地区。栖息在各种类型的树林里，也见于村落附近的高树上。白天躲在大树上静息，夜晚出来活动，常从树丛中突然飞出，捕食空中飞行的昆虫。此鸟食物以昆虫为主，也捕食鼠、蛙、小鸟、蜥蜴等。

纵纹腹小鸮 ZONG WEN FU XIAO XIAO

别名：东方小鸮、北方猫王鸟

国内分布于北方及西部的大多数地区。多栖息在开阔的林缘地带，也在农田附近的大树上栖息。白天也活动。快速振翅作波状飞行。常立于篱笆或电线上。性好奇，常神经质地点头或转动。食物以昆虫和鼠类为主，也吃小型爬行动物。

褐林鸮 HE LIN XIAO

别名：木鸮、森鸮。

国内分布于东北、华北、华南、西南等地。栖息在山地森林中。多单独活动，白天多隐匿于茂密的树冠顶部，傍晚及夜间外出觅食，食物以鼠类为主，也吃鸟类。褐林鸮性凶猛，能捕食体型较大的鸟类。这种鸟机警而胆怯，稍有惊动，即迅速飞逃。筑巢于天然的树洞中，每窝产卵1～2枚。

灰林鸮 HUI LIN XIAO

别名：木鸮、森鸮

国内分布于东北、华北、华南、西南等地。是温带森林中最常见的一种鸮。栖息在山地密林中，也到山谷溪流地区、林缘灌木丛中活动。喜欢在夜间活动，白天通常在隐蔽的地方睡觉。黄昏时开始猎食。食物主要为鼠、鸟、蛙等。

长尾林鸮 CHANG WUI LIN XIAO

别名：东方乌拉山枭

国内分布于东北、内蒙古、甘肃、青海、四川等地。栖息在针叶林和针阔混交林中，偶尔也到林缘活动。多单独活动。飞行快而无声，一般飞行距离不远。此鸟不是绝对的夜行性鸮类，白天有时也外出活动、觅食。食物以鼠类和昆虫为主，有时也捕食鸟类、兔、蛙等。

乌林鸮 WU LIAN XIAO

国内极为罕见，仅分布于黑龙江和内蒙古。栖息在针叶林和针阔混交林中，有时也到河谷杂木林中活动。常停落在高大乔木顶端的树枝上。性沉静，但有攻击性，通常在巢区附近一无所惧。飞行迅速无声，以鼠类为食。

长耳鸮 CHANG ER XIAO

别名：猫头鹰、夜猫子

国内分布于黑龙江、辽宁、内蒙古、青海，冬季几乎遍布全国各地。栖息在山地森林中，也见于村边、田旁的林地或乔木上。多结小群活动，黄昏时外出觅食，直至黎明才返回栖息地。长耳鸮嗜食鼠类，被人们称为“捕鼠能手”。一只长耳鸮，冬时平均每天捕食2～3只鼠类。

短耳鸮 DUAN ER XIAO

别名：短耳猫

国内分布于东北的西北部，冬季迁徙时几乎遍及我国各地。栖息在针阔混交林和阔叶林中，也见于林缘、沼泽地、草地等处。越冬时多结小群，白天也能活动，飞行缓慢，叫声低缓。多在夜间觅食，食物以鼠类为主，也吃小鸟和昆虫。短耳鸮4～6月繁殖，每窝产卵3～8枚，多时可达11枚。

鬼鸮 GUI XIAO

国内仅分布于黑龙江、甘肃、新疆等地。多栖息在针叶林和针阔混交林中。白天停落在树冠顶部枝叶茂密处或树洞里隐伏，夜间出来捕食，食物以鼠类和昆虫为主，是益鸟。也捕食鸟类和蛙类。鬼鸮鸣声多变如笛，隔几秒重复一次，并不断交替变化；加上它那惊诧的表情，给人以阴森恐怖的感觉，故名“鬼鸮”。

灰喉针尾雨燕 HUI HOU ZHEN WEI YU YAN 136

雨燕目 雨燕科

国内分布于海南省及南海诸岛。

灰喉针尾雨燕体长约18厘米。栖息在较高的山地或山下村庄，多在空中活动，飞捕昆虫为食。飞翔迅速，是鸟类中飞行速度较快的一种。灰喉针尾雨燕嗜吃蚊、蝇等害虫，对人类有益。

凤头雨燕 FENG TOU YU YAN

雨燕目 凤头雨燕科

国内分布于云南西部及南部。

凤头雨燕雄鸟，头具羽冠；尾长达11.8厘米，深叉状。凤头雨燕集群飞翔于林区低海拔地区上空，以蚊、蛾类等昆虫为食，是食虫益鸟。

橙胸咬鹃 CHENG XIONG YAO JUAN

咬鹃目 咬鹃科

国内分布于云南省南部。数量十分稀少。国外分布于中南半岛及印度尼西亚。

橙胸咬鹃体长约28厘米。栖息在竹和阔叶树的混交林中，单个或成对活动，平时多隐匿在比较阴暗的场所。以昆虫和果实为食，善于飞捕昆虫，是食虫益鸟。在树洞中筑巢。

蓝耳翠鸟 LAN ER CUI NIAO 137

佛法僧目 翠鸟科

国内分布于云南省。

蓝耳翠鸟常栖息在山地溪流、水塘附近的树枝上。密切注视水里鱼的动静，一发现猎物立即俯冲而下，用利嘴捕猎。蓝耳翠鸟有时鼓动双翅，能像直升飞机那样停悬于水面上空，发现鱼的踪迹立即俯冲下去捕食。食物以鱼类为主，也啄食虾、软体动物、水生昆虫等。

鹳嘴翠鸟 GUAN ZUI CUI NIAO

佛法僧目 翠鸟科 别名：鹳嘴翡翠

国内分布于云南省。

鹳嘴翠鸟的嘴粗壮似鹳嘴，因而得名鹳嘴翠鸟。栖息在林中溪涧、农田地池塘、开阔的沼泽地带。喜站于河边高树上，伺机捕捉水中的鱼、虾和蛙，也吃鼠类。经常贴近水面直线飞行，并发出“唧唧”的鸣声。

黑胸蜂虎 HEI XIONG FENG HU

佛法僧目 蜂虎科

国内仅分布于云南、广西。

蜂虎科鸟类体型较小，羽色艳丽，嘴尖而细长。这类鸟主要以昆虫为食，尤其嗜食蜂类，故得名“蜂虎”。

黑胸蜂虎栖息在热带和亚热带的开阔地区和林地边缘。喜结群活动。以空中飞虫为食。

绿喉蜂虎 Lii HOU FENG HU

佛法僧目 蜂虎科

国内仅分布于云南、广西、海南。

分布在我国的蜂虎有6种，由于黑胸蜂虎和绿喉蜂虎分布区狭窄、数量稀少而被列为国家二级保护动物。

绿喉蜂虎栖于开阔田野、河岸、林间空地，捕食空中飞虫。喜集群活动。在土隙中做巢。

犀鸟科（所有种） 138

犀鸟科属于佛法僧目。本科共有46种，分布于亚洲、非洲的热带和亚热带地区。分布于我国的犀鸟科鸟有白喉犀鸟、棕颈犀鸟、花冠皱盔犀鸟、冠斑犀鸟、双角犀鸟。分别介绍如下。

白喉犀鸟 BAI HOU XI NIAO

别名：褐犀鸟

国内仅分布于云南西南部，数量稀少。白喉犀鸟的主要特征是：盔突形小而侧扁。栖息在热带、亚热带常绿阔叶林中，秋冬季数十只结群活动，有时与其他种犀鸟混群。觅食几乎都在树上，主要以榕树果、核果、浆果为食，也吃昆虫、蛙和蜥蜴等。

棕颈犀鸟 ZONG JING XI NIAO

别名：无斑犀鸟

国内分布于云南西南部和西藏东南部，数量稀少。棕颈犀鸟的主要特征是：无盔突，仅在嘴基具几条斜棱。栖息在海拔600～1800米的常绿林中，多单个活动，有时结成小群，食物以榕树果等肉质丰富的果实为主。飞行时十分壮观，在地面行走时显得笨拙。性机警，不易接近。

花冠皱盔犀鸟 HUA GUAN ZHOU KUI XI NIAO

标本采自云南西南部，西藏东南部也可能有分布。全长105厘米。雌雄两性的背、两翼及腹部均为黑色。照片上的为雌鸟，雄鸟头部奶白色，枕部具略红的丝状羽，裸出的喉囊上具明显的黑色条纹。成对或结小群活动于森林的上部。

冠斑犀鸟 GUAN BAN XI NIAO 139

别名：斑犀鸟

国内分布于云南西部和西南部、西藏东南部及广西西南部。

冠斑犀鸟的主要特征是：盔突发达且侧扁，向前仅有一突起。栖息在常绿阔叶林中及林缘。多结小群活动。主要采食多肉质果实，嗜食榕树果，有时也下地觅食落果和昆虫等。性极机警，稍有声响，立即飞走。飞行时两翅平展，头、颈前伸，酷似飞机，所以当地人又叫它“飞机鸟”。

双角犀鸟 SHUANG JIAO XI NIAO

别名：大斑犀鸟

国内分布于云南西南部，数量稀少。双角犀鸟是见于我国的5种犀鸟中体型最大的，体长约130厘米。本种的主要特征是：盔突发达而宽阔，上面凹入，向前突成两角状。栖息在沟谷林地和森林的上层。常数只结群，在高大的榕树上活动、觅食。当果实大量成熟时，可结成30多只的大群。偶尔下地啄食落果和昆虫、蛇、蜥蜴及鼠类等。每天落日前，它们相继飞到枝叶繁茂的大树顶上过夜。

犀鸟的繁殖习性很奇特，繁殖期间雌鸟选择高大树木上的树洞，进入洞后用自己的排泄物混合木屑、果实等堆在洞口，雄鸟在外面用湿泥等封闭洞口，混成的材料干燥后非常坚固，中间留一垂直裂缝式的小孔，被封在树洞中的雌鸟通过小孔接受雄鸟采回的食物。直到雏鸟快要出飞的时候，雌鸟才破洞而出。

—● 白腹黑啄木鸟 BAI FU HEI ZHUO MU NIAO

鸮形目 啄木鸟科

啄木鸟科共有212种，除澳洲地区外，世界各地都有分布。我国有28种，分布于全国各地。啄木鸟为啄木鸟科各种类的通称。啄木鸟为树栖攀禽；具对趾型足（第二三趾向前，第一四趾向后）；喙强直尖锐，可用以凿开树皮；舌细长，能伸缩，尖端列生短钩，适于钩食树木内的蛀虫，为著名森林益鸟；尾呈楔形，羽轴粗硬，攀缘时可以支撑身体。

白腹黑啄木鸟在我国分布于四川、云南等省。数量稀少。白腹黑啄木鸟常栖于山地森林，以甲虫等昆虫为食。营巢于树洞中，每窝产卵多为4枚。数量稀少。

八色鸫科（所有种）

雀形目 八色鸫科

全世界有八色鸫科鸟类25种，我国有8种，简介如下：

蓝枕八色鸫分布于云南、广西等省区。蓝背八色鸫分布于云南、广西、海南等省区。蓝翅八色鸫分布于山东以南沿海各省，在我国大部为迁徙鸟。蓝八色鸫、马来八色鸫、绿胸八色鸫、栗头八色鸫和双辫八色鸫分布于云南。

—● 蓝枕八色鸫 LAN ZHEN BA SE DONG

栖息在海拔700米以下的常绿阔叶林内，食物以昆虫为主。

—● 蓝背八色鸫 LAN BEI BA SE DONG

栖息在常绿阔叶林中，食物以昆虫为主。

蓝八色鸫 LAN BA SE DONG

栖息在海拔700～1000米的热带雨林中，多单个活动，在阴湿的林下灌木及草丛中觅食，食物为昆虫及小动物。

蓝翅八色鸫 LAN CHI BA SE DONG

别名：仙八色鸫

栖息在平原至低山的次生阔叶林内，多在灌木下的草丛间单独活动，以昆虫为食。数量稀少，但在我国分布范围相对较大，是八色鸫中较常见的一种。

马来八色鸫 MA LAI BA SE DONG

栖息在海拔600～800米的常绿阔叶林中，食物以昆虫为主。

绿胸八色鸫 Lü XIONG BA SE DONG

栖息在海拔700～1300米的常绿阔叶林中，食物以昆虫为主。

栗头八色鸫 LI TOU BA SE DONG

栖息在海拔1800米以下的常绿阔叶林中，食物以昆虫为主。

双辫八色鸫 SHUANG BIAN BA SE DONG

栖息在海拔600～2000米的常绿阔叶林、竹林及灌丛间，多在林间开阔地及灌丛附近活动，食物以昆虫为主。

阔嘴鸟科（所有种） 141

雀形目 阔嘴鸟科

阔嘴鸟科共有14种，我国有2种。现分别介绍如下：

—● 银胸丝冠鸟 YIN XIONG SI GUAN NIAO

国内分布于云南、广西等省区。

银胸丝冠鸟栖息在热带、亚热带地区森林中，也见于林缘溪流或村寨边的小树上。多结群静栖，不善跳跃和鸣叫。以捕食昆虫为主，昆虫占食量的90%以上，也啄食植物的果实和种子。

—● 长尾阔嘴鸟 CHANG WEI KUO ZUI NIAO

国内分布于云南、广西等省区。

长尾阔嘴鸟栖息在热带常绿阔叶林中，常数十只结群活动，多静栖在林下阴湿处的灌木或小树上，不善鸣叫跳跃。食物以昆虫和其他节肢动物为主。每年春末夏初繁殖，营巢于溪流边的灌丛和矮树上，巢形呈梨形，每窝产卵4～5枚。

—● 地龟 DI GUI

龟鳖目 龟科 别名：金龟、泥龟

国内分布于湖南、广东、广西、海南等省区。国外分布于日本及东南亚一带。地龟背甲长11～12厘米，宽约8厘米。头较小，头顶平滑，上颌略钩曲；背甲有三条纵棱，腹甲大，指、趾基部稍具蹼；尾短。地龟属半水栖类型，有的生活在溪流里，也有的生活在山区树木丛生的地方。6～8月产卵，每次产卵4～6枚。

—● 三线闭壳龟 SAN XIAN BI KE GU

龟鳖目 龟科 别名：红肚龟、金钱龟、金头龟

闭壳龟名称的由来，是因其腹甲与背甲两侧由韧带相连，腹甲中间有横贯的韧带，可活动。遇危险时，头、尾和四肢缩入两甲中间，由腹甲前后部分向上闭合，故称闭壳龟。闭壳龟生活在丘陵和山区的河流附近。以小鱼、虾、螺类和蚯蚓等为食。闭壳龟共5种，我国有4种，即三线闭壳龟、云南闭壳龟、

海南闭壳龟和黄缘闭壳龟。其中黄缘闭壳龟分布较广。

三线闭壳龟在我国分布于福建、广东、广西、海南等省区。三线闭壳龟栖于山谷溪流中，垂直分布在50～400米范围内。

云南闭壳龟 YUN NAN BI KE GUI

龟鳖目 龟科

国内分布于云南省。云南闭壳龟腹甲与背甲几乎等长，背腹甲两侧以韧带相连。龟甲能闭合，但不能完全盖满与背甲间的空隙。前肢5指，后肢4趾，指、趾间具全蹼；指、趾端有弯曲锐利的爪。云南闭壳龟栖息在海拔较高有水的地方。

凹甲陆龟 AO JIA LU GUI

龟鳖目 陆龟科

国内分布于云南、海南等省。国外分布于缅甸、泰国、越南、马来西亚等地。我国得到第一只凹甲陆龟，是在1964年夏天，于海南省海口市野生动物购销部得到的。其背甲长21.2厘米，背甲宽15.1厘米，壳高8.9厘米。凹甲陆龟与我国目前已发现的陆龟之主要区别为：凹甲陆龟与缅甸陆龟（在我国分布于广西、云南等省区）虽然前肢均为五爪，但其臂角板数不同（缅甸陆龟的臂角板仅一枚）；四爪陆龟的后肢则为四爪。

蠵龟 XI GUI

龟鳖目 海龟科 别名：赤蠵龟、灵蠵、灵龟、红海龟

分布于我国南海、东海、黄海，以及太平洋、印度洋的热带、亚热带海域中。

蠵龟体型较大，背甲长约100厘米，宽约70厘米，体重达100千克以上。蠵龟栖息在海洋中，以鱼类、甲壳类及软体动物为食。在岩礁附近交配，多于4～8月产卵，产卵前用后肢在海滩上扒沙做穴，穴深33～66厘米，每次产卵60～150枚。卵为白色，球形，卵径约4厘米。孵化时间随繁殖季节、卵穴位置而有不同，一般孵化期为两个月左右。

绿海龟 Lü HAI GUI

龟鳖目 海龟科

绿海龟分布于南太平洋和印度洋，国内分布于北起山东沿海，南至广东沿海各省及台湾、海南等省，南海诸岛尤多。

绿海龟体长约100～130厘米，体重100千克以上。绿海龟生活在热带和亚热带的海洋中，每年按回游路线在近海沿岸的海水上层活动。以鱼、软体动物、甲壳类及海藻为食。性情温和，不大结群。每年4～10月是绿海龟的繁殖季节，雌龟在夜里或清晨爬上沙滩产卵，每次产卵100～150枚，借阳光孵化50～80天后幼龟破壳而出，钻出沙层爬回大海。

玳瑁 DAI MAO

龟鳖目 海龟科 别名：十三鲮龟、文甲



玳瑁分布于热带及亚热带海域的大西洋、南太平洋、印度洋。国内分布于北起山东沿海，南至广东、广西沿海各省区及海南、台湾等省，南海诸岛较多。

玳瑁体长约60～74厘米，最大可达84厘米。玳瑁生活在热带和亚热带沿海，每年按一定的路线回游。其性情强暴，以海生动物为食，主要吃鱼、虾、蟹和软体动物等，也吃海藻。玳瑁的繁殖习性与绿海龟相近。玳瑁的背甲早在我国宋代《开宝本草》中便有入药的记载。至于用作工艺品原料，则更有悠久历史。

—● 太平洋丽龟 TAI PING YANG LI GUI

龟鳖目 海龟科 别名：丽龟、海龟

分布于太平洋、印度洋及大西洋。国内分布于江苏、浙江、福建、广东、广西、海南、台湾等省区沿海及南海诸岛。

太平洋丽龟是海龟类中最小的一种，栖息在温水浅海中，主要捕食底栖或漂浮的甲壳动物、软体动物、鱼类、水母和其他无脊椎动物，雌龟在每年9月至翌年1月集群上岸产卵，每次产卵90～135枚，经50～60天自然孵化。

—● 棱皮龟 LING PI GUI

龟鳖目 棱皮龟科 别名：舢板龟、革背龟、七棱皮龟

分布于太平洋、印度洋、大西洋的热带、亚热带海域中，偶见于温带海域。国内分布于辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南、台湾等省区沿海及南海诸岛。

棱皮龟是现存龟鳖类中最大的一种，成年龟体长200～230厘米，据说最大的体长250厘米，体重达800千克。棱皮龟栖息在热带和亚热带沿海地区。以虾、蟹、软体动物、腔肠动物、棘皮动物、鱼等为食，也吃海藻类等植物性食物。

—● 山瑞鳖 SHAN RUI BIE

龟鳖目 鳖科 别名：山瑞

国内分布于云南、贵州、广东、广西等省区，国外主要分布于越南。

山瑞鳖与鳖形态相似，但体型较大，体长约40～50厘米。山瑞鳖栖息在江河、湖泊、池塘和较大的

山溪中。白天喜出水晒太阳，夜间上岸活动。以鱼、虾、泥鳅、螺类、蚯蚓等为食，也吃些水生草类。有一首民谣形象地概括了山瑞鳖的习性："春天发水走上滩，夏日炎炎柳荫潜，秋天凉了入石洞，冬季寒冷钻深潭。"山瑞鳖每年11月至次年3月为冬眠期。

大壁虎 DA BI HU

蜥蜴目 壁虎科 别名：蛤蚧、多格、蛤蟹

国内分布于云南、福建、广东、广西、台湾等省区。国外分布于印度、中南半岛、印度尼西亚等地。

大壁虎全长约30～34厘米。大壁虎栖息在山岩石缝间或树洞中，也生活在人类的住宅里或居住区附近。它是夜行性动物，在黄昏时和夜间最活跃，白天和清晨也有时会见到它在岩石或墙壁上晒太阳。它主要捕食昆虫，也吃其他小型脊椎动物，如鼠、蜥蜴和鸟。东南亚一带产大壁虎地区的居民认为它是运气好的象征，这在客观上起到了保护大壁虎的作用。

大鲵 DA NI

有尾目 隐鳃鲵科 别名：娃娃鱼

大鲵是我国特产，在我国分布较广，黄河、长江和珠江中上游支流的17个省区均有分布，其中以陕西、江西、湖北、湖南、四川、贵州数量较多。

大鲵是现存最大的两栖动物，全长约1米。大鲵栖息在海拔200～1000米的水质清澈、水温低、深潭较多的溪流中，其中在海拔300～500米的区域内数量较多。往往独居岩洞、土窟内，昼伏夜出。大鲵性凶猛，肉食性，主要吃水生昆虫、虾、泽蟹、鱼、蛙、蛇、小鳖、鼠、鸟等。

虎纹蛙 HU WEN WA

无尾目 蛙科

虎纹蛙在我国分布较广。

虎纹蛙雌蛙比雄蛙大，大的雌蛙，体长可超过12厘米，体重可达250克。虎纹蛙是稻田中个体最大的一种蛙，也是南方稻田消灭害虫的主要蛙种之一。由于遭到人们的大肆捕杀，虎纹蛙野生数量日益减少，亟待加强保护。

疣螈 YOU YUAN

有尾目 蝾螈科

我国受保护的疣螈有5种，即细痣疣螈、镇海疣螈、贵州疣螈、大凉疣螈和红瘰疣螈。分别介绍如下：

细痣疣螈 XI ZHI YOU YUAN

别名：山腊猎

国内分布于甘肃、四川、贵州、广西、广东、海南等省区。体长约13～14厘米。它的皮肤粗糙，有大的疣粒，似细痣，由此得名。主要生活在陆地上，5～6月交配时进入静水池。

镇海疣螈 ZHEN HAI YOU YUAN

别名：山壁虎

仅分布于浙江省镇海，为珍稀动物。栖息在海拔100～200米的沿海丘陵山脚旁，多见于阴暗潮湿、土质松软的泥土下或石隙中，在地面爬行缓慢，以蚯蚓、马陆、蜈蚣、步行虫、蜗牛等为食。

贵州疣螈 GUI ZHOU YOU YUAN

别名：土蛤蚧

分布于贵州。栖息在海拔1500～2000米山区溪流的水塘中，多雌雄成对在一起，喜欢在闷热天气活动，天气晴朗时隐匿暗处，晚间也见活动。主要猎食昆虫。

大凉疣螈 DA LIANG YOU YUAN

分布于四川省大凉山区。其头宽大，皮肤粗糙，散布大小疣粒，腹面密布细横皱纹，四肢长而粗。5～6月繁殖，此间大量出现在缓流溪沟或静水洼地。每只产卵200枚以上。

红瘰疣螈 HONG LUO YOU YUAN

别名：细瘰疣螈

国内分布于云南。体型粗壮，躯干较圆，尾部侧扁。全身满布疣粒。背部和体侧棕黑色，仅疣粒红色，故名红瘰疣螈。栖息在海拔1000～2000米的丛林地区，陆生。5～6月在静水塘内交配产卵。

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
兽　纲　MAMMALIA			
灵长目	PRIMATES		
懒猴科	Lorisidae		
蜂　猴（所有种）	*Nycticebus spp.*	一	
猴　科	Cercopithecidae		
短尾猴	*Macaca arctoides*		二
熊　猴	*Macaca assamensis*	一	
台湾猴	*Macaca cyclopis*	一	
猕　猴	*Macaca mulatta*		二
豚尾猴	*Macaca nemestrina*	一	
藏酋猴	*Macaca thibetana*		二
叶　猴（所有种）	*Presbytis spp.*	一	
金丝猴（所有种）	*Rhinopithecus spp.*	一	
长臂猿科	Pongidae		
长臂猿（所有种）	*Hylobates spp.*	一	
鳞甲目	PHOLIDOTA		
鲮鲤科	Manidae		
穿山甲	*Manis pentadactyla*		二
食肉目	CARNIVORA		
犬　科	Canidae		
豺	*Cuon alpinus*		二
熊　科	Ursidae		
黑　熊	*Selenarctos thibetanus*		二
棕　熊	*Ursus arctos*		二
（包括马熊）	*(U.a.pruinosus)*		
马来熊	*Helarctos malayanus*	一	
浣熊科	Procyonidae		
小熊猫	*Ailurus fulgens*		二
大熊猫科	Ailuropodidae		
大熊猫	*Ailuropoda melanoleuca*	一	
鼬　科	Mustelidae		
石　貂	*Martes foina*		二
紫　貂	*Martes zibellina*	一	
黄喉貂	*Martes flavigula*		二
貂　熊	*Gulo gulo*	一	

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
＊水　獭（所有种）	*Lutra spp.*		二
＊小爪水獭	*Aonyx cinerea*		二
灵猫科	Viverridae		
斑林狸	*Prionodon pardicolor*		二
大灵猫	*Viverra zibetha*		二
小灵猫	*Viverricula indica*		二
熊　狸	*Arctictis binturong*	一	
猫　科	Felidae		
草原斑猫	*Felis silvestris*		二
荒漠猫	*Felis bieti*		二
丛林猫	*Felis chaus*		二
猞　猁	*Felis lynx*		二
兔　狲	*Felis manul*		二
金　猫	*Felis temmincki*		二
渔　猫	*Felis viverrinus*		二
云　豹	*Neofelis nebulosa*	一	
豹	*Panthera pardus*	一	
虎	*Panthera tigris*	一	
雪　豹	*Panthera uncia*	一	
＊鳍足目（所有种）	PINNIPEDIA		二
海牛目	SIRENIA		
儒艮科	Dugongidae		
＊儒　艮	*Dugong dugong*	一	
鲸　目	CETACEA		
喙豚科	Platanistidae		
＊白暨豚	*Lipotes vexillifer*	一	
海豚科	Delphinidae		
＊中华白海豚	*Sousa chinensis*	一	
＊其他鲸类	(Catacea)		二
长鼻目	PROBOSCIDEA		
象　科	Elephantidae		
亚洲象	*Elephas maximus*	一	

国家重点保护野生动物

名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
奇蹄目	PERISSODACTYLA		
马　科	Equidae		
蒙古野驴	*Equus hemionus*	一	
西藏野驴	*Equus kiang*	一	
野　马	*Equus przewalskii*	一	
偶蹄目	ARTIODACTYLA		
驼　科	Camelidae		
野骆驼	*Camelus bactrianus*	一	
鼷鹿科	Tragulidae		
鼷　鹿	*Tragulus javanicus*	一	
麝　科	Moschidae		
麝（所有种）	*Moschus spp.*		二
鹿　科	Cervidae		
河　鹿	*Hydropotes inermis*		二
黑　鹿	*Muntiacus crinifrons*	一	
白唇鹿	*Cervus albirostris*	一	
马　鹿	*Cervus elaphus*		二
（包括白臀鹿）	*(C.e.macneilli)*		
坡　鹿	*Cervus eldi*	一	
梅花鹿	*Cervus nippon*	一	
豚　鹿	*Axis porcinus*	一	
水　鹿	*Cervus unicolor*		二
麋　鹿	*Elaphurus davidianus*	一	
驼　鹿	*Alces alces*		二
牛　科	Bovidae		
野　牛	*Bos gaurus*	一	
野牦牛	*Bos grunniens*	一	
黄　羊	*Procapra gutturosa*		二
普氏原羚	*Procapra przewalskii*	一	
藏原羚	*Procapra picticaudata*		二
鹅喉羚	*Gazella subgutturosa*		二
藏　羚	*Pantholops hodgsoni*	一	
高鼻羚羊	*Saiga tatarica*	一	
扭角羚	*Budorcas taxicolor*	一	
鬣　羚	*Capricornis sumatraensis*		二
台湾鬣羚	*Capricornis crispus*	一	
赤斑羚	*Naemorhedus baileyi*	一	

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
斑　羚	*Naemorhedus goral*		二
塔尔羊	*Hemitragus jemlahicus*	一	
北山羊	*Capra ibex*	一	
岩　羊	*Pseudois nayaur*		二
盘　羊	*Ovis ammon*		二
兔形目	LAGOMORPHA		
兔　科	Leporidae		
海南兔	*Lepus peguensis hainanus*		二
雪　兔	*Lepus timidus*		二
塔里木兔	*Lepus yarkandensis*		二
啮齿目	RODENTIA		
松鼠科	Sciuridae		
巨松鼠	*Ratufa bicolor*		二
河狸科	Castoridae		
河　狸	*Castor fiber*	一	
鸟　纲　AVES			
鸊鷉目	PODICIPEDIFORMES		
鸊鷉科	podicipedidae		
角鸊鷉	*Podiceps auritus*		二
赤颈鸊鷉	*Podiceps grisegena*		二
鹱形目	PROCELLARIIFORMES		
信天翁科	Diomedeidae		
短尾信天翁	*Diomedea albatrus*	一	
鹈形目	PELECANIFORMES		
鹈鹕科	Pelecanidae		
鹈　鹕（所有种）	*Pelecanus spp.*		二
鲣鸟科	Sulidae		
鲣　鸟（所有种）	*Sula spp.*		二
鸬鹚科	Phalacrocoracidae		
海鸬鹚	*Phalacrocorax pelagicus*		二
黑颈鸬鹚	*Phalacrocorax niger*		二
军舰鸟科	Fregatidae		
白腹军舰鸟	*Fregata andrewsi*	一	

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
鹳形目	CICONIIFORMES		
鹭　科	Ardeidae		
黄嘴白鹭	*Egretta eulo photes*		▁
岩　鹭	*Egretta sacra*		▁
海南虎斑鸦	*Gorsachius magnificus*		▁
小苇鸦	*Ixobrychus minutus*		▁
鹳　科	Ciconiidae		
彩　鹳	*Mycteria Leucocephala*		▁
白　鹳	*Ciconia ciconia*	▁	
黑　鹳	*Ciconia nigra*	▁	
鹮　科	Threskiornithidae		
白　鹮	*Threskiornis aethiopicus*		▁
黑　鹮	*Pseudibis papillosa*		▁
朱　鹮	*Nipponia nippon*	▁	
彩　鹮	*Plegadis falcinellus*		▁
白琵鹭	*Platalea leucorodia*		▁
黑脸琵鹭	*Platalea minor*		▁
雁形目	ANSERIFORMES		
鸭　科	Anatidae		
红胸黑雁	*Branta ruficollis*		▁
白额雁	*Anser albifrons*		▁
天　鹅（所有种）	*Cygnus spp.*		▁
鸳　鸯	*Aix galericulata*		▁
中华秋沙鸭	*Mergus squamatus*	▁	
隼形目	FALCONIFORMES		
鹰　科	Accipitridae		
金　雕	*Aquila chrysaetos*	▁	
白肩雕	*Aquila heliaca*	▁	
玉带海雕	*Haliaeetus leueoryphus*	▁	
白尾海雕	*Haliaeetus albicilla*	▁	
虎头海雕	*Haliaeetus pelagicus*	▁	
白背兀鹫	*Pseudogyps bengalensis*	▁	
胡兀鹫	*Gypaetus barbatus*	▁	
其他鹰类	(Accipitridae)		▁
隼　科(所有种)	Falconidae		▁

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
鸡形目	GALLIFORMES		
松鸡科	Tetraonidae		
细嘴松鸡	*Tetrao parvirostris*	—	
黑琴鸡	*Lyrurus tetrix*		—
柳雷鸟	*Lagopus lagopus*		—
岩雷鸟	*Lagopus mutus*		—
镰翅鸡	*Falcipennis falcipennis*		—
花尾榛鸡	*Tetrastes bonasia*		—
斑尾榛鸡	*Tetrastes sewerzowi*	—	
雉　科	Phasianidae		
雪　鸡(所有种)	*Tetraogallus spp.*		—
雉　鹑	*Tetraophasis obscurus*	—	
四川山鹧鸪	*Arborophila rufipectus*	—	
海南山鹧鸪	*Arborophila ardens*	—	
血　雉	*Ithaginis cruentus*		—
黑头角雉	*Tragopan melanocephalus*	—	
红胸角雉	*Tragopan satyra*	—	
灰腹角雉	*Tragopan blythii*	—	
红腹角雉	*Tragopan temminckii*		—
黄腹角雉	*Tragopan caboti*	—	
虹　雉(所有种)	*lophophorus spp.*	—	
白马鸡	*Crossoptilon crossoptilon*		—
蓝马鸡	*Crossoptilon auritum*		—
褐马鸡	*Crossoptilon mantchuricum*	—	
黑　鹇	*Lophura leucomelana*		—
白　鹇	*Lophura nycthemera*		—
蓝　鹇	*Lophura swinhoii*	—	
原　鸡	*Gallus gallus*		—
勺　鸡	*Pucrasia macrolopha*		—
黑颈长尾雉	*Syrmaticus humiae*	—	
白冠长尾雉	*Syrmaticus reevesii*		—
白颈长尾雉	*Syrmaticus ellioti*	—	
黑长尾雉	*Syrmaticus mikado*	—	
锦　鸡(所有种)	*Chrysolophus spp.*		—
孔雀雉	*Polyplectron bicalcaratum*	—	
绿孔雀	*Pavo muticus*	—	
鹤形目	GRUIFORMES		
鹤　科	Gruidae		

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
灰　鹤	*Grus grus*		二
黑颈鹤	*Grus nigricollis*	一	
白头鹤	*Grus monacha*	一	
沙丘鹤	*Grus canadensis*		二
丹顶鹤	*Grus japonensis*	一	
白枕鹤	*Grus vipio*		二
白　鹤	*Grus leucogeranus*	一	
赤颈鹤	*Grus antigone*	一	
蓑羽鹤	*Anthropoides virgo*		二
秧鸡科	Rallidae		
长脚秧鸡	*Crex crex*		二
姬田鸡	*Porzana parva*		二
棕背田鸡	*Porzana bicolor*		二
花田鸡	*Coturnicops noveboracensis*		二
鸨　科	Otidae		
鸨(所有种)	*Otis spp.*	一	
鸻形目	CHARADRIIFORMES		
雉鸻科	Jacanidae		
铜翅水雉	*Metopidius indicus*		二
鹬　科	Scolopacidae		
小杓鹬	*Numenius borealis*		二
小青脚鹬	*Tringa guttifer*		二
燕鸻科	Glareolidae		
灰燕鸻	*Glareola lactea*		二
鸥形目	LARIFORMES		
鸥　科	Laridae		
遗　鸥	*Larus relictus*	一	
小　鸥	*Larus minutus*		二
黑浮鸥	*Chlidonias niger*		二
黄嘴河燕鸥	*Sterna aurantia*		二
黑嘴端凤头燕鸥	*Thalasseus zimmermanni*		二
鸽形目	COLUMBIFORMES		
沙鸡科	Pteroclididae		
黑腹沙鸡	*Pterocles orientalis*		二
鸠鸽科	Columbidae		

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
绿　鸠(所有种)	*Treron spp.*		二
黑颏果鸠	*Ptilinopus leclancheri*		二
皇　鸠(所有种)	*Ducula spp.*		二
斑尾林鸽	*Columba palumbus*		二
鹃　鸠(所有种)	*Macropygia spp.*		二
鹦形目	PSITTACIFORMES		
鹦鹉科(所有种)	Psittacidae		二
鹃形目	CUCULIFORMES		
杜鹃科	Cuculidae		
鸦　鹃(所有种)	*Centropus spp.*		二
鸮形目(所有种)	STRIGIFORMES		二
雨燕目	APODIFORMES		
雨燕科	Apodidae		
灰喉针尾雨燕	*Hirundapus cochinchinensis*		二
凤头雨燕科	Hemiprocnidae		
凤头雨燕	*Hemiprocne longipennis*		二
咬鹃目	TROGONIFORMES		
咬鹃科	Trogonidae		
橙胸咬鹃	*Harpactes oreskios*		二
佛法僧目	CORACIIFORMES		
翠鸟科	Alcedinidae		
蓝耳翠鸟	*Alcedo meninting*		二
鹳嘴翠鸟	*Pelargopsis capensis*		二
蜂虎科	Meropidae		
黑胸蜂虎	*Merops leschenaulti*		二
绿喉蜂虎	*Merops orientalis*		二
犀鸟科(所有种)	Bucerotidae		二
䴕形目	PICIFORMES		
啄木鸟科	Picidae		
白腹黑啄木鸟	*Dryocopus javensis*		二

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
雀形目	PASSERIFORMES		
阔嘴鸟科(所有种)	Eurylaimidae		二
八色鸫科(所有种)	Pittidae		二
爬　行　纲　REPTILIA			
龟鳖目	TESTUDOFORMES		
龟　科	Emydidae		
＊地　龟	*Ceoemyda spengleri*		二
＊三线闭壳龟	*Cuora trifasciata*		二
＊云南闭壳龟	*Cuora yunnanensis*		二
陆龟科	Testudinidae		
四爪陆龟	*Testudo horsfieldi*	一	
凹甲陆龟	*Manouria impressa*		二
海龟科	Cheloniidae		
＊蠵　龟	*Caretta caretta*		一
＊绿海龟	*Chelonia mydas*		二
＊玳　瑁	*Eretmochelys imbricata*		二
＊太平洋丽龟	*Lepidochelys olivacea*		二
棱皮龟科	Dermochelyidae		
＊棱皮龟	*Dermochelys coriacea*		二
＊鳖　科	Trionychidae		
＊鼋	*Pelochelys bibroni*	一	
＊山瑞鳖	*Trionyx steindachneri*		二
蜥蜴目	LACERTIFORMES		
壁虎科	Gekkonidae		
大壁虎	*Gekko gecko*		二
鳄蜥科	Shinisauridae		
鳄　蜥	*Shinisaurus crocodilurus*	一	
巨蜥科	Varanidae		
巨　蜥	*Varanus salvator*	一	
蛇亚目	SERPENTIFORMES		
蟒　科	Boidae		
蟒	*Python molurus*	一	
鳄　目	CROCODILIFORMES		
鼍　科	Alligatoridae		
扬子鳄	*Alligator sinensis*	一	

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
两　栖　纲　AMPHIBIA			
有尾目	CAUDATA		
隐鳃鲵科	Cryptobranchidae		
＊大　鲵	*Andrias davidianus*		二
蝾螈科	Salamandridae		
＊细痣疣螈	*Tylototriton asperrimus*		二
＊镇海疣螈	*Tylototriton chinhaiensis*		二
＊贵州疣螈	*Tylototriton kweichowensis*		二
＊大凉疣螈	*Tylototriton taliangensis*		二
＊红瘰疣螈	*Tylototriton verrucosus*		二
无尾目	ANURA		
蛙　科	Ranidae		
虎纹蛙	*Rana tigrina*		二
鱼　纲　PISCES			
鲈形目	PERCIFORNES		
石首鱼科	Sciaenidae		
＊黄唇鱼	*Bahaba flavolabiata*		二
杜父鱼科	Cottidae		
＊松江鲈鱼	*Trachidermus fasciatus*		二
海龙鱼目	SYNGNATHIFORMES		
海龙鱼科	Syngnathidae		
＊克氏海马鱼	*Hippocampus kelloggi*		二
鲤形目	CYPRINIFORMES		
胭脂鱼科	Catostomidae		
＊胭脂鱼	*Myxocyprinus asiaticus*		二
鲤　科	Cyprinidae		
＊唐　鱼	*Tanichthys albonubes*		二
＊大头鲤	*Cyprinus pellegrini*		二
＊金线鲃	*Sinocyclocheilus grahami grahami*		二
＊新疆大头鱼	*Aspiorhynchus laticeps*	一	
＊大理裂腹鱼	*Schizothorax taliensis*		二
鳗鲡目	ANGUILLIFOMES		

国家重点保护野生动物

名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
鳗鲡科	Anguillidae		
＊花鳗鲡	*Anguilla marmorata*		二
鲑形目	SALMONIFORMES		
鲑　科	Salmonidae		
＊川陕哲罗鲑	*Hucho bleekeri*		二
＊秦岭细鳞鲑	*Brachymystax lenok tsinlingensis*		二
鲟形目	ACIPENSERIFORMES		
鲟　科	Acipenseridae		
＊中华鲟	*Acipenser sinensis*	一	
＊达氏鲟	*Acipenser dabryanus*	一	
匙吻鲟科	Polyodontidae		
＊白　鲟	*Psephurus gladius*	一	
文昌鱼纲　APPENDICULARIA			
文昌鱼目	AMPHIOXIFORMES		
文昌鱼科	Branchiostomatidae		
＊文昌鱼	*Branchiostoma belcheri*		二
珊瑚纲　ANTHOZOA			
柳珊瑚目	GORGONACEA		
红珊瑚科	Coralliidae		
＊红珊瑚	*Corallium spp.*	一	
腹足纲　GASTROPODA			
中腹足目	MESOGASTROPODA		
宝贝科	Cypraeidae		
＊虎斑宝贝	*Cypraea tigris*		二
冠螺科	Cassididae		
＊冠　螺	*Cassis cornuta*		二

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
瓣鳃纲　LAMELLIBRANCHIA			
异柱目	ANISOMYARIA		
珍珠贝科	Pteriidae		
＊大珠母贝	*Pinctada maxima*		二
真瓣鳃目	EULAMELLIBRANCHIA		
砗磲科	Tridacnidae		
＊库氏砗磲	*Tridacna cookiana*	一	
蚌　科	Unionidae		
＊佛耳丽蚌	*Lamprotula mansuyi*		二
头足纲　CEPHALOPODA			
四鳃目	TETRABRANCHIA		
鹦鹉螺科	Nautilidae		
＊鹦鹉螺	*Nautilus pompilius*	一	
昆虫纲　INSECTA			
双尾目	DIPLURA		
铗虮科	Japygidae		
伟铗虮	*Atlasjapyx atlas*		二
蜻蜓目	ODONATA		
箭蜓科	Gomphidae		
尖板曦箭蜓	*Heliogomphus retroflexus*		二
宽纹北箭蜓	*Ophiogomphus spinicorne*		二
缺翅目	ZORAPTERA		
缺翅虫科	*Zorotypidae*		
中华缺翅虫	*Zorotypus sinensis*		二
墨脱缺翅虫	*Zorotypus medoensis*		二

国家重点保护野生动物名录

中　名	学　名	保护级别	
		一级	二级
蛩蠊目	GRYLLOBLATTODEA		
蛩蠊科	Grylloblattidae		
中华蛩蠊	*Galloisiana sinensis*	一	
鞘翅目	COLEOPTERA		
步甲科	Carabidae		
拉步甲	*Carabus(Coptolabrus) lafossei*		二
硕步甲	*Carabus(Apotopterus) davidi*		二
臂金龟科	Euchiridae		
彩臂金龟(所有种)	*Cheirotonus spp.*		二
犀金龟科	Dynastidae		
叉犀金龟	*Allomyrina davidis*		二
鳞翅目	LEPIDOPTERA		
凤蝶科	Papilionidae		
金斑喙凤蝶	*Teinopalpus aureus*	一	
双尾褐凤蝶	*Bhutanitis mansfieldi*		二
三尾褐凤蝶	*Bhutanitis thaidina dongchuanensis*		二
中华虎凤蝶	*Luehdorfia chinensis huashanensis*		二
绢蝶科	Parnassidae		
阿波罗绢蝶	*Parnassius apollo*		二
肠鳃纲	ENTEROPNEUSTA		
柱头虫科	Balanoglossidae		
*多鳃孔舌形虫	*Glossobalanus polybranchioporus*	一	
玉钩虫科	Harrimaniidae		
*黄岛长吻虫	*Saccoglossus hwangtauensis*	一	

注：标“*”者，由渔业行政管理部门主管；未标“*”者，由林业行政管理部门主管。

中华人民共和国野生动物保护法

第一章 总 则

第一条 为保护、拯救珍贵、濒危野生动物，保护、发展和合理利用野生动物资源，维护生态平衡，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内从事野生动物的保护、驯养繁殖、开发利用活动，必须遵守本法。

本法规定保护的野生动物，是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。

本法各条款所提野生动物，均系指前款规定的受保护的野生动物。

珍贵、濒危的水生野生动物以外的其他水生野生动物的保护，适用渔业法的规定。

第三条 野生动物资源属于国家所有。

国家保护依法开发利用野生动物资源的单位和个人的合法权益。

第四条 国家对野生动物实行加强资源保护、积极驯养繁殖、合理开发利用的方针，鼓励开展野生动物科学研究。

在野生动物资源保护、科学研究和驯养繁殖方面成绩显著的单位和个人，由政府给予奖励。

第五条 中华人民共和国公民有保护野生动物资源的义务，对侵占或者破坏野生动物资源的行为有权检举和控告。

第六条 各级政府应当加强对野生动物资源的管理，制定保护、发展和合理利用野生动物资源的规划和措施。

第七条 国务院林业，渔业行政主管部门分别主管全国陆生、水生野生动物管理工作。

省、自治区、直辖市政府林业行政主管部门主管本行政区域内陆生野生动物管理工作。自治州、县和市政府陆生野生动物管理工作的行政主管部门，由省、自治区、直辖市政府确定。

县级以上地方政府渔业行政主管部门主管本行政区域内水生野生动物管理工作。

第二章 野生动物保护

第八条 国家保护野生动物及其生存环境，禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏。

第九条 国家对珍贵、濒危的野生动物实行重点保护。国家重点保护的野生动物分为一级保护野生动物和二级保护野生动物。国家重点保护的野生动物名录及其调整，由国务院野

生动物行政主管部门制定，报国务院批准公布。

地方重点保护野生动物，是指国家重点保护野生动物以外，由省、自治区、直辖市重点保护的野生动物。地方重点保护的野生动物名录，由省、自治区、直辖市政府制定并公布，报国务院备案。

国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录及其调整，由国务院野生动物行政主管部门制定并公布。

第十条 国务院野生动物行政主管部门和省、自治区、直辖市政府，应当在国家和地方重点保护野生动物的主要生息繁衍的地区和水域，划定自然保护区，加强对国家和地方重点保护野生动物及其生存环境的保护管理。

自然保护区的划定和管理，按照国务院有关规定办理。

第十一条 各级野生动物行政主管部门应当监视、监测环境对野生动物的影响。由于环境影响对野生动物造成危害时，野生动物行政主管部门应当会同有关部门进行调查处理。

第十二条 建设项目对国家或者地方重点保护野生动物的生存环境产生不利影响的，建设单位应当提交环境影响报告书；环境保护部门在审批时，应当征求同级野生动物行政主管部门的意见。

第十三条 国家和地方重点保护野生动物受到自然灾害威胁时，当地政府应当及时采取拯救措施。

第十四条 因保护国家和地方重点保护野生动物，造成农作物或者其他损失的，由当地政府给予补偿。补偿办法由省、自治区、直辖市政府制定。

第三章 野生动物管理

第十五条 野生动物行政主管部门应当定期组织对野生动物资源的调查，建立野生动物资源档案。

第十六条 禁止猎捕，杀害国家重点保护野生动物，因科学研究、驯养繁殖、展览或者其他特殊情况，需要捕捉、捕捞国家一级保护野生动物的，必须向国务院野生动物行政主管部门申请特许猎捕证；猎捕国家二级保护野生动物的，必须向省、自治区、直辖市政府野生动物行政主管部门申请特许猎捕证。

第十七条 国家鼓励驯养繁殖野生动物。

驯养繁殖国家重点保护野生动物的，应当持有许可证。许可证的管理办法由国务院野生动物行政主管部门制定。

第十八条 猎捕非国家重点保护野生动物的，必须取得狩猎证，并且服从猎捕量限额管理。

持枪猎捕的，必须取得县、市公安机关核发的持枪证。

第十九条 猎捕者应当按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量、地点和期限进行猎捕。

第二十条 在自然保护区、禁猎区和禁猎期内，禁止猎捕和其他妨碍野生动物生息繁衍的活动。

禁猎区和禁猎期以及禁止使用的猎捕工具和方法，由县级以上政府或者其野生动物行政主管部门规定。

第二十一条 禁止使用军用武器、毒药、炸药进行猎捕。

猎枪及弹具的生产、销售和使用管理办法，由国务院林业行政主管部门会同公安部门制定，报国务院批准施行。

第二十二条 禁止出售、收购国家重点保护野生动物或者其产品。因科学研究、驯养繁殖、展览等特殊情况，需要出售、收购、利用国家一级保护野生动物或者其产品的，必须经国务院野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准；需要出售、收购、利用国家二级保护野生动物或者其产品的，必须经省、自治区、直辖市政府野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准。

驯养繁殖国家重点保护野生动物的单位和个人可以凭驯养繁殖许可证向政府指定的收购单位，按照规定出售国家重点保护野生动物或者其产品。

工商行政管理部门对进入市场的野生动物或者其产品，应当进行监督管理。

第二十三条 运输、携带国家重点保护野生动物或者其产品出县境的，必须经省、自治区、直辖市政府野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准。

第二十四条 出口国家重点保护野生动物或者其产品的，进出口中国参加的国际公约所限制进出口的野生动物或者其产品的，必须经国务院野生动物行政主管部门或者国务院批准，并取得国家濒危物种进出口管理机构核发的允许进出口证明书。海关凭允许进出口证明书查验放行。

涉及科学技术保密的野生动物物种的出口，按照国务院有关规定办理。

第二十五条 禁止伪造、倒卖、转让特许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证和允许进出口证明书。

第二十六条 外国人在中国境内对国家重点保护野生动物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像，必须经国务院野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准。

建立对外国人开放的猎捕场所，必须经国务院野生动物行政主管部门批准。

第二十七条 经营利用野生动物或者其产品的，应当缴纳野生动物资源保护管理费。收费标准和办法由国务院野生动物行政主管部门会同财政、物价部门制定，报国务院批准后施行。

第二十八条 因猎捕野生动物造成农作物或者其他损失的，由猎捕者负责赔偿。

第二十九条 有关地方政府应当采取措施，预防、控制野生动物所造成的危害，保障人畜安全和农业、林业生产。

第三十条 地方重点保护野生动物和其他非国家重点保护野生动物的管理办法，由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会制定。

第四章 法律责任

第三十一条 非法捕杀国家重点保护野生动物的，依照关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定追究刑事责任。

第三十二条 违反本法规定，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法猎捕野生动物的，由野生动物行政主管部门没收猎获物、猎捕工具和违法所得，处以罚款；情节严重、构成犯罪的，依照刑法第一百三十条的规定追究刑事责任。

第三十三条 违反本法规定，未取得狩猎证或者未按狩猎证规定猎捕野生动物的，由野生动物行政主管部门没收猎获物和违法所得，处以罚款，并可以没收猎捕工具，吊销狩猎证。

违反本法规定，未取得持枪证持枪猎捕野生动物的，由公安机关比照治安管理处罚条例的规定处罚。

第三十四条 违反本法规定，在自然保护区、禁猎区破坏国家或者地方重点保护野生动物主要生息繁衍场所的，由野生动物行政主管部门责令停止破坏行为，限期恢复原状，处以罚款。

第三十五条 违反本法规定，出售、收购、运输、携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品的，由工商行政管理部门没收实物和违法所得，可以并处罚款。

违反本法规定，出售、收购国家重点保护野生动物或者其产品，情节严重、构成投机倒把罪、走私罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

没收的实物，由野生动物行政主管部门或者其授权的单位按照规定处理。

第三十六条 非法进出口野生动物或者其产品的，由海关依照海关法处罚；情节严重、构成犯罪的，依照刑法关于走私罪的规定追究刑事责任。

第三十七条 伪造、倒卖、转让特许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证或者允许进出口证明书的由野生动物行政主管部门或者工商行政管理部门吊销证件，没收违法所得，可以并处罚款。

伪造、倒卖特许猎捕证或者允许进出口证明书，情节严重、构成犯罪的，比照刑法第一百六十七条的规定

追究刑事责任。

第三十八条 野生动物行政主管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起15日内，向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议；对上一级机关的复议决定不服的，可以在接到复议决定通知之日起15日内，向法院起诉。当事人也可以在接到处罚通知之日起15日内，直接向法院起诉。当事人逾期不申请复议或者不向法院起诉又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请法院强制执行。

对海关处罚或者治安管理处罚不服的，依照海关法或者治安管理处罚条例的规定办理。

第五章 附 则

第四十条 中华人民共和国缔结或者参加的与保护野生动物有关的国际条约与本法有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。

第四十一条 国务院野生动物行政主管部门根据本法制定实施条例，报国务院批准施行。

省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会可以根据本法制定实施办法。

第四十二条 本法自1989年3月1日起施行。

附：有关法规条文

一、《刑法》有关规定

《刑法》第一百一十六条 违反海关法规，进行走私，情节严重的，除按照海关法规没收走私物品并且可以罚款外，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以并处没收财产。

《刑法》第一百一十七条 违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以并处、单处罚金或者没收财产。

《刑法》第一百一十八条 以走私、投机倒把为常业的，走私、投机倒把数额巨大的或者走私、投机倒把集团的首要分子，处三年以上十年以下有期徒刑，可以并处没收财产。

《刑法》第一百三十条 违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用工具、方法进行狩猎，破坏珍禽、珍兽或者其他野生动物资源，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

《刑法》第一百六十七条 伪造、变造或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关、企业、事业单位、人民团体的公文、证件、

印章的，处三年以下有期徒刑、拘役，管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重破坏经济的犯罪的决定》第一条 对刑法第一百一十八条走私、套汇、投机倒把牟取暴利罪，第一百五十二条盗窃罪，第一百七十一条贩毒罪，第一百七十三条盗运珍贵文物出口罪，其处刑分别补充或者修改为：情节特别严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，可以并处没收财产。

《全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定》第二条 走私国家禁止出口的文物、珍贵物及其制品、黄金、白银或者其他贵重金属的，处五年以上有期徒刑、并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产；情节较轻的，处五年以下有期徒刑、并处罚金。

二、《海关法》有关规定

第四十七条 逃避海关监管，有下列行为之一的，是走私罪：

（一）运输、携带、邮寄国家禁止进出口的毒品、武器、伪造货币进出境的，以牟利、传播为目的运输、携带、邮寄淫秽物品进出境的，或者运输、携带、邮寄国家禁止出口的文物出境的；

（二）以牟利为目的，运输、携带、邮寄除前项所列物品外的国家禁止进出口的其他物品、国家限制进出口或者依法应当缴纳关税的货物、物品进出境，数额较大的；……

第四十八条 有本法第四十七条第(二)、(三)项所列行为之一，走私货物、物品数额不大的，或者携带、邮寄淫秽物品进出境不构成走私罪的，由海关没收货物、物品、违法所得，可以并处罚款。

三、《治安管理处罚条例》有关规定

第二十条 有下列妨害公共安全行为之一的，处十五日以下拘留、二百元以下罚款或者警告：

(一)非法携带、存放枪支、弹药或者有其他违反枪支管理规定行为，尚不够刑事处罚的；

……

主要参考文献

汪松主编．中国濒危动物红皮书．北京：科学出版社，1998

[General Information]
书名=中国保护动物图谱
作者=陈效一主编
页数=306
SS号=11407747
DX号=
出版日期=2004年04月第1版
出版社=中国环境科学出版社

封面
书名
版权
前言
国家重点保护野生动物（一级）
灵长目
懒猴科
猴科
长臂猿科
食肉目
熊科
大熊猫科
鼬科
灵猫科
猫科
海牛目
儒艮科
鲸目
喙豚科
海豚科
长鼻目
象科
奇蹄目
马科
偶蹄目
驼科
鼷鹿科
鹿科
牛科
啮齿目

河狸科
鹱形目
信天翁科
鹈形目
军舰鸟科
鹳形
鹳科
鹦科
雁形目
鸭科
隼形目
鹰科
鸡形目
松鸡科
雉科
鹤形目
鹤科
鸨科
鸻形目
鸻科
龟鳖目
陆龟科
鳖科
蜥蜴目
鳄蜥科
巨蜥科
蛇亚目
蟒科
鳄目
鼍科

鲟形目
鲟科
匙吻鲟科
国家重点保护野生动物（二级）
灵长目
猴科
鳞甲目
鲮鲤科
食肉目
犬科
熊科
浣熊科
鼬科
灵猫科
猫科
鳍足目（所有种）
鲸目
偶蹄目
麝科
鹿科
牛科
兔形目
兔科
啮齿目
松鼠科
鹱鹲目
鹱鹲科
鹈形目
鹈鹕科
鲣鸟科

鸻鹬科
鹳形目
鹭科
鹳科
鹦科
雁形目
鸭科
隼形目
鹰科
隼科（所有种）
鸡形目
松鸡科
雉科
鹤形目
鹤科
秧鸡科
鸨形目
雉鸨科
鹬科
燕鸨科
鸥形目
鸥科
鸽形目
沙鸡科
鸠鸽科
鹦形目
鹦鹉科（所有种）
鹃形目
杜鹃科
鸮形目（所有种）

雨燕目
雨燕科
凤头雨燕科
咬鹃目
咬鹃科
佛法僧目
翠鸟科
蜂虎科
犀鸟科（所有种）
鴷形目
啄木鸟科
雀形目
八色鸫科（所有种）
阔嘴鸟科（所有种）
龟鳖目
龟科
陆龟科
海龟科
棱皮龟科
鳖科
蜥蜴目
壁虎科
有尾目
隐鳃鲵科
蝾螈科
无尾目
蛙科
国家重点保护野生动物（一级）
灵长目
懒猴科

猴科
长臂猿科
食肉目
熊科
大熊猫科
鼬科
灵猫科
猫科
海牛目
儒艮科
鲸目
喙豚科
海豚科
长鼻目
象科
奇蹄目
马科
偶蹄目
驼科
鼷鹿科
鹿科
牛科
啮齿目
河狸科
鼹形目
信天翁科
鹈形目
军舰鸟科
鹳形目
鹳科

鹦科
雁形目
鸭科
隼形目
鹰科
鸡形目
松鸡科
雉科
鹤形目
鹤科
鸨科
鸻形目
鸻科
龟鳖目
陆龟科
鳖科
蜥蜴目
鳄蜥科
巨蜥科
蛇亚目
蟒科
鳄目
鼍科
鲟形目
鲟科
匙吻鲟科
国家重点保护野生动物（二级）
灵长目
猴科
鳞甲目

鲮鲤科
食肉目
犬科
熊科
浣熊科
鼬科
灵猫科
猫科
鳍足目（所有种）
鲸目
偶蹄目
麝科
鹿科
牛科
兔形目
兔科
啮齿目
松鼠科
鹱鹲目
鹱鹲科
鹈形目
鹈鹕科
鲣鸟科
鸬鹚科
鹳形目
鹭科
鹳科
鹮科
雁形目
鸭科

隼形目
鹰科
隼科（所有种）
鸡形目
松鸡科
雉科
鹤形目
鹤科
秧鸡科
鸻形目
雉鸻科
鹬科
燕鸻科
鸥形目
鸥科
鸽形目
沙鸡科
鸠鸽科
鹦形目
鹦鹉科（所有种）
鹃形目
杜鹃科
鸮形目（所有种）
雨燕目
雨燕科
咬鹃目
咬鹃科
佛法僧目
翠鸟科
蜂虎科

犀鸟科（所有种）
鸻形目
啄木鸟科
雀形目
八色鸫科（所有种）
阔嘴鸟科（所有种）
龟鳖目
龟科
陆龟科
海龟科
棱皮龟科
鳖科
蜥蜴目
壁虎科
有尾目
隐鳃鲵科
蝾螈科
无尾目
蛙科
国家重点保护野生动物名录
中华人民共和国野生动物保护法
主要参考文献